

クロチアニジン・イソチアニル粒剤 スタウトダントツ箱粒剤 08	取扱メーカー： 協友アグリ，住友化学 原体メーカー： 住友化学，住友化学・バイエル
成分： クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕………0.80% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用法】

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
湛水直播水稻	いもち病 イネミズゾウムシ	1kg/10a	は種時	は種同時施 業機を用い て土中施用 する。	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 （は種時までの処理は1回以 内、本田での散布、空中散 布、無人航空機散布は合計3 回以内） イソチアニル 3回以内 （は種時までの処理は1回以 内、本田では2回以内）
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネヒメハモグリバエ	50g	は種前	育苗箱の床 土又は覆土 に均一に混 和する。	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 （移植時までの処理は1回以 内、本田での散布、空中散 布、無人航空機散布は合計3 回以内） イソチアニル 3回以内 （移植時までの処理は1回以 内、本田では2回以内）
			は種時 (覆土前) ～移植当日	育苗箱の上 から均一に 散布する。	
			は種前	育苗箱の床 土又は覆土 に均一に混 和する。	
	は種時 (覆土前)	育苗箱の上 から均一に 散布する。			
稲	いもち病 イネミズゾウムシ	1kg/10a	移植時	側条施用	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 （直播ではは種時又は移植時 までの処理は1回以内、本田 での散布、空中散布、無人 航空機散布は合計3回以内） イソチアニル 3回以内 （直播ではは種時又は移植時 までの処理は1回以内、本田 では2回以内）

* 育苗箱は 30×60×3cm，使用土壌約 5 ℓ