

ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン剤 ブルーガ (1キロ粒剤 / フロアブル)	取扱メーカー： クミカ、ホクサン 原体メーカー： クミカ、クミカ
成分： ピリミノバックメチル…0.90% (粒剤), 1.7% (フロアブル) フェンキノトリオン…3.0% (粒剤), 5.6% (フロアブル)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 類白色水和性粘稠懸濁液体 (フロアブル) 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】…………… 〈共通〉

- フェンキノトリオン・ピリミノバックメチルの2成分の水稲用一発処理除草剤である。
- ノビエやミズアオイ、コナギに対し、高い効果・残効を示す。
- フェンキノトリオンは、既存のHPPD剤感受性の飼料米品種等への安全性も確認されている。
- 移植時～ノビエ3葉期まで使用できる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

〈粒剤〉

- 直播栽培にて初期剤として、は種同時処理が可能。

【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失ないように散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期	
	粒剤	フロアブル
ホタルイ	3葉期まで	3葉期まで
へらオモダカ ウリカワ ミズガヤツリ		2葉期まで
オモダカ		発生始期まで
コウキヤガラ	発生始期まで	—
ヒルムシロ	発生期まで	
セリ	再生始期まで	再生期まで
アオミドロ・藻類 による表層はく離	発生始期まで	—
エゾノサヤヌカサ	—	2葉期まで

〈粒剤〉

- オモダカ、コウキヤガラは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

〈フロアブル〉

- オモダカは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
- 原液湛水散布の場合は、水の出入りを止めて湛水状態（水深3～5cm）のまま水田全体にゆきわたるように散布する。
- 水口施用の場合は、入水時に水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させる。処理後田面水が通常の湛水状態（水深3～5cm）に達した時に必ず水を止め、田面水があふれ出ないように注意する。
- 藻類・表層はく離などの水面浮遊物が多い場合は、本剤の拡散が不十分になるおそれがあるため水口施用をさけ、本田内で水田全面に散布する。
- 水口に対して風速5m/sを超える向かい風が吹いている場合は、本剤の拡散が不十分になるおそれがあるため水口施用をさける。

【薬効・薬害等の注意】……………

〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 直播水稲の入水後に使用する場合には、除草効果の低下と生育抑制の薬害が発生するおそれがあるので、水持ちの安定した後に散布する。
- 散布後の数日間に著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがあるが、一過性のもので次第に回復し、その後の生育に対する影響は認められていない。
- 適用作物（水稲）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

〈共通〉

- カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

〈粒剤〉

- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。

〈フロアブル〉

- 散布の際は不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

〈フロアブル〉



【適用と使用法】……………

①ベルーガ1キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ コウキヤガラ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植直後～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	1kg	湛水散布	1回※
		移植時		田植同時散布機 で施用	
直播水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による 表層はく離	は種直後～ ノビエ3葉期 但し、 収穫75日前まで	0.5～1kg	湛水散布	
		は種直後		ごく浅く湛水 して散布	
		は種時		は種同時散布機 で施用	

※ビリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

②ベルーガフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ セリ オモダカ エゾノサヤマカグサ	移植時	500 ml	田植同時散布 機で施用	1回※
		移植直後～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで		原液湛水散布 又は水口施用	
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	は種直後～ ノビエ3葉期 但し、 収穫90日前まで		原液湛水散布	

※ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内