

園芸用キンチョール E

成分：ペルメトリン〔ピレスロイド系〕……0.20%

毒性：普通物

【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ペルメトリンを含む 農薬の総使用回数
樹 木 類	ケムシ類	—	—	噴霧液が均一に付着するように 30 cm以上離れた所から数回断 続して噴射する。	—
つ つ じ 類	ツツジグンバイ				
き く	アブラムシ類				
ば ら	アブラムシ類 ハダニ類 チュウレンジハバチ			【専用ノズルつけかえ方式】 容器のボタンを引き抜き、専用 ノズルにつけかえ、食入部にノ ズルを差し込み、薬剤が食入部 から流出するまで噴射する。	
	ゴマダラカミキリ			【2ウェイノズル方式】 折り畳まれた専用ノズルを引き 上げ、食入部にノズルを差し込 み、薬剤が食入部から流出する まで噴射する。	
				さ く ら	
クビアカツヤカミキリ	【2ウェイノズル方式】 折り畳まれた専用ノズルを引き 上げ、食入部にノズルを差し込 み、薬剤が食入部から流出する まで噴射する。				
	か え で				
ゴマダラカミキリ				【2ウェイノズル方式】 折り畳まれた専用ノズルを引き 上げ、食入部にノズルを差し込 み、薬剤が食入部から流出する まで噴射する。	

作物名	適用害虫名	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ベルメトリンを含む 農薬の総使用回数
かんきつ	ゴマダラカミキリ	14日前 まで	6回以内	<p>【専用ノズルつけかえ方式】 容器のボタンを引き抜き、専用ノズルにつけかえ、食入部にノズルを差し込み、薬剤が食入部から流出するまで噴射する。</p> <p>【2ウェイノズル方式】 折り畳まれた専用ノズルを引き上げ、食入部にノズルを差し込み、薬剤が食入部から流出するまで噴射する。</p>	6回以内
いちじく	クワカミキリ	前日まで	2回以内	<p>【専用ノズルつけかえ方式】 容器のボタンを引き抜き、専用ノズルにつけかえ、食入部にノズルを差し込み、薬剤が食入部から流出するまで噴射する。</p> <p>【2ウェイノズル方式】 折り畳まれた専用ノズルを引き上げ、食入部にノズルを差し込み、薬剤が食入部から流出するまで噴射する。</p>	2回以内
びわ びわ（葉）		7日前 まで	3回以内	<p>【専用ノズルつけかえ方式】 容器のボタンを引き抜き、専用ノズルにつけかえ、食入部にノズルを差し込み、薬剤が食入部から流出するまで噴射する。</p> <p>【2ウェイノズル方式】 折り畳まれた専用ノズルを引き上げ、食入部にノズルを差し込み、薬剤が食入部から流出するまで噴射する。</p>	3回以内
りんご	ヒメボクトウ	収穫後から 摘果期まで	2回以内	<p>【専用ノズルつけかえ方式】 容器のボタンを引き抜き、専用ノズルにつけかえ、食入部にノズルを差し込み、薬剤が食入部から流出するまで噴射する。</p> <p>【2ウェイノズル方式】 折り畳まれた専用ノズルを引き上げ、食入部にノズルを差し込み、薬剤が食入部から流出するまで噴射する。</p>	4回以内 (散布は2回 以内、噴射は 2回以内)

〔取扱メーカー〕 大日本