

マラソン・MEP乳剤 トラサイドA乳剤	取扱メーカー： サンケイ 原体メーカー： 住友化学，住友化学
成分： マラソン〔有機リン系 PRTR・1種〕………10.0% MEP〔有機リン系 PRTR・1種〕………40.0% その他 PRTR 該当成分： キシレン〔PRTR・1種〕…9% (6.6～9.9%) 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン〔PRTR・1種〕…2.0% ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル〔PRTR・1種〕…20.0% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及び塩〔PRTR・1種〕…1.9% エチルベンゼン〔PRTR・1種〕………9% (7.7～10.8%)	性状： 黄褐色可乳化液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級Ⅲ

【品目特性】 ……………

●マラソンとMEPを主剤とする製剤で，浸透性があり，優れた殺虫効果がある。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】 ……………

〈カミキリムシ防除の場合〉

●使用時期を失する事なく適期に樹幹に散布する。産卵最盛期～幼虫食入期が散布適期である。カミキリムシ類成虫の発生が長びく場合は発生状況に応じて，産卵最盛期直前と幼虫食入期の2回散布が効果的である。

〈ぶどうのブドウトラカミキリ，もも，ネクタリン，すもも，おうとうのコスカシバ，くりのクリタマバチの場合〉

●越冬幼虫を対象に，休眠期に木全体に散布する。

【薬効・薬害等の注意】 ……………

●石灰硫黄合剤などのアルカリ性薬剤との混用はしない。

●葉に散布液がかかると薬害を生じるおそれがあるので，かからないように樹幹部のみに散布する。（特に新葉には注意する）

●雨天や降雨直後の散布は殺虫力が十分発揮されないことがあるので実施しない。

●適用作物（全般，ぶどう，くり，桑）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●適用外作物への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】 ……………

●自動車，壁などの塗装面，大理石，御影石に散布液又は薬剤がかかると変色するおそれがあるので薬剤がかからないように注意する。

●魚類，甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので，使用時は注意。

●散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】 ……………

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	マラソンを含む農 薬の総使用回数	MEPを含む農 薬の総使用回数
ぶ ど う	ブドウトラカミキリ	200 ～ 300 倍	200 ～ 700 ℓ	発芽前 （休眠期）	2 回 以内	散布	6 回以内	4 回以内 （収穫終了後から 萌芽までは2 回以内，萌芽後 は2回以内）
み か ん	カミキリムシ類	200 倍	0.5 ～ 2.0 ℓ / 樹	産卵最盛期～ 幼虫食入初期 但し収穫14 日前まで	1 回	樹幹部に 十分散布	5 回以内	5 回以内 （樹幹処理は 1 回以内）

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	マラソンを含む農 薬の総使用回数	MEPを含む農 薬の総使用回数
も　　も	コスカシバ	200 ～ 300 倍	100 ～ 450 ℓ	収穫後～ 発芽前 (幼虫 食入期)	1 回	樹幹及び 主枝に十分 散布する。	5 回以内	6 回以内 (樹幹処理は 1 回以内)
ネクトリン					3 回 以内		3 回以内	
す も も		200 倍			2 回 以内		2 回以内	
りんご	カミキリムシ類	200 倍	0.5 ～ 2.0 ℓ / 樹	産卵初期 ～産卵最盛 期直前 但し収穫30 日前まで	3 回 以内	樹幹部に 十分散布	5 回以内 (休眠期か ら芽出直 後までは 1 回以内)	3 回以内
	キクイムシ類			4 ～ 7 月 但し収穫 30 日前まで				
	リンゴアナキゾウムシ			7 ～ 8 月 (幼虫食入期) 但し収穫30 日前まで				
			3 ℓ / 樹					
な　　し	カミキリムシ類	200 倍	0.5 ～ 2.0 ℓ / 樹	6 ～ 7 月 (産卵初期 ～産卵最盛 期直前) 但し収穫21 日前まで	5 回 以内	樹幹部に 十分散布	5 回以内 (休眠期は 1 回以内)	6 回以内
	キクイムシ類			4 ～ 7 月 但し収穫21 日前まで				
おうとう	リンゴアナキゾウムシ			3 ℓ / 樹	7 ～ 8 月 (幼虫食入期)	1 回	地際部 灌注	5 回以内 (休眠期 の 50 倍希 釈散布は 1 回以内)
	コスカシバ		100 ～ 450 ℓ	収穫後～萌 芽前 (幼 虫食入期)	樹幹及び 主枝に 十分散布 する。			
く　　り	クリタマバチ	100 ～ 200 倍	200 ～ 700 ℓ	発芽直前	2 回 以内	散布	4 回以内	4 回以内 (樹幹処理は 1 回以内)
	カミキリムシ類			0.5 ～ 2.0 ℓ / 樹		裂果前 但し収穫 14 日前まで		
か　　き	ヒメコスカシバ	200 倍		産卵期～幼 虫食入初期 但し収穫30 日前まで			3 回以内 (樹幹処理は 2 回以内)	
桑	カミキリムシ類	100 ～ 200 倍	100 ～ 300 ℓ	発芽前 (3 ～ 4 月) 及び夏切 り直後	6 回 以内	散布	6 回以内	6 回以内
		100 倍		晩秋期				