

ジメトモルフ水和剤 フェスティバル水和剤	取扱メーカー： 協友アグリ 原体メーカー： B A S F
成分： ジメトモルフ……………50.0%	性状： 類白色水和性粉末45 μ m以下 毒性： 普通物 消除法： ——

【品目特性】……………

- べと病，疫病に特異的に高い効果を発揮する。
- 優れた予防効果に加え，治療的効果を発揮する。
- 経済性に優れ，コストの削減が図れる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 散布液調製後は速やかに散布する。
- 予防効果が主体のため発病前から発病初期に散布する。
- 茎葉部からの吸収移行性及びガス化による効果は無いので，散布ムラのないように均一に処理する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 連続使用は耐性菌出現のおそれがあるので，過度の連用はさけ作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用する。

【安全対策上の注意】……………

- 眼に対して刺激性があるので，眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し，眼科医の手当を受ける。

【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	ジメトモルフを含む 農薬の総使用回数
ばれいしょ	疫病	1000～ 2000倍	100～300 ℓ	14日前まで	3回以内	散布	3回以内
きゅうり	べと病	2000倍		前日まで			
トマト	疫病						
ミニトマト	べと病		3日前まで				
ほうれんそう			200～700 ℓ	45日前まで			
キャベツ				30日前まで			
はくさい		100～300 ℓ	14日前まで	2回以内	2回以内		
小粒種ぶどう	3回以内		3回以内				
大粒種ぶどう	2回以内		2回以内				
ねぎ							3回以内
バジル							2回以内