

ジメタメトリン・ダイムロン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン剤 レブラス (1キロ粒剤 / ジャンボ / エアー粒剤)	取扱メーカー： 日産 原体メーカー： 日産、エス・ディー・エス、 全農・バイエル・北興、日産
成分： ジメタメトリン〔トリアジン系〕……………1.0% (粒剤), 2.5% (ジャンボ・エアー粒剤) ダイムロン〔尿素系〕……………10.0% (粒剤), 25.0% (ジャンボ・エアー粒剤) テフリルトリオン〔トリケトン系〕……………3.0% (粒剤), 7.5% (ジャンボ・エアー粒剤) メタゾスルフロン〔スルホニルウレア系〕…1.2% (粒剤), 3.0% (ジャンボ・エアー粒剤)	性状： 淡灰色細粒 (粒剤) 淡褐色細粒 水溶性パック入り 1パック 40g (ジャンボ) 淡褐色細粒 (エアー粒剤) 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】…………… 〈共通〉

- ノビエ，多年生雑草，スルホニルウレア抵抗性雑草に卓効の総合的中後期剤である。
- ノビエ4葉期，クログワイ30cmなど，大きくなってしまった雑草にも有効。
- 落水せずに散布できるので省力的である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5．水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので，ノビエ4葉期までに時期を失しないように散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので，必ず適期に散布するように注意する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	エアー粒剤
ホタルイ	花茎20cmまで	4葉期まで	花茎20cmまで
ウリカワ		3葉期まで	
ヘラオモダカ	4葉期まで	4葉期まで	
ミズガヤツリ		5葉期まで	
ヒルムシロ	生育期まで	発生盛期まで	
セリ		再生期まで	
オモダカ		矢尻葉3葉期まで	
クログワイ		草丈30cmまで	
コウキヤガラ			
シズイ	草丈20cmまで	—	

- 移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用する場合には，雑草の発生状況をよく観察し，時期を失しないように適期に散布する。

【薬効・薬害等の注意】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5．水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物 (水稲) の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物 (いぐさ，れんこん，せり，くわい) への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

〈粒剤〉

- 直播水稲に使用する場合は，薬害をさけるため稲の2葉期以降に使用し，稲の根が露出しているときの使用はさける。

〈ジャンボ〉

- 本剤は小包装 (パック) のまま10a当り10個の割合で水田に均等に投げ入れる。
- 藻や浮草が多発している水田では，拡散が不十分となり，効果の劣る可能性があるので使用をさける。

〈エアー粒剤〉

- 藻や浮草が多発している水田では，拡散が不十分となり，効果の劣る可能性があるので使用をさける。

【安全対策上の注意】…………… 〈共通〉

- 藻類に影響を及ぼすので，使用時並びに使用後も注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。

〈粒剤〉

- 蚕に対して影響があるので，周辺の桑葉にはかからないようにする。

●無人航空機散布の際は、共通注意事項の2、空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

〈エア－粒剤〉

●無人航空機散布の際は、共通注意事項の2、空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

【適用と使用法】.....

①レブラス1キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植 水 稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ	移植後14日～ ノビエ4葉期 但し、 収穫60日前まで	1 kg	湛水散布 又は 無人航空機による 散布	1回 ※
直播 水 稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲2葉期～ ノビエ4葉期 但し、 収穫60日前まで			

※ジメタメトリンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ダイムロンを含む農薬の総使用回数：移植水稲は3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)、
直播水稲は2回以内

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※メタゾスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内

②レブラスジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植 水 稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ	移植後14日～ ノビエ4葉期 但し、 収穫60日前まで	小包装 (パック) 10個 (400g)	水田に小包装 (パック) のまま 投げ入れる。	1回 ※

※ジメタメトリンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ダイムロンを含む農薬の総使用回数：3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※メタゾスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内

③レブラスエアー粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植 水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ	移植後14日～ ノビエ4葉期 但し、 収穫60日前まで	400g	湛水散布 又は 無人航空機による 散布	1回 ※

※ジメタメトリンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ダイムロンを含む農薬の総使用回数：3回以内（育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内）

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※メタゾスルフロンを含む農薬の総使用回数：2回以内