

フルベンジアミド水和剤 フェニックスフロアブル	取扱メーカー： 日農，日本曹達 原体メーカー： 日農
成分： フルベンジアミド〔ベンゼンジカルボキサミド系〕…18.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】……………

- フェニックス顆粒水和剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- フェニックス顆粒水和剤の項参照。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 長期間静置した場合は粘性が高くなるので、使用前に瓶を軽く数回振ってから使用する。
- ぶどうの幼果期から果実肥大期に使用する場合は、果粉の溶脱が生じるおそれがあるので注意する。
- 西洋なしの品種ルレクチェでは落花後から袋かけ前までの散布についてはリング状の葉斑が生じるおそれがあるので使用をさける。

- 4000倍希釈液を枝幹害虫防除に使用する場合、幼虫食入前に樹幹部及び主枝に十分量散布する。
- 共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 蚕に対しては長期間毒性があるので、桑葉には絶対かからないように散布する。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。
- 共通注意事項6. 街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	フルベンジアミドを 含む農薬の総使用回数
りんご	ハマキムシ類 キンモンホソガ ケムシ類 ギンモンハモグリガ	4000～ 6000倍	200～ 700 ℓ	前日まで	2回以内	散布	2回以内
	シンクイムシ類 ヨモギエダシャク ヒメボクトウ オオタバコガ	4000倍					
	なし	ハマキムシ類					
シンクイムシ類 ケムシ類 フタモンマダラメイガ ヒメボクトウ		4000倍					
すもも							シンクイムシ類 ケムシ類 ハマキムシ類 コスカシバ
	コスカシバ	200倍	5～ 200 ℓ	開花期 まで	1回	樹幹部及び 主枝に散布	3回以内 (樹幹散布 は1回以内、 散布は 2回以内)
小粒核果類 (うめ、すもも を除く)	ケムシ類 コスカシバ	4000倍	200～ 700 ℓ	前日まで	2回以内	散布	2回以内
うめ	コスカシバ	200倍	5～ 200 ℓ	開花期 まで	1回	樹幹部及び 主枝に散布	3回以内 (樹幹散布 は1回以内、 散布は 2回以内)
もも ネクタリン	ハマキムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 ケムシ類 コスカシバ	4000倍	200～ 700 ℓ	前日まで	2回以内	散布	
	コスカシバ	200～ 500倍	5～ 200 ℓ	開花期 まで	1回	樹幹部及び 主枝に散布	
おうとう	コスカシバ ケムシ類	4000倍	200～ 700 ℓ	前日まで	2回以内	散布	
	ハマキムシ類	4000～ 6000倍					
ぶどう	ハスモンヨトウ ケムシ類 ハマキムシ類 スカシバ類 モンキクロノメイガ ミノガ類 ホソオビツチイロノメイガ	4000倍		14日前 まで			
	スカシバ類	500倍	5～ 200 ℓ	開花期 まで	1回	樹幹部及び 主枝に散布	

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	フルベンジアミドを 含む農薬の総使用回数
か き	フタモンマダラメイガ スカシバ類	200 倍	5～ 200 ℓ	開花期 まで	1 回	樹幹部及び 主枝に散布	3 回以内 (樹幹散布 は 1 回以内、 散布は 2 回以内)
	カキノヘタムシガ イラガ類 ハマキムシ類 ヒメコスカシバ フタモンマダラメイガ ケムシ類 ハスモンヨトウ	4000 倍	200～ 700 ℓ	7 日前 まで	2 回以内		
	く り			モモノゴマダラノメイガ クスサン			
ブルーベリー	ケムシ類			前日まで			
かんきつ	アゲハ類 ハスモンヨトウ ハマキムシ類 ケムシ類 ヨモギエダシヤク				3 回以内		
	キウイフルーツ			スカシバ類 ハマキムシ類 キイロマイコガ ケムシ類			2 回以内
び わ	オオタバコガ			7 日前 まで	2 回以内		
だ い ず	ハスモンヨトウ	2000～ 4000 倍	100～ 300 ℓ	3 回以内	散布		3 回以内
	ウコンノメイガ ネキリムシ類 ツメクサガ	4000 倍					
えだまめ	ハスモンヨトウ	2000～ 4000 倍		前日まで			
	ウコンノメイガ ネキリムシ類 ツメクサガ	4000 倍					
てんさい	ヨトウムシ	4000～ 6000 倍		2 回以内			
茶	チャノホソガ	2000～ 4000 倍	200～ 400 ℓ	摘採 7 日 前まで	1 回		1 回
	チャハマキ チャノコカクモンハマキ シャクトリムシ類 ハスモンヨトウ	2000 倍					
	チャドクガ ミノガ類	4000 倍					
さ く ら	ケムシ類		200～ 700 ℓ	発生初期	2 回以内		2 回以内