

エトフェンプロックス・イミノクタジン酢酸塩・トリシクラゾール・メブロニル粉剤 ラテラワイド粉剤 D L	取扱メーカー： クミカ 原体メーカー： 三井アグロ，日本曹達，ダウ， クミカ
成分：エトフェンプロックス〔ピレスロイド系〕……………0.50% イミノクタジン酢酸塩〔グアニジン系〕……………1.0% トリシクラゾール〔メラニン生成阻害〕……………0.50% メブロニル〔酸アミド系 PRTR・1種〕……………3.0%	性状：類白色粉末45μm 以下， 浮遊性指数20 以下 毒性：普通物 消防法：——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ カメムシ類 イネツトムシ	3～4kg	14 日前 まで	散布	本剤 3回以内 エトフェンプロックス 3回以内 イミノクタジン 3回以内 トリシクラゾール 4回以内 （育苗箱への処理は 1 回以内， 本田では 3 回以内） メブロニル 3回以内
	紋枯病 穂枯れ （ごま葉枯病菌） 内穎褐変病 稲こうじ病 変色米 （カープラリア菌）	4kg			