

| | |
|--|---|
| エトキサゾール・ピリミジフェン水和剤 茶ちゃっとフロアブル | 取扱メーカー： 協友アグリ、三井アグロ* 原体メーカー： 協友アグリ、三井アグロ |
| 成分： エトキサゾール（オキサゾリン系）……………8.0% ピリミジフェン（フェノキシエチルアミン系）……………3.6% | 性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —— |

【品目特性】……………

- カンザワハダニとサビダニ類の同時防除が可能である。
- カンザワハダニに対して接触的に作用するとともに、経口的にも作用する。
- カンザワハダニの幼若虫及び卵に優れた殺ダニ・殺卵活性を示す。
- チャノナガサビダニの成虫・幼虫・卵のいずれのステージに対しても高い活性を示す。
- 殺卵・殺幼若虫効果が長続きするので、カンザワハダニ及びチャノナガサビダニの増殖を長期間抑える。
- カンザワハダニに対する効果は、温度の影響をほとんど受けない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 使用前には必ず容器をよく振り、使用量に合わせ薬液を調製し使いきる。
- 散布は年1回とし、他の殺ダニ剤との輪番で使用する。

- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布ムラのないように丁寧に散布する。

- 植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないよう葉の裏表に十分散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- ボルドー液との混用はさける（効果）。

【安全対策上の注意】……………

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。
- 魚類に影響を及ぼすので使用時は注意。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。



【適用と使用方法】……………

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈 倍数 | 10 a 当り 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用 方法 | エトキサゾールを含 む農薬の総使用回数 | ピリミジフェンを含 む農薬の総使用回数 |
|-----|---|-----------|-----------------|--------------|-------------|----------|------------------------|------------------------|
| 茶 | カンザワハダニ サビダニ類 チャノホコリダニ チャトゲコナジラミ | 2000 倍 | 200 ～ 400 ℓ | 摘採14日 前まで | 1 回 | 散布 | 1 回 | 1 回 |