

バトル粒剤

成分：イマゾスルフロン〔スルホニルウレア系〕……0.30%

ダイムロン〔尿素系〕……5.0%

メフェナセット〔酸アミド系 PRTR・1種〕……3.5%

毒性：普通物

【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	適用 土壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	適用地帯	本剤の 使用回数
移植 水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ (北海道, 東北)	砂壤土 ～埴土	移植後 10 日～ ノビエ 2.5 葉期 但し, 移植後 30 日まで	3 kg	湛水 散布	北海道	1 回 ※
	ヒルムシロ オモダカ (北海道を除く) クログワイ (北海道を除く) セリ (九州を除く) アオミドロ・藻類に よる表層はく離 (北陸を除く) コウキヤガラ		移植後 5 日～ ノビエ 2.5 葉期 但し, 移植後 30 日まで			全域 (北海道 を除く) の普 通期及び早期 栽培地帯	

※イマゾスルフロンを含む農業の総使用回数：2 回以内

※ダイムロンを含む農業の総使用回数：3 回以内 (育苗箱散布は 1 回以内, 本田では 2 回以内)

※メフェナセットを含む農業の総使用回数：2 回以内

〔取扱メーカー〕 住友化学