

ヒドロキシイソキサゾール・メタラキシル M 液剤 タチガレエース M 液剤	取扱メーカー： 三井アグロ、ホクサン 原体メーカー： 三井アグロ、シンジェンタ
成分： ヒドロキシイソキサゾール〔イソキサゾール系〕…30.0% メタラキシルM〔フェニルアמיד系〕……………2.0%	性状： 黄色澄明水溶性液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第3石油類（水溶性）・危険等級Ⅲ

【品目特性】……………

- タチガレエース M 粉剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 人工培土を使用した育苗や大規模育苗施設など、タチガレエース M 粉剤の使用しにくい場合で効率的に使用できる。
- 中苗育苗など、特に寒冷地では、タチガレエース M 粉剤とタチガレエース M 液剤（又はタチガレン液剤）との体系処理が、健苗確保のために有効である。
- ダコニール剤との同時あるいは近接処理ができる。

【薬効・薬害等の注意】……………

- ムレ苗防止には、吸水と蒸散の不均衡によるムレ苗の発生する地域で使用する。
- 苗腐病に使用する場合、乾燥種粒に鉄コーティング処理をした後、は種2日前～は種当日に所定

量を噴霧器で均一に付着するよう吹き付ける。吹き付け処理した種粒はビニール袋等で密閉して保管し、速やかに使用する。

●本剤は、ピシウム菌、フザリウム菌による苗立枯病に対して有効であるが、リゾプス菌その他による苗立枯病には効果が劣るので注意する。

●草丈の高い品種や、は種量の多い場合に使用すると、生育後期に苗が伸びすぎることがあるので育苗管理に注意する。

●適用作物（稲）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石にかからないようにする（塗装汚染・変色）。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- カブレやすい人は取り扱いに十分注意する。



【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名 又は使用目的	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ヒドロキシイソキサゾールを含む 農薬の総使用回数	メタラキシル及びメ タラキシルMを含む 農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	苗立枯病 (フザリウム菌)	500～ 1000 倍	育苗箱* 1箱当り 500 ml	は種時 又は 発芽後	1 回	土壌 灌注	3 回以内 (移植前の土 壌混和は 1 回 以内、移植前 の土壌灌注は 2 回以内)	4 回以内 (移植前の土 壌混和は 1 回 以内、育苗箱 への灌注は 1 回以内、本田 では 2 回以 内)
	苗立枯病 (ピシウム菌) ムレ苗防止 根の生育促進 移植時の活着 促進	1000 倍	育苗箱* 1箱当り 1 ℓ	は種時				
稲 (湛水直播)	苗腐病 (ピシウム菌)	2.5～ 5 倍	乾燥 種もみ 1kg 当り 30 ml	は種前		鉄コーテ ィング種 子に吹き 付け処理	1 回	3 回以内 (種もみへの 処理は 1 回以 内、本田では 2 回以内)

* 育苗箱は 30×60×3 cm、使用土壌約 5 ℓ