

<b>PAP乳剤</b> <b>エルサン乳剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 日産、日農、北興、一農、琉産 <b>原体メーカー：</b> 日産
<b>成分：</b> PAP〔有機リン系 PRTR・1種〕……………50.0% <b>その他 PRTR 該当成分：</b> キシレン〔PRTR・1種〕……………15% (9.0～23%) エチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………15% (8.0～23%) ベンゼン〔PRTR・1種〕……………0.23～0.28% トルエン〔PRTR・1種〕……………～1.1%	<b>性状：</b> 赤黄色澄明可乳化油状液体 <b>毒性：</b> 劇物 <b>消防法：</b> 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III

### 【品目特性】……………

- 広範囲の害虫に有効で、各作物の主要害虫、雑害虫を同時防除できる。
- 稲に収穫7日前まで使用できるので、稲害虫の総合仕上げ防除に適する。
- だいたず主要害虫の同時防除ができる。
- かんぎつには開花前後から幼果期頃の散布でカイガラムシ類が同時防除できる。
- 桑のヒシモンヨコバイ越冬卵に効果がある。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- ハスモンヨトウ防除の場合、若齢幼虫期に散布する。
- 桑のカミキリムシ、クワヒメゾウムシの防除に200～300倍液を散布する場合、蚕に影響があるので越冬期及び夏切り直後、春切り直後など桑の萌芽前に使用する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- ボルドー液、石灰硫黄合剤など、アルカリ性薬剤と混用しない。
- 適用作物（桑）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（ぶどう、れんこん、もも、うめ、ソルゴー）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 稲に使用する場合は、散布後少なくとも3日間は落水、かけ流しはしない。
- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。
- 蚕に対して影響があるので、本剤を桑に散布した場合は15日以上経過してから蚕に給与する。
- 魚類、甲殻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。
- 魚類に低濃度でも影響を及ぼすので注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】 .....

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	PAPを含む農業 の総使用回数					
稲	ニカメイチュウ第1世代	1000～ 1500倍	60～ 150 ℓ	7日前 まで	2回以内		2回以内					
	ニカメイチュウ第2世代 サンカメイチュウ第3世代	800～ 1000倍										
	ツマグロヨコバイ ヒメトビウンカ イネヒメハモグリバエ	1500～ 2000倍										
	カメムシ類 アブラムシ類※ フタオビコヤガ	1000倍										
	イネドロオイムシ	1000～ 2000倍										
	イネハモグリバエ	2000倍										
小麦	アブラムシ類 ムギクロハモグリバエ アワヨトウ ムギキモグリバエ	1000倍			4回以内		4回以内					
	く　　り							モモノゴマダラノメイガ クリイガアブラムシ カツラマルカイガラムシ若齢幼虫 クスサン				
かんきつ	ヤノネカイガラムシ アブラムシ類	1000～ 1500倍	200～ 700 ℓ	14日前 まで	2回以内	散布	2回以内					
	ミカンサビダニ ミカントゲコナジラミ ミカンコナジラミ ハマキムシ類 ミカンハモグリガ カイガラムシ類 (ヤノネカイガラムシを除く) カメムシ類 アザミウマ類 ケシキスイ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンバエ成虫	1000倍										
	キャベツ カリフラワー	アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ						1000～ 2000倍	100～ 300 ℓ			
		ヨトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類						1000倍				
	コナガ	1000～ 1500倍										

※：同一薬剤名（会社名を除き）であっても登録内容が異なる箇所。使用時には必ずラベルで登録内容を確認すること。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	PAPを含む農業 の総使用回数
ブロッコリー	アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ	1000～ 2000倍	100～ 300 ℓ	30 日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	ヨトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類	1000倍					
	コナガ	1000～ 1500倍					
は く さ い	アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ	1000～ 2000倍		21 日前 まで	3回以内		3回以内
	ヨトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類	1000倍					
	コナガ	1000～ 1500倍					
ほうれんそう	アブラムシ類 ホウレンソウケナガコナダニ	1000～ 2000倍			1回		1回
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000倍					
だ い こ ん	アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ	1000～ 2000倍		30 日前 まで	2回以内		2回以内
	ヨトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類	1000倍					
	コナガ	1000～ 1500倍					
か        ぶ	アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ	1000～ 2000倍					
	ヨトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類	1000倍					
	コナガ	1000～ 1500倍					
	ダイコンハムシ オオニジュウヤホシテントウ	1000～ 2000倍					
レ   タ   ス	アブラムシ類						
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	PAPを含む農業 の総使用回数	
す い か し ろ う り か ぼ ち や	アブラムシ類	1000～ 2000倍	100～ 300 ℓ	3日前 まで	3回以内	散布	3回以内	
	アザミウマ類	1000倍			4回以内		4回以内	
まくわうり メ ロ ン	アブラムシ類	1000～ 2000倍		7日前 まで	3回以内		3回以内	
	アザミウマ類	1000倍						
ご ぼ う	アブラムシ類	1000～ 2000倍		90日前 まで	1回		1回	
に ん じ ん	ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000倍						
ね ぎ	アブラムシ類	1000～ 2000倍		21日前 まで				
	アザミウマ類	1000倍						
た ま ね ぎ	アブラムシ類	1000～ 2000倍		7日前 まで	2回以内		2回以内	
	アザミウマ類				4回以内		4回以内	
か ん し ょ	ヒルガオハモグリガ ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	1000倍		14日前 まで	2回以内		2回以内	
	アブラムシ類 ニジュウヤホシテントウ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000～ 2000倍 1000倍						
ば れ い し ょ	アブラムシ類	1000～ 2000倍		7日前 まで	1回		1回	
	アザミウマ類	1000倍						
さ と い も	アブラムシ類	1000～ 2000倍		21日前 まで	2回以内		2回以内	
	ハスモンヨトウ	1000倍						
豆 類 (種実,但し, らっかせい, だ い ず, あ ず き, いんげんまめ, えんどうまめ を除く)	アブラムシ類	1000～ 2000倍		7日前 まで	2回以内		2回以内	
だ い ず	マメシンクイガ カメムシ類 ハスモンヨトウ ツメクサガ	1000倍						
	シロイチモジマダラメイガ	1500～ 2000倍						
あ ず き	アブラムシ類	1000～ 2000倍		7日前 まで	2回以内		2回以内	
	アズキノメイガ マメホソクチゾウムシ	1000倍						
いんげんまめ	アブラムシ類	1000～ 2000倍						
	フキノメイガ インゲンテントウ	1000倍						

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	PAPを含む農業 の総使用回数
えんどうまめ	アブラムシ類	1000～ 2000倍	100～ 300 ℓ	7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	エンドウハモグリバエ	1000～ 1500倍					
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000倍					
未成熟そらまめ	アブラムシ類	1000～ 2000倍		1回			
さやいんげん	フキノメイガ インゲンテントウ	1000倍					
さやえんどう	アブラムシ類	1000～ 2000倍		28日前 まで	1回		1回
	エンドウハモグリバエ	1000～ 1500倍					
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ						
わ け ぎ	アザミウマ類			14日前 まで	4回以内		4回以内
アスパラガス	ジュウシホシクビナガハムシ	1000倍		3日前 まで	2回以内		2回以内
とうもろこし	アワノメイガ			14日前 まで	4回以内		4回以内
食 用 ゆ り	アブラムシ類			7日前 まで	3回以内		3回以内
茶	クワシロカイガラムシ				1000 ℓ		最終摘採 後から 冬期まで
	チャドクガ		200～ 400 ℓ				
	コカクモンハマキ	1000～ 1500倍					
き く	キクヒメヒゲナガアブラムシ	1000～ 2000倍	100～ 300 ℓ	—			
桑	クワノメイガ ハゴロモ類	1000～ 1500倍	120 ℓ	摘採15日 前まで	4回以内	4回以内	
	ヒシモンヨコバイ	1500～ 2000倍					
	クワシロカイガラムシ	1000倍					
	ヒメコシンクイ	1200倍					
	クワヒメゾウムシ カミキリムシ類	200～ 300倍		萌芽前 まで			