

<b>スピノサド水和剤</b> <b>スピノエース顆粒水和剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> クミカ、日産、ダウ、琉産  <b>原体メーカー：</b> ダウ
<b>成分：</b> スピノサド〔スピノシン系〕……………25.0%	<b>性状：</b> 淡褐色水和性細粒  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

●新しい殺虫作用機作を持っているので、既存の葉剤に抵抗性を発達させたコナガ、アザミウマ類、ハモグリバエ類にも高い殺虫力を発揮する。

●殺虫効果の発現は速効的で、散布翌日には効果が確認できる。また残効性も通常の条件下では7～10日以上ある。

●散布後は太陽光線によって、腐植成分、水、炭酸ガスに代謝されるので、環境に対して負荷が少ない。

●有機 JAS 使用可能農薬。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

●浸透移行性はあまりないので、葉液が葉裏まで十分にかかるよう丁寧に散布する。

●抵抗性回避のため、1作期1回の散布にとどめ、他剤とのローテーション防除を心掛ける。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

●散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節する。

●共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

●共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	スピノサドを含む農 薬の総使用回数
いちじく	アザミウマ類	5000倍	200～ 700 ℓ	前日まで	1回	散布	1回
ラズベリー				3日前 まで	2回以内		2回以内
マンゴー	チャノキイロアザミウマ			14日前 まで			3回以内
グアバ(葉)	バンジロウツノエグリヒメハマキ						
キャベツ	タマナギンウワバ コナガ アオムシ ヨトウムシ	2500～ 5000倍	100～ 300 ℓ	3日前 まで	3回以内		4回以内 (定植前は 1回以内、 本圃では3 回以内)
	ハイマダラノメイガ アザミウマ類	5000倍					
はくさい	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	2500～ 5000倍					
	ヨトウムシ カブラハバチ	5000倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	スビ/サドを含む農 薬の総使用回数			
ブロッコリー	コナガ アオムシ	5000 倍	100 ～ 300 ℓ	3 日前 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (定植前は 1 回以内、 本圃では3 回以内)			
カリフラワー	コナガ			7 日前 まで			3 回以内			
メキャベツ	ハスモンヨトウ			14 日前 まで						
非結球メキャベツ	ヨトウムシ			7 日前 まで						
だいこん	コナガ アオムシ	2500 ～ 5000 倍		14 日前 まで	2 回以内		2 回以内			
はつかだいこん	キスジノミハムシ	5000 倍		3 日前 まで				1 回	1 回	
非結球あぶら な科葉菜類 (みずな、 非結球はくさい を除く)	アオムシ コナガ アザミウマ類 ハモグリバエ類	2500 ～ 5000 倍		前日まで	2 回以内		2 回以内			
非結球はくさい みずな	ヨトウムシ類 ハイマダラノメイガ	5000 倍						3 回以内	3 回以内	
かぶ	ハモグリバエ類			前日まで	2 回以内		2 回以内			
なす	アザミウマ類	2500 ～ 5000 倍						3 日前 まで	3 回以内	4 回以内 (定植前は 1 回以内、 本圃では3 回以内)
	オオタバコガ	5000 倍								
	アザミウマ類									
ピーマン	オオタバコガ	2500 ～ 5000 倍								
トマト ミニトマト	アザミウマ類 オオタバコガ ハモグリバエ類	5000 倍								
ししとう 甘長とうがらし	アザミウマ類	20000 倍								
レタス	オオタバコガ	2500 ～ 5000 倍	セル成型 育苗トレイ 1 箱 又は ペーパーポット 1 冊 (30 × 60cm・ 使用土壌 約3 ℓ) 当り 500 ml	定植前 まで	1 回	灌注	3 回以内 (定植前は 1 回以内、 本圃では2 回以内)			
	ヨトウムシ	5000 倍								
	非結球レタス	ハモグリバエ類						500 ～ 1000 倍	100 ～ 300 ℓ	7 日前 まで
オオタバコガ		2500 ～ 5000 倍	前日まで	3 回以内	3 回以内					
ヨトウムシ		5000 倍				7 日前 まで				
いちご	アザミウマ類	10000 倍								
きゅうり(葉)	アザミウマ類									

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	スビ/サドを含む農 薬の総使用回数
きゅうり(花)	アザミウマ類	10000 倍	100 ～ 300 ℓ	14 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
きゅうり メロン	ハモグリバエ類 アザミウマ類 ウリノメイガ	5000 倍		前日まで	2 回以内		2 回以内
すいか とうがん ズッキーニ ズッキーニ(花)	アザミウマ類	5000 ～ 10000 倍					
ねぎ わけぎ あさつき	シロイチモジヨトウ	5000 倍		3 日前 まで	3 回以内		3 回以内
にら にら(花茎)	アザミウマ類	2500 ～ 5000 倍		前日まで			
らっきょう		10000 倍		3 日前 まで			
にんにく		2500 倍		前日まで			
みつば	ハスモンヨトウ	5000 倍		7 日前ま で 但し、 伏せ込み 栽培は伏 せ込み前 まで	2 回以内		2 回以内
せり	アザミウマ類			前日まで			3 回以内
セルリー	ハモグリバエ類	2500 倍		3 日前 まで	3 回以内		
パセリ	ヨトウムシ			14 日前 まで	2 回以内		2 回以内
アスパラガス	アザミウマ類			前日まで	3 回以内		3 回以内
モロヘイヤ				3 日前 まで			
クレソン	コナガ						2 回以内
みょうが (花穂)	アザミウマ類	5000 倍		前日まで	2 回以内	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する	

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	スビ/サドを含む農 薬の総使用回数
みょうが (茎葉)	アザミウマ類	5000 倍	100 ～ 300 ℓ	みょうが (花穂) の収穫前 日まで 但し、花 穂を収穫 しない場 合にあつ ては開花 期終了ま で	2 回以内	散布	2 回以内
しそ科葉菜類 しそ(花穂)		10000 倍		3 日前 まで	3 回以内		3 回以内
つるな		2500 倍					1 回
さんしょう (葉)	アゲハ	10000 倍					3 回以内
よもぎ	アザミウマ類	5000 倍			1 回		
にんじん	ハモグリバエ類	4000 倍			3 回以内		
ふだんそう	ハスモンヨトウ	5000 倍		2 回以内	2 回以内		
未成熟ふじまめ 未成熟さざげ	アザミウマ類				3 回以内		
さやいんげん さやえんどう	ハモグリバエ類				2 回以内		
実えんどう 食用へちま	アザミウマ類 アシグロハモグリバエ シロオビノメイガ			2 回以内	3 回以内		
すいぜんじな エンサイ							2 回以内
ほうれんそう							
しよくようほおずき 食用ミニバラ	10000 倍			3 回以内			
食 用 花 (かんぞう(花)、 食用ぎく、 食用ミニバラ を除く)		3 回以内					
きく(葉)					5000 倍		
食 用 ぎく	ミカンキイロアザミウマ			10000 倍	発生初期		2 回以内
花き類・観葉植物 (ぎくを除く)	アザミウマ類	5000 倍					
きく	オオタバコガ	2500 ～ 5000 倍					
	アザミウマ類 ハモグリバエ類	5000 倍					
樹 木 類	ケムシ類	200 ～ 700 ℓ					