

スピロメシフェン水和剤 ダニゲッターフロアブル	取扱メーカー： バイエル 原体メーカー： バイエル
成分： スピロメシフェン〔環状ケトエノール系〕……………30.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 成虫に対しては遅効的だが卵・幼虫・若虫に対して高い効果を示す。
- 新規の作用性なので既存剤に感受性の低下した個体群に対しても高い効果を示す。
- 長期間ハダニの密度制効果を示す。
- ハダニ類のほかサビダニ類、ホコリダニ類、ミカントゲコナジラミに対しても高い効果を示す。
- 収穫前使用日数が短く、使いやすい薬剤である。
- 人畜・水産動植物に対しても高い安全性で、天敵・有用昆虫に影響の少ない薬剤である。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の表裏に丁寧に散布する。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布ムラの無いように丁寧に散布する。
- ハダニ類は薬剤抵抗性が発達しやすいので年1回の散布とし、作用性の異なる薬剤とのローテーションで使用する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- ボルドー液との同時散布及び前後14日以内の近接散布は効果が劣るおそれがあるので使用はさける。
- 成虫に対しては遅効的なので散布後、完全に葉からハダニがいなくなるまで1週間前後かかる。(ナミハダニの場合)
- 適用作物（日本なし、おうとう）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（水稻、キャベツ、はくさい、こまつな、ねぎ、ばら、シンビジウム等のラン類、みょうが）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- ぶどうに使用する場合は新芽、新葉に薬害を生じるおそれがあるので以下の事に注意する。
 - ぶどう未成木樹への散布はさける。
 - 品種「瀬戸ジャイアンツ」は薬害を生じるので使用はさける。
- 茶の覆下条件下では、新芽に薬害を生じるおそれがあるので萌芽前に使用する。

【安全対策上の注意】……………

- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。
- カブレやすい人は取扱いに十分注意する。



【適用と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	スピロメシフェンを含む農薬の総使用回数
りんご	リンゴハダニ ナミハダニ リンゴサビダニ	2000倍	200～ 700 ℓ	前日まで	1回	散布	1回
もも	ハダニ類						
ネクタリン	モモサビダニ						
小粒核果類 おうとう	ハダニ類						
なし	ハダニ類 ニセナシサビダニ						
かんきつ	ミカンハダニ ミカンサビダニ チャノホコリダニ チャノキイロアザミウマ						
ぶどう	ハダニ類						
茶	カンザワハダニ チャノナガサビダニ チャトゲコナジラミ チャノホコリダニ		200～ 400 ℓ	摘採7日前 まで			
りんどう	ナミハダニ	100～ 300 ℓ	発生初期				
チューリップ	チューリップサビダニ	500倍	—	植付前		15分間 球根 浸漬	