| テブフェノジド粉剤 ロムダン粉剤 DL | 取扱メーカー: 日農 原体メーカー : 日本曹達 |
|----------------------------------|--|
| 成分: テブフェノジド〔 I G R (脱皮促進剤)〕0.75% | 性状:類白色粉末45μm以下,浮遊性指数20以下 毒性:普通物 消防法:—— |

【品目特性】

- ●チョウ目幼虫の脱皮促進作用により殺虫活性を 示す。
- ●幼虫の発育齢にかかわらず高い効果を示す。
- ●低薬量で効果持続性に優れる。
- ●耐雨性に優れているので、散布後の降雨の影響を受けにくい。
- ●有用昆虫, 天敵類, 鳥類, 土壌微生物などにも 悪影響を及ぼさない。
- ●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

【使用上のポイント】…………

●幼虫の発生時期に合わせ散布する。

- ●散布後は水管理に注意する。
- ●甲殻類に影響を及ぼすので,使用時並びに使用 後も注意。





【適用と使用法】………

| 作物名 | 適用害虫名 | 10 a 当り 使用量 | 使用時期 (収穫前) | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | テブフェノジドを含 む農薬の総使用回数 |
|--------|--|----------------------|---------------|-------------|------|------------------------|
| 稲 | コブノメイガ ニカメイチュウ イネツトムシ フタオビコヤガ | $3\sim4~\mathrm{kg}$ | 14日前まで | 2回以内 | | 2回以内 |
| だいずいぐさ | ハスモンヨトウ イグサシンムシガ | | 生育期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| そば | ハスモンヨトウ | 4 kg | 21日前まで | 2回以内 | | 2回以内 |
| かんしょ | ナカジロシタバ ハスモンヨトウ | | 7日前まで | 3 回以内 | | 3回以内 |