

テブフェノジド水和剤 ロムダンフロアブル	取扱メーカー： 日農，北興 原体メーカー： 日本曹達
成分： テブフェノジド〔IGR（脱皮促進剤）PRTR・1種〕…20.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- ロムダン粉剤DLの項参照。
- フロアブル製剤なので薬液の調製が簡単で作物への汚れも少ない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

〈ヨトウムシ〉

- 発蛾最盛期5～10日後の幼虫発生期に散布する。

〈ハマキムシ類〉

- マメコバチ等訪花昆虫に影響が少ないのでりんごの開花期散布に適する。

〈茶の害虫〉

- チャハマキ主体の場合は発蛾最盛日5～10日後，チャノコカクモンハマキ主体の場合は3～7日後が散布適期。ヨモギエダシヤクには幼虫発生期に散布する。
- 共通注意事項8．適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】

- 蚕に対して長期間毒性があるので，養蚕地帯等では使用しない。また，これら以外の場所でも付近に桑園がある場合は飛散してかからないように十分注意して散布する。
- 眼に対して弱い刺激性がある。
- 共通注意事項6．街路・公園・堤とう等で使用する場合の注意事項を参照。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	テフエノジドを含む 農薬の総使用回数		
ぶ ど う	ケムシ類	3000倍	200～ 700 ℓ	前日まで	2 回以内	散布	2 回以内		
り ん ご	ハマキムシ類 キリガ類	1500～ 3000 倍							
	ケムシ類 シャクトリムシ類	3000 倍							
お う と う	ハマキムシ類								
も も	ハマキムシ類			7 日前まで	3 回以内				
ネクタリン な し	ケムシ類								
マンゴー	ドクガ類 ハマキムシ類	2000 倍	21 日前まで						
小粒核果類	ケムシ類	3000 倍							
はくさい キャベツ レ タ ス	ハスモンヨトウ	2000～ 4000 倍	前日まで	2 回以内		2 回以内			
い ち ご		2000 倍					3 日前まで	3 回以内	3 回以内
れんこん							21 日前まで	2 回以内	2 回以内
ほうれんそう							7 日前まで	3 回以内	3 回以内
ね ぎ	シロイチモジヨトウ								
にんじん	ヨトウムシ	2000～ 4000 倍	100～ 300 ℓ	前日まで	2 回以内	散布	2 回以内		
しょうが	ハスモンヨトウ	2000 倍			3 回以内		3 回以内		
そ ば				21 日前まで	2 回以内		2 回以内		
だ い ず				14 日前まで	3 回以内				
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	2000～ 3000 倍		7 日前まで				3 回以内	
さといも さといも(葉柄)	ハスモンヨトウ	2000 倍		前日まで					
てんさい	ヨトウムシ		14 日前まで						
茶	チャノコカクモンハマキ チャハマキ	1000 倍	200～ 400 ℓ	摘採 14 日 前 ま で	2 回以内		2 回以内		
	ヨモギエダシャク	2000 倍							
花 き 類・ 観 葉 植 物 (きくを除く)	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	1000 倍	100～ 300 ℓ	発生初期	5 回以内		5 回以内		
き く	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ オオタバコガ								
	と う き	キアゲハ						3000 倍	
樹 木 類	ケムシ類	2000～ 3000 倍	200～ 700 ℓ						