

ピラジフルミド水和剤 パレード20フロアブル	取扱メーカー： 協友アグリ，日農 原体メーカー： 日農
成分： ピラジフルミド〔コハク酸脱水素酵素阻害剤（SDHI）〕…20.0% その他 PRTR 該当成分： ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル〔PRTR・1種〕…1.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

●新規有効成分ピラジフルミドを配合した野菜用SDHI殺菌剤であり，菌核病，うどんこ病，灰色かび病といった幅広い病害に高い効果を発揮する。

●SDHI殺菌剤の中で唯一ピラジカルボキサミド骨格を持ち，病害への高い効果と，適用作物への高い安全性を実現している。

●天敵や有用昆虫，環境生物への影響が少なく，様々な場面で使い易い。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【薬効・薬害等の注意】

●共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】

●カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

【使用上のポイント】

●過度の連用はさけ，なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。

【適用と使用法】

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む 農薬の総使用回数
あ ず き いんげんまめ 豆類(未成熟)	菌核病 灰色かび病	2000～ 4000 倍	100～300 ℓ	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
ト マ ト ミニトマト	灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 菌核病						
	すすかび病	2000 倍					
な す	灰色かび病 すすかび病 菌核病 うどんこ病	2000～ 4000 倍	100～300 ℓ	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	灰色かび病 菌核病 うどんこ病 褐斑病						
き ゆ う り	灰色かび病 菌核病 うどんこ病 褐斑病						

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用流量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ビラジアルミドを含む 農薬の総使用回数
に が う り	うどんこ病	2000～ 4000 倍	100～300 ℓ	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
す い か	菌核病 うどんこ病 つる枯病						
メ ロ ン	つる枯病 うどんこ病 菌核病						
は く さ い	黒斑病 白斑病	100 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱又は、 ペーパーポット 1 冊 (約 30×60cm, 使用土壌 約 1.5～4ℓ) 当 り 0.5 ℓ	育苗期後 半～定植 当日	1 回	灌注	3回以内 (灌注は 1 回以内)
	菌核病						
キ ャ ベ ツ	菌核病 株腐病	2000～ 4000 倍	100～300 ℓ	収穫前日 まで	3回以内	散布	
	菌核病 苗立枯病 (リゾクトニア菌) 根朽病	100 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱又は、 ペーパーポット 1 冊 (約 30×60cm, 使用土壌 約 1.5～4ℓ) 当 り 0.5 ℓ	育苗期後 半～定植 当日	1 回	灌注	
ブロッコリー	菌核病 黒すす病	2000～ 4000 倍	100～300 ℓ	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
レ タ ス 非結球レタス	菌核病 灰色かび病 すす枯病						3回以内 (灌注は 1 回 以内)
	菌核病 すす枯病	100 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱又は、 ペーパーポット 1 冊 (約 30×60cm, 使用土壌 約 1.5～4ℓ) 当 り 0.5 ℓ	育苗期後 半～定植 当日	1 回	灌注	
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	2000～ 4000 倍	100～300 ℓ	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピラジフルミドを含む 農薬の総使用回数					
ね ぎ	黒腐菌核病	100 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱又は、ペーパー ポット 1 冊 (約 30×60cm、 使用土 壤 約 1.5～4ℓ) 当 り 0.5ℓ	育苗期後 半～定植 当日	1 回	灌注	3 回以内 (灌注は 1 回以内)					
	黒斑病 葉枯病 小菌核腐敗病	2000～ 4000 倍	100～300 ℓ	収穫前日 まで	3 回以内	散布						
	さび病 黒腐菌核病	2000 倍										
い ち ご	うどんこ病 灰色かび病	2000～ 4000 倍										
ピ ー マ ン	うどんこ病 黒枯病	2000～ 4000 倍		発病初期			3 回以内					
花き類・観葉植物 (ばら、きく、 りんどう、 トルコギキョウ を除く)	うどんこ病	4000 倍										
ば ら	うどんこ病 黒星病											
き く	白さび病	2000～ 4000 倍										
	うどんこ病	4000 倍										
り ん ど う	黒斑病 花腐菌核病	2000 倍										
	うどんこ病	4000 倍										
トルコギキョウ	斑点病	2000～ 4000 倍										