

スピノエースフロアブル

成分：スピノサド〔スピノシン系〕……20.0%

毒性：普通物

【適用と使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	スピノサドを含む 農薬の総使用回数				
稲 (箱育苗)	イネミズゾウムシ幼虫	200 倍	育苗箱 (30×60 ×3cm, 使用土壌 約5ℓ) 1箱当り 500ml	移植当日	1 回	灌注	1 回				
	イネドロオイムシ			移植3日 前～移植 当日							
かんきつ	ミカンハモグリガ アザミウマ類 ナミアゲハ	4000～6000倍	200～ 700ℓ	7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内				
	ヨモギエダシャク	4000 倍									
りんご	キンモンホソガ ハマキムシ類	2000～3000倍		3 日前 まで	3 回以内			3 回以内			
	モモシンクイガ	2000 倍									
もも	シンクイムシ類	2000～4000倍			2 回以内						
	ミカンキイロアザミウマ	4000～6000倍									
	モモハモグリガ	2000～6000倍									
リンゴコカクモンハマキ	4000 倍										
すもも	スモモヒメシンクイ	2000～4000倍			2 回以内						
ネクタリン	シンクイムシ類	4000～6000倍									
	ミカンキイロアザミウマ	2000～6000倍									
	モモハモグリガ	4000 倍									
	リンゴコカクモンハマキ	4000 倍									
さんしょう (果実)	アザミウマ類	5000 倍	1 回	1 回							
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノキイロアザミウマ	2000～4000倍	200～ 400ℓ	摘採 7 日前 まで	2 回以内		2 回以内				
	チャハマキ ヨモギエダシャク	4000 倍									

〔取扱メーカー〕 ダウ