

<b>フィプロニル・チアジニル・フラメトピル粒剤</b> <b>バイゲットプリンスリンバー L 粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> クミカ <sup>*</sup> 、日農、住友化学  <b>原体メーカー：</b> B A S F、日農、住友化学
<b>成分：</b> フィプロニル〔フェニルピラゾール系 PRTR・1 種〕…1.0% チアジニル……………6.0% フラメトピル〔酸アミド系〕……………4.0%	<b>性状：</b> 淡褐色細粒  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【適用と使用方法】 .....

作物名	適用病害虫名	1箱 <sup>*</sup> 当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 紋枯病 ウンカ類 ニカメイチュウ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ コブノメイガ イネツトムシ 白葉枯病	50 g	緑化期～ 移植当日	本剤の所定量を 育苗箱中の苗の 上から均一に散 布する。	本剤 1 回 フィプロニル 1 回 チアジニル 3 回以内 (移植時までの処理は 1 回以 内、本田での散布は 2 回以内) フラメトピル 2 回以内 (移植時までの処理は 1 回以 内)
	もみ枯細菌病		移植 3 日前 ～移植当日		
	内穎褐変病		移植当日		

\* 育苗箱は 30×60×3 cm、使用土壌約 5 ℓ