

ブタミホス粒剤 クレマートU粒剤	取扱メーカー： サンケイ、北興、住友化学 原体メーカー： 住友化学
成分： ブタミホス〔有機リン系 PRTR・1種〕……………3.0%	性状： 灰白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 一年生雑草、特にイネ科雑草に有効な畑作用除草剤。
- 他はクレマート乳剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 砕土、整地、覆土は丁寧に均一に散布する。
- 雑草発生前処理の効果は大きいが既発生の雑草には効果が劣るので、必ず雑草発生前に全面に均一に散布する。
- 多年生雑草、キク科雑草及びツクサには効果が劣るので、それらが優占する圃場での使用はさける。
- 土壌が極度に乾燥している場合は効果が劣るので土壌が適度の水分を含んでいる時に使用する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- こんにやく、らっかせい、かんしょなどに使用する場合は特に砕土、整地、覆土は丁寧に均一に散布する。
- 適用作物（全般、たばこ、桑、キャベツ）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（周辺作物）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- くわい、せりに使用する場合、砂質土壌の水田や漏水田（減水深2cm/日以上）への使用はさける。又、散布後少なくとも7日間はそのまま湛水状態を保ち、落水、かけ流しはしない。

【安全対策上の注意】……………

- 魚類、甲殻類、藻類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。
- 共通注意事項6、街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。



【適用と使用法】……………

作物名	適用雑草名	使用時期	10a 当り 使用量	本剤の 使用回数	使用方法	ブタミホスを含む 農薬の総使用回数
たまねぎ	一年生雑草	春播栽培の定植後 （雑草発生前） 但し収穫60日前まで	5～7kg	1回	全面土壌 散布	1回
すいか 漬物用すいか メロン 漬物用メロン		秋播栽培の定植後又は 春季の雑草発生前 但し収穫60日前まで	4～6kg			
		定植・マルチ前 （雑草発生前）				

作物名	適用雑草名	使用時期	10a 当り 使用量	本剤の 使用回数	使用方法	ブタミホスを含む 農薬の総使用回数
キャベツ	一年生雑草	定植前～定植直後 (雑草発生前)	4～6kg	1回	全面土壌 散布	1回
トマト		定植活着後 (雑草発生前) 但し定植10日後まで			畦間株間 土壌散布	
ねぎ わけぎ あさつき					全面土壌 散布	
やまのいも さといも にんにく		植付後萌芽前 (雑草発生前)	5～6kg			
ばれいしょ		は種後発芽前 (雑草発生前)				
らっかせい にんじん						
パセリ		一年生広葉雑草				
こんにゃく	一年生雑草	植付後又は培土後 (雑草発生前) 但し収穫120日前まで	4～6kg		全面土壌 散布	1回
かんしょ		挿苗後 (雑草発生前) 挿苗3日後まで				
にら		定植後 (雑草発生前) 但し定植10日後まで				
きゅうり		定植前 (雑草発生前)			畦間株間 土壌散布	
		定植後 (雑草発生前) 但し定植10日後まで				
くわい		植付後出芽前 (雑草発生前)	5kg		湛水散布	
せり		親株養成期 (雑草発生前)	3～5kg			
やまのいも (むかご)		植付後萌芽前 (雑草発生前)	4kg		全面土壌 散布	3回以内
きく		定植後 (雑草発生前)	4～6kg			
つつじ類 さざんか		植付後又は生育期 (雑草発生前)		3回以内		
桑			春季桑発芽前および 夏季収穫後発芽前 (雑草発生前)	8～10kg	2回以内	2回以内
たばこ (折衷マル チ栽培)			植付10日前まで (雑草発生前)	4kg	1回	1回