


0.1 Symmetri



Bilder hentet fra [freessvg.org](https://www.freepress.org/).

Mange figurer kan deles inn i minst to deler hvor den éne delen bare er en forskjøvet, speilvendt eller rotert utgave av den andre. Dette kalles *symmetri*. De tre kommende regelboksene definerer de tre variantene for symmetri, men merk dette: Symmetri blir som regel intuitivt forstått ved å studere figurer, men er omstendelig å beskrive med ord. Her vil det derfor, for mange, være en fordel å hoppe rett til eksemplene.

0.1 Translasjonssymmetri (parallellforskyvning)


En symmetri hvor minst to deler er forskjøvnede utgaver av hverandre kalles en *translasjonssymmetri*.

Når en form forskyves, blir hvert punkt på formen flyttet langs den samme vektoren¹.

¹En vektor er et linjestykke med retning.

Eksempel 1


Figuren under viser en translasjonssymmetri som består av to sommerfugler.




Bilde hentet fra [freessvg.org](https://www.freepress.org/).

Eksempel 2

Under vises $\triangle ABC$ og en blå vektor.



Under vises $\triangle ABC$ forskjøvet med den blå vektoren.




0.2 Speiling

En symmetri hvor minst to deler er vendte utgaver av hverandre kalles en *speilingssymmetri* og har minst én *symmetrilinje* (*symmetriakse*).

Når et punkt speiles, blir det forskjøvet vinkelrett på symmetrilinja, fram til det nye og det opprinnelige punktet har samme avstand til symmetrilinja.


Eksempel 1

Sommerfuglen er en speilsymmetri, med den røde linja som symmetrilinje.




Eksempel 2

Den røde linja og den blå linja er begge symmetrilinjer til det grønne rektangelet.



Eksempel 3

Under vises en form laget av punktene A, B, C, D, E og F , og denne formen speilet om den blå linja.



0.3 Rotasjonssymmetri

En symmetri hvor minst to deler er en rotert utgave av hverandre kalles en *rotasjonssymmetri* og har alltid et tilhørende *rotasjonspunkt* og en *rotasjonsvinkel*.


Når et punkt roteres vil det nye og det opprinnelige punktet

- ligge langs den samme sirkelbuen, som har sentrum i rotasjonspunktet.
- med rotasjonspunktet som toppunkt danne rotasjonsvinkelen.

Hvis rotasjonsvinkelen er et positivt tall, vil det nye punktet forflyttes langs sirkelbuen *mot* klokka. Hvis rotasjonsvinkelen er et negativt tall, vil det nye punktet forflyttes langs sirkelbuen *med* klokka.

Eksempel 1


Mønsteret under er rotasjonssymmetrisk. Rotasjonssenteret er i midten av figuren og rotasjonsvinkelen er 120°



Bilde hentet fra freesvg.org.

Eksempel 2

Figuren under viser $\triangle ABC$ rotert 80° om rotasjonspunktet P .



Da er

$$PA = PA' \quad , \quad PB = PB' \quad , \quad PC = PC'$$

og


$$\angle APA' = \angle BPB' = \angle CPC' = 80^\circ$$

Språkboksen


En form som er en forskjøvet, speilvendt eller rotert utgave av en annen form, kalles en *kongruensavbildning*.

0.2 Tredimensjonal geometri

I [MB](#) har vi sett på todimensjonale figurer som trekanter, firkanter, sirkler o.l. Alle todimensjonale figurer kan tegnes inn i et koordinatsystem med to akser.




For å tegne *tredimensjonale* figurer trengs derimot tre akser:



Mens et rektangel sies å ha en bredde og en høyde, kan vi si at boksen over har en bredde, en høyde og en lengde (dybde).


Området som "ligger utenpå" en tredimensjonal figur kaller vi *overflaten*. Overflaten til boksen over består av 6 rektangler. Mangekanter som er deler av en overflate kalles *sideflater*.

0.4 Tredimensjonale figurer




Firkantet prisme

Har to like og fire like rektangler som sideflater. Alle sideflatene som er i kontakt, står vinkelrette på hverandre.




Kube

Firkantet prisme med kvadrater som sideflater.




Trekantet prisme

To av sideflatene er like trekanter som er parallelle. Har tre sideflater som er trekanter.




Firkantet pyramide

Har ett rektangel og fire trekanter som sideflater.



Trekantet pyramide

Har fire trekanter som sideflater.



Kjegle

En del av overflaten er en sirkel, den resterende delen er en sammenbrettet sektor.


Tips

Det er ikke så lett å se for seg hva en *sammenbrettet sektor* er, men prøv dette:


1. Tegn en sektor på et ark. Klipp ut sektoren, og føy sammen de to kantene på sektoren. Da har du en kjegle uten bunn.

0.3 Volum


Når vi ønsker å si noe om hvor mye det er plass til inni en gjenstand, snakker vi om *volumet* tilden. Som et mål på volum tenker vi oss en kube med sidelengde 1.



En slik kube kan vi kalle 'enerkuben'. Si vi har en firkantet prisme med bredde 3, lengde 4 og høyde 2.



I denne er det plass til akkurat 24 enerkuber.



Dette kunne vi ha regnet slik:


$$3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$$

Altså

bredde \cdot lengde \cdot høyde

Grunnflate

For å regne ut volumet til de mest elementære figurene vi har, kan det være lurt å bruke begrepet *grunnflate*. Slik som for en grunnlinje¹, er det vårt valg av grunnflate som avgjør hvordan vi skal regne ut høyden. For prismet fra forrige side, er det naturlig å velge flaten som ligger horisontalt til å være grunnflaten, og for å indikere dette skrives ofte bokstaven G :



Grunnflaten har arealet $3 \cdot 4 = 12$, mens høyden er 2. Volumet til hele prismet er grunnflatens areal ganget med høyden:

$$\begin{aligned} V &= 3 \cdot 4 \cdot 2 \\ &= G \cdot 2 \\ &= 24 \end{aligned}$$

Grunnflaten eller grunnflatearealet?


I teksten over har vi først kalt selve grunnflaten for G , og så brukt G for *grunnflatearealet*. I denne boka er begrepet *grunnflate* så sterkt knyttet til *grunnflatearealet* at vi ikke skiller mellom disse to.

¹se MB, s. 81.


0.5 Volum

Volumet V til en firkantet prisme eller en sylinder med grunnflate G og høyde h er

$$V = G \cdot h$$




Firkantet prisme




Sylinder

Volumet V til en kjegle eller en pyramide med grunnflate G og høyde h er

$$V = \frac{G \cdot h}{3}$$




Kjegle



Firkantet pyramide


Merk

Formlene fra [Regel 0.5](#) gjelder også for prismer, sylindre, kjegler og pyramider som heller (er skjeve). Hvis grunnflaten er plassert horisontalt, er høyden den vertikale avstanden mellom grunnflaten og toppen til figuren.



(For spisse gjenstander som kjegler og pyramider finnes det selvsagt bare ett valg av grunnflate.)

Eksempel 1



En sylinder har radius 7 og h  gde 5.

- a) Finn grunnflaten til sylindren.
- b) Finn volumet til sylindren.

Svar:

- a) Vi har at¹:

$$\begin{aligned}\text{grunnflate} &= \pi \cdot 7^2 \\ &= 49\pi\end{aligned}$$


- b) Dermed er

$$\begin{aligned}\text{volumet til sylindren} &= 49\pi \cdot 6 \\ &= 294\pi\end{aligned}$$

¹se [MB](#), s. 140.

Eksempel 2

En firkantet pyramide har lengde 2, bredde 3 og høyde 5.



a) Finn grunnflaten til pyramiden.

b) Finn volumet til pyramiden.

Svar:

a) Vi har at¹

$$\begin{aligned}\text{grunnflate} &= 2 \cdot 3 \\ &= 6\end{aligned}$$

b) Dermed er


$$\begin{aligned}\text{volumet til pyramiden} &= 6 \cdot 5 \\ &= 30\end{aligned}$$

¹se [MB](#), s. 140.

0.6 Volumet til ei kule

Volumet V til ei kule med radius r er:


$$V = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^3}{3}$$



0.4 Omkrets, areal og volum med enheter

Når vi måler lengder med linjal eller lignende, må vi passe på å ta med enhetene i svaret vårt.

Eksempel 1



$$\begin{aligned}\text{Omkretsen til rektangelet} &= 5 \text{ cm} + 2 \text{ cm} + 5 \text{ cm} + 2 \text{ cm} \\ &= 14 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Arealet til rektangelet} &= 2 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} \\ &= 2 \cdot 5 \text{ cm}^2 \\ &= 10 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Vi skriver cm^2 fordi vi har ganget sammen 2 lengder som vi har målt i cm.

Eksempel 2

En sylinder har radius 4 m og høyde 2 m. Finn volumet til sylindren.

Svar:

Så lenge vi er sikre på at størrelsene vår har samme enhet (i dette tilfellet meter), kan vi først rekne uten størrelser:

$$\begin{aligned}\text{grunnflate til sylindren} &= \pi \cdot 4^2 \\ &= 16\pi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{volumet til sylindren} &= 16\pi \cdot 2 \\ &= 32\pi\end{aligned}$$

Vi har her ganget sammen tre lengder (to faktorer lik 4 m og én faktor lik 2 m) med meter som enhet, altså er volumet til sylindren $32\pi \text{ m}^3$.

Merk

Når vi skal finne volumet til gjenstander, måler vi lengder som høyde, bredde, radius osv., men i det daglige oppgir vi gjerne volum i liter. Da er det verdt å ha med seg at

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$$