

1.1 Introduction

Незважаючи на те, що кожний математичний вираз, що включає $=$, є рівнянням, традиційно це слово тісно пов'язане з наявністю невідомого числа.

Припустимо, ми хочемо знайти число, яке, будучи доданим до 4, дає в результаті 7. Назву цього невідомого числа можна вибрати довільно, але зазвичай його називають x . Наше рівняння тепер можна записати як

$$x + 4 = 7$$

Значення x^1 , яке робить значення з обох сторін знака рівності однаковими, є розв'язком рівняння. Нічого поганого в тому, щоб просто спостерігати, яким має бути значення x . Ймовірно, ви вже зрозуміли, що $x = 3$ є розв'язком рівняння, оскільки

$$3 + 4 = 7$$

Проте, більшість рівнянь важко розв'язати, просто спостерігаючи, тому мудро користуватися більш загальними методами. Насправді, існує лише один принцип, якому слід слідувати:

Ми завжди можемо виконати математичну операцію на одній із сторін знака рівності, якщо ми виконуємо операцію й на іншій стороні.

Математичні операції, представлені в цій книзі, є чотирма елементарними операціями. Стосовно цих принцип звучить так:


Ми завжди можемо додавати, віднімати, множити чи ділити на число з однієї сторони знака рівності, якщо ми також робимо це з іншої сторони.

Принцип впливає зі значення $=$. Коли два вирази мають однакову вартість, їхні значення залишаються однаковими, доки ми виконуємо ідентичні математичні операції з ними. У наступному розділі ми конкретизуємо цей принцип для кожної окремої елементарної операції. Якщо вам вже все зрозуміло, ви можете без великої втрати розуміння перейти до [Section 1.3](#).

¹У інших випадках може бути кілька значень.

1.2 Solving with the elementary operations

На малюнках цього розділу ми зрозуміємо рівняння з того, що ми називаємо принципом ваги. У цьому випадку \neq вказує¹ на те, що вага (або значення) зліва і справа є однаковою.




Додавання та віднімання; перенесення членів

Перший приклад


Ми вже знайшли розв'язок цього рівняння, але зараз давайте розв'яжемо його іншим способом²:

$$x + 4 = 7$$




Значення x стає очевидним, якщо x залишиться сам на одній із сторін, і ми можемо ізолювати x з лівого боку, видаляючи 4. Але якщо ми збираємося видалити 4 з лівого боку, ми також повинні видалити 4 з правого боку, щоб зберегти рівні значення з обох сторін.

$$x + 4 - 4 = 7 - 4$$



Оскільки $4 - 4 = 0$ і $7 - 4 = 3$, ми отримуємо

$$x = 3$$



¹ \neq символи "не дорівнює".

² Note: На попередніх малюнках розмір коробок відповідав (абсолютній) величині числа, яке вони представляли. Це не стосується коробок, які представляють x .

Це можна записати стисліше так

$$\begin{aligned}x + 4 &= 7 \\x &= 7 - 4 \\x &= 3\end{aligned}$$

Між першою і другою лініями зазвичай кажуть, що 4 змінило сторону і тому також знак (з + на -).

Другий приклад

Перейдемо до трохи складнішого рівняння¹:

$$4x - 2 = 3x + 5$$

Щоб отримати вираз з x виключно на одному боці, ми видаляємо $3x$ з обох сторін:

$$4x - 2 - 3x = 3x + 5 - 3x$$

Тепер,

$$x - 2 = 5$$

Щоб ізолювати x , ми додаємо 2 з лівого боку. Тоді ми також повинні додати 2 з правого боку:

$$x - 2 + 2 = 5 + 2$$

Отже

$$x = 7$$

Кроки, які ми зробили, можна підсумувати так:

$4x - 2 = 3x + 5$	1. малюнок
$4x - 3x - 2 = 3x - 3x + 5$	2. малюнок
$x - 2 = 5$	3. малюнок
$x - 2 + 2 = 5 + 2$	4. малюнок
$x = 7$	5. малюнок

Стисліше можна записати

$$\begin{aligned}4x - 2 &= 3x + 5 \\4x - 3x &= 5 + 2 \\x &= 7\end{aligned}$$

¹Зверніть увагу, що малюнок ілюструє $4x + (-2)$ (див. [Section ??](#)) з лівого боку. Однак, $4x + (-2)$ дорівнює $4x - 2$ (див. [Section ??](#)).

1.1 Переміщення чисел через знак рівності

Щоб розв'язати рівняння, ми збираємо всі x -члени і всі відомі члени на відповідних сторонах знака рівності. Член, який переходить на іншу сторону, також змінює знак.

Example 1

Розв'яжіть рівняння

$$3x + 5 = 2x + 9$$

Answer

$$\begin{aligned} 3x - 2x &= 9 - 5 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Example 2

Розв'яжіть рівняння

$$-4x - 3 = -5x + 12$$

Answer

$$\begin{aligned} -4x + 5x &= 12 + 3 \\ x &= 15 \end{aligned}$$

Множення та ділення

Ділення

Досі ми вивчали рівняння, які призводили до одного випадку x на одній стороні знаку рівності. Часто x зустрічається кілька разів, як, наприклад, у рівнянні

$$3x = 6$$

x	x	x

 =

Якщо ми розділимо лівий бік на три рівні групи, то отримаємо одне x в кожній групі. І, розділяючи праву сторону на три рівні групи, всі групи мають однакову вартість

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline x \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline x \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline x \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}$$

Отже

$$x = 2$$

$$\begin{array}{|c|} \hline x \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \end{array}$$

Підсумуємо наші обчислення:

$$3x = 6$$

1. малюнок

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$$

2. малюнок

$$x = 2$$

3. малюнок

1.2 Ділення обох сторін рівняння

Ми можемо ділити обидві сторони рівняння на одне і те ж число.

Example 1

Розв'язати рівняння

$$4x = 20$$

Answer

$$\begin{aligned}\cancel{4}x &= \frac{20}{\cancel{4}} \\ x &= 5\end{aligned}$$

Example 2

Розв'язати рівняння

$$2x + 6 = 3x - 2$$

Answer

$$\begin{aligned}2x - 3x &= -2 - 6 \\ -x &= -8 \\ \cancel{-1}x &= \frac{-8}{\cancel{-1}} && (-x = -1x) \\ x &= 8\end{aligned}$$

Множення

Давайте розв'яжемо рівняння

$$\frac{x}{3} = 4$$

$$\boxed{\frac{x}{3}} = \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}$$

Ми можемо отримати одиничне x зліва, якщо додамо ще два випадки $\frac{x}{3}$. Рівняння вказує, що $\frac{x}{3}$ дорівнює 4, це означає, що на кожний випадок $\frac{x}{3}$, який ми додаємо зліва, ми повинні додати 4 справа, щоб зберегти баланс.

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{3} + \frac{x}{3} = 4 + 4 + 4$$

$$\boxed{\frac{x}{3}} + \boxed{\frac{x}{3}} + \boxed{\frac{x}{3}} = \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}$$

Тепер ми помічаємо, що $\frac{x}{3} + \frac{x}{3} + \frac{x}{3} = \frac{x}{3} \cdot 3$ і $4 + 4 + 4 = 4 \cdot 3$:

$$\frac{x}{3} \cdot 3 = 4 \cdot 3$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline \frac{x}{3} & \frac{x}{3} & \frac{x}{3} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \square & \square & \square & \square \\ \hline \square & \square & \square & \square \\ \hline \square & \square & \square & \square \\ \hline \end{array}$$

Оскільки $\frac{x}{3} \cdot 3 = x$ і $4 \cdot 3 = 12$, ми маємо

$$x = 12$$

$$\boxed{x} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \square & \square & \square & \square \\ \hline \square & \square & \square & \square \\ \hline \square & \square & \square & \square \\ \hline \end{array}$$

Наші кроки можна підсумувати таким чином:

$$\frac{x}{3} = 4$$

1. малюнок

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{3} + \frac{x}{3} = 4 + 4 + 4$$

2. малюнок

$$\frac{x}{3} \cdot 3 = 4 \cdot 3$$

3. малюнок

$$x = 12$$

4. малюнок

У стислішій формі це можна записати як

$$\frac{x}{3} = 4$$

$$\frac{x}{3} \cdot 3 = 4 \cdot 3$$

$$x = 12$$

1.3 Множення обох сторін рівняння

Ми можемо множити обидві сторони рівняння на одне і те ж число.

Example 1

Розв'яжіть рівняння

$$\frac{x}{5} = 2$$

Answer

$$\begin{aligned}\frac{x}{\cancel{5}} \cdot \cancel{5} &= 2 \cdot 5 \\ x &= 10\end{aligned}$$

Example 2

Розв'яжіть рівняння

$$\frac{7x}{10} - 5 = 13 + \frac{x}{10}$$

Answer

$$\frac{7x}{10} - \frac{x}{10} = 13 + 5$$

$$\frac{6x}{10} = 18$$

$$\frac{\cancel{6}x}{\cancel{10}} \cdot \cancel{10} = 18 \cdot 10$$

$$6x = 180$$

$$\frac{\cancel{6}x}{\cancel{6}} = \frac{180}{6}$$

$$x = 30$$

1.3 Solving with elementary operations summarized

1.4 Методи розв'язання з використанням елементарних операцій

Ми завжди можемо

- додавати або віднімати однакове число з обох боків рівняння. Це еквівалентно перенесенню терміну з одного боку на інший, також змінюючи знак терміну.
- множити або ділити обидва боки рівняння на одне і те ж число.

Example 1

Розв'яжіть рівняння

$$3x - 4 = 6 + 2x$$

Answer

$$\begin{aligned} 3x - 2x &= 6 + 4 \\ x &= 10 \end{aligned}$$

Example 2

Розв'яжіть рівняння

$$9 - 7x = -8x + 3$$

Answer

$$\begin{aligned} 8x - 7x &= 3 - 9 \\ x &= -6 \end{aligned}$$

Example 3

Розв'яжіть рівняння

$$10x - 20 = 7x - 5$$

Answer

$$10x - 7x = 20 - 5$$

$$3x = 15$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$$

$$x = 5$$

Example 4

Розв'яжіть рівняння

$$15 - 4x = x + 5$$

Answer

$$15 - 5 = x + 4x$$

$$10 = 5x$$

$$\frac{10}{5} = \frac{5x}{5}$$

$$2 = x$$

Note: У інших прикладах ми вирішили збирати випадки x з лівого боку рівняння, але ми можемо так само зібрати їх і з правого боку. Зробивши це тут, ми уникли обчислень з від'ємними числами.

Example 5

Розв'яжіть рівняння

$$\frac{4x}{9} - 20 = 8 - \frac{3x}{9}$$

Answer

$$\frac{4x}{9} + \frac{3x}{9} = 20 + 8$$

$$\frac{7x}{9 \cdot 7} = \frac{28}{7}$$

$$\frac{x}{9} \cdot 9 = 4 \cdot 9$$

$$x = 36$$

Example 6

Розв'яжіть рівняння

$$\frac{1}{3}x + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}x + 2$$

Answer

Щоб уникнути дробів, множимо обидві сторони на спільний знаменник 12:

$$\left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{6}\right) 12 = \left(\frac{5}{12}x + 2\right) 12 \quad (1.1)$$

$$\frac{1}{3}x \cdot 12 + \frac{1}{6} \cdot 12 = \frac{5}{12}x \cdot 12 + 2 \cdot 12 \quad (*)$$

$$4x + 2 = 5x + 24 \quad (1.2)$$

$$4x - 5x = 24 - 2 \quad (1.3)$$

$$-x = 22 \quad (1.4)$$

$$\cancel{1}x = \frac{22}{\cancel{-1}} \quad (1.5)$$

$$x = -22 \quad (1.6)$$

Порада

Деякі вважають за краще правило, що "ми можемо множити або ділити всі терміни на одне й те ж число". У цьому випадку ми могли б перейти до другого рядка у обчисленнях згаданого прикладу.

Example 7

Розв'яжіть рівняння

$$3 - \frac{6}{x} = 2 + \frac{5}{2x}$$

Answer

Множимо обидві сторони на спільний знаменник $2x$:

$$2x \left(3 - \frac{6}{x} \right) = 2x \left(2 + \frac{5}{2x} \right)$$

$$6x - 12 = 4x + 5$$

$$6x - 4x = 5 + 12$$

$$2x = 17$$

$$x = \frac{17}{2}$$

1.4 Рівняння зі степенями

Давайте розв'яжемо рівняння

$$x^2 = 9$$

Це називається *ступеневим рівнянням*. Загалом, ступеневі рівняння важко розв'язати, застосовуючи лише чотири елементарні операції. Застосовуючи правила ступенів, підносимо обидві сторони до ступеня, оберненого до показника ступеня при x :

$$(x^2)^{\frac{1}{2}} = 9^{\frac{1}{2}}$$

За [Rule ??](#), маємо

$$x^{2 \cdot \frac{1}{2}} = 9^{\frac{1}{2}}$$

$$x = 9^{\frac{1}{2}}$$

Оскільки $3^2 = 9$, маємо $9^{\frac{1}{2}} = 3$. Тепер зверніть увагу:

Принцип, викладений на сторінці 1 каже, що ми можемо, як ми щойно зробили, виконувати математичну операцію на обох сторонах рівняння. Однак, дотримання цього принципу не гарантує, що будуть знайдені всі розв'язки.

Стосовно нашого рівняння, ми знаємо, що $x = 3$ є розв'язком. Заради цього ми можемо підтвердити це обчисленням

$$3^2 = 3 \cdot 3 = 9$$

Але ми також маємо

$$(-3)^2 = (-3)(-3) = 9$$

Отже, -3 також є розв'язком нашого оригінального рівняння!

1.5 Ступеневі рівняння

Рівняння, яке можна записати як

$$x^a = b$$

де a і b є сталими, є *ступеневим рівнянням*.

Рівняння має a різних розв'язків.

Example 1

Розв'яжіть рівняння

$$x^2 + 5 = 21$$

Answer

$$x^2 + 5 = 21$$

$$x^2 = 21 - 5$$

$$x^2 = 16$$

Оскільки $4 \cdot 4 = 16$ і $(-4) \cdot (-4) = 16$, маємо

$$x = 4 \quad \vee \quad x = -4$$

Example 2

Розв'яжіть рівняння

$$3x^2 + 1 = 7$$

Answer

$$3x^2 = 7 - 1$$

$$3x^2 = 6$$

$$\frac{3x^2}{3} = \frac{6}{3}$$

$$x^2 = 2$$

Отже,

$$x = \sqrt{2} \quad \vee \quad x = -\sqrt{2}$$

Note

Хоча рівняння

$$x^a = b$$

має a розв'язків, вони не обов'язково всі дійсні¹. Стосовно цієї книги, це означає, що ми задовольняємося знаходженням усіх раціональних або ірраціональних чисел, які розв'язують рівняння. Наприклад,

$$x^3 = 8$$

має 3 розв'язки, але ми задовольняємося з розв'язком $x = 2$.

¹Як зазначалося раніше, дійсні та уявні числа виходять за рамки цієї книги.