

TEORETISK MATEMATIKK 1

TEORETISK MATEMATIKK 1

Sindre Sogge Heggen

Utgave nr. 1 2026

Opplag nr. 1 2026

Trykk: Merkur Grafisk AS, Langhus

ISBN 978-82-694462-1-0

This book is part of the [OpenMathBooks](#) project. OpenMathBooks © 2022 by Sindre Sogge Heggen is licensed under CC BY-NC-SA 4.0. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Innhold

1	Mengder og vilkår	11
1.1	Mengder	12
1.2	Vilkår	17
	Oppgaver	19
2	Algebra	21
2.1	Faktorisering	22
2.2	Andregradslikninger	27
2.3	Polynomdivisjon	30
2.4	Eulers tall	36
2.5	Logaritmer	37
2.6	Forklaringer	40
	Oppgaver	42
3	Geometri	55
3.1	Definisjoner	56
3.2	Egenskaper til sirkler	59
3.3	Egenskaper til trekanter	60
3.4	Forklaringer	65
	Oppgaver	74
4	Vektorer	85
4.1	Definisjoner	86
4.2	Regneregler for vektorer	89
4.3	Lengden til en vektor	91
4.4	Skalarproduktet	92
4.5	Vektorer vinkelrett på hverandre	95
4.6	Parallelle vektorer	97
4.7	Vektorfunksjoner	99
4.8	Sirkellikningen	102
4.9	Determinanter	104
4.10	Forklaringer	108
	Oppgaver	110
5	Grenseverdier og kontinuitet	121
5.1	Grenseverdier	122
5.2	Kontinuitet	126
	Oppgaver	128
6	Derivasjon	131
6.1	Definisjoner	132
6.2	Derivasjonsregler	135
6.3	Derivasjon av vektorfunksjoner	144
6.4	Forklaringer	146
	Oppgaver	152

7 Funksjonsdrøfting	163
7.1 Monotoniegenskaper	164
7.2 Ekstremalpunkt, vendepunkt og infleksjons-punkt	167
7.3 Asymptoter	173
7.4 Injektive og omvendte funksjoner	175
7.5 Forklaringer	178
Oppgaver	180
Vedlegg A-F	195
Indeks	210
Fasit	211

Nettside

På openmath.online finner du brukerveiledninger for elever og lærere, løsningsforslag og mye mer.

Takk til

Takk til Eskil Reikvam Briseid for korrekturlesing¹, og for å ha laget oppgaven [gruble 116](#).

¹Alle feil i boka er forfatterens fulle ansvar, og trolig lagt til etter korrekturlesingen.

Symboler

D_f	–	definisjonsmengden til f
V_f	–	verdimengden til f
$\in$	–	”inneholdt i”
$\vee$	–	”eller”
$\mathbb{R}$	–	de reelle tallene
$\mathbb{N}$	–	de naturlige tallene $\{1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{Z}$	–	heltallene $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
$[a, b]$	–	lukket intervall fra og med a til og med b
$[a, b)$	–	halvåpent intervall fra og med a til b
(a, b)	–	åpent intervall fra a til b
$ a $	–	absoluttverdien/tallverdien/lengden til a
$\perp$	–	”vinkelrett på”
$\parallel$	–	”parallel med”
$\Longleftrightarrow$	–	”hvis og bare hvis” (om det éne er sant, er også det andre sant.)

Kapittel 1

Mengder og vilkår

1.1 Mengder

Definisjon

En samling av tall kalles en **mengde**¹, og et tall som er en del av en mengde kalles et **element**. Mengder kan inneholde et endelig antall elementer og de kan inneholde uendelig mange elementer.

1.1 Mengder

For to reelle tall a og b , hvor $a \leq b$, har vi at

- $[a, b]$ er mengden av alle tall større eller lik a og mindre eller lik b .
- $(a, b]$ er mengden av alle tall større enn a og mindre enn eller lik b .
- $[a, b)$ er mengden av alle reelle tall større eller lik a og mindre enn b .
- (a, b) er mengden av alle reelle tall større enn a og mindre enn b .

$[a, b]$ kalles et **lukket intervall**, (a, b) kalles et **åpent intervall**, og både $(a, b]$ og $[a, b)$ kalles **halvåpne intervall**. a og b er **endepunktene** til intervallet.

Mengden som inneholder bare a og b skrives som $\{a, b\}$.

At x er et element i en mengde M skrives som $x \in M$.

At x ikke er et element i en mengde M skrives som $x \notin M$.

At mengden M består av mengdene M_1 og M_2 skrives som $M = M_1 \cup M_2$.

At x er utelatt av en mengde M skrives som $M \setminus \{x\}$.

At både x og y er et element i en mengde M skrives som $x, y \in M$

¹En mengde kan også være en samling av andre matematiske objekter, som for eksempel funksjoner, men i denne boka holder det å se på mengder av tall.

Språkboksen

$x \in M$ uttales ” x inneholdt i M ”.

Mange tekster bruker $\langle$ i stedet for $($ for å indikere åpne (eller halvåpne) intervall.

Hvis $I = (a, b)$ og $c \in I$, sier vi at I er et åpent intervall om c .

Merk

Når vi heretter i boka definerer et intervall beskrevet av a og b , tar vi det for gitt at a og b er tall, og at $a \leq b$.

Eksempel 1

Mengden av alle heltall større enn 0 og mindre enn 10 kan vi skrive som

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

Denne mengden inneholder 9 elementer. 3 er et element i denne mengden, og da kan vi skrive $3 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

10 er ikke et element i denne mengden, og da kan vi skrive $10 \notin \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

Eksempel 2

I uttrykket $0 \leq x \leq 1$, erstatt begge $\leq$ med ulikhetssymbol slik at uttrykket gjelder for alle $x \in M$, og avgjør om 1 er inneholdt i M .

a) $M = [0, 1]$

b) $M = (0, 1]$

c) $M = [0, 1)$

Svar

a) $0 \leq x \leq 1$. Videre er $1 \in M$.

b) $0 < x \leq 1$. Videre er $1 \in M$.

c) $0 \leq x < 1$. Videre er $1 \notin M$.

1.2 Navn på mengder

$\mathbb{N}$ Mengden av alle positive heltall¹

$\mathbb{Z}$ Mengden av alle heltall²

$\mathbb{Q}$ Mengden av alle rasjonale tall

$\mathbb{R}$ Mengden av alle reelle tall

$\mathbb{C}$ Mengden av alle komplekse tall

¹Inneholder ikke 0.

²Inneholder 0.

Språkboksen

Når vi skriver "tallet x " eller "konstanten k ", tas det i denne boka for gitt at x og k er reelle tall. Når vi skriver "funksjonen $f(x)$ ", tar vi det for gitt at x er et reelt tall og at alle andre symboler i funksjonsuttrykket er reelle konstanter.

Symbolet for uendelig

Mengdene i [definisjon 1.2](#) inneholder uendelig mange elementer. Noen ganger ønsker vi å avgrense deler av en uendelig mengde, og da melder det seg et behov for et symbol som er med på å symbolisere dette. ∞ er symbolet for en uendelig stor, positiv verdi.

Eksempel

At $x \geq 2$ kan vi skrive som $x \in [2, \infty)$.

At $x < -7$ kan vi skrive som $x \in (-\infty, -7)$.

Språkboksen

De to intervallene i eksempelet over kan også skrives som $[2, \rightarrow)$ og $(\leftarrow, -7)$.

Merk

∞ er ikke noe bestemt tall. Å bruke de fire grunnleggende regnearter alene med dette symbolet gir derfor ingen mening.

Verdi- og definisjonsmengder

1.3 Verdi- og definisjonsmengder


Gitt en funksjon $f(x)$.

Mengden som utelukkende inneholder alle x -verdier som kan anvendes i funksjonsuttrykket til f , er **definisjonsmengden** til f . Denne mengden skrives som D_f .

Mengden som utelukkende inneholder alle f -verdier for $x \in D_f$, er **verdimengden** til f . Denne mengden skrives som V_f .


Eksempel 1

Figuren under viser grafen til $f(x) = 2x - 1$, hvor $D_f = [1, 3]$. Da er $V_f = [1, 5]$.



Eksempel 2

Figuren under viser grafen til $f(x) = \frac{1}{x}$, hvor $D_f = [-3, -1] \cup [2, 5]$. Da er $V_f = [-1, -\frac{1}{3}] \cup [\frac{1}{5}, \frac{1}{2}]$.



Merk

Definisjonsmengden til en funksjon bestemmes av to ting; hvilken sammenheng funksjonen skal brukes i, og eventuelle verdier som gir et udefinert funksjonsuttrykk. I *Eksempel 1* på side 15 er definisjonsmengden helt vilkårlig valgt, siden funksjonen er definert for alle x . I *Eksempel 2* derimot er ikke funksjonen definert for $x = 0$, så en definisjonsmengde som inneholdt denne verdien for x ville ikke gitt mening.

1.2 Vilkår

Symboler for vilkår

Symbolet $\Rightarrow$ bruker vi for å vise til at hvis et vilkår er oppfylt, så er et annet (eller flere) vilkår også oppfylt. For eksempel; i MB så vi at hvis en trekant er rettvinklet, er Pytagoras' setning gyldig. Dette kan vi skrive slik:

trekanten er rettvinklet $\Rightarrow$ Pytagoras' setning er gyldig

Men vi så også at det omvendte gjelder; hvis Pytagoras' setning er gyldig, må trekanten være rettvinklet. Da kan vi skrive

trekanten er rettvinklet $\iff$ Pytagoras' setning er gyldig

Det er veldig viktig å være bevisst forskjellen på $\Rightarrow$ og $\iff$; at vilkår A oppfylt gir B oppfylt, trenger ikke å bety at vilkår B oppfylt gir vilkår A oppfylt!

Eksempel 1

firkanten er et kvadrat $\Rightarrow$ firkanten har fire like lange sider

Eksempel 2

tallet er et primtall større enn 2 $\Rightarrow$ tallet er et oddetall

Eksempel 3


tallet er et partall $\iff$ tallet er delelig med 2

Funksjoner med vilkår

En funksjon kan ha flere uttrykk som gjelder ved forskjellige vilkår. Da sier vi at funksjonen har **delt forskrift**. La oss for eksempel definere en funksjon $f(x)$ slik:

For $x < 1$ er funksjonsuttrykket $-2x + 1$.

For $x \geq 1$ er funksjonsuttrykket $x^2 - 2x$.



Figur 1.1: Grafen til f på intervallet $[-1, 3]$.

Dette kan vi skrive som

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 1 & , \quad x < 1 \\ x^2 - 2x & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

Oppgaver for kapittel 1


1.1.1

Finn verdi- og definisjonsmengden til f .

a) $f(x) = x^2$ b) $f(x) = \sqrt{x^2 - 5}$ c) $f(x) = \frac{2}{x-3}$

1.1.2

I figuren under indikerer $[$ et lukket endepunkt, og $\rightarrow$ indikerer et åpent endepunkt. Finn verdi- og definisjonsmengdene til g , h og k .



1.2.1

Erstatt $?$ med $\iff$, $\Rightarrow$ eller $\Leftarrow$.

- a) a og b er partall $?$ $a + b$ er et partall.
- b) tallet er delelig med 2 $?$ tallet er delelig med 4.
- c) tallet er delelig med både 2 og 3 $?$ tallet er delelig med 6.

Kapittel 2

Algebra

2.1 Faktorisering

2.1 Kvadratsetningene

For to reelle tall a og b er

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (1. \text{ kvadratsetning})$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (2. \text{ kvadratsetning})$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \quad (3. \text{ kvadratsetning})$$

Språkboksen

$(a + b)^2$ og $(a - b)^2$ kalles **fullstendige kvadrat**.

3. kvadratsetning kalles også **konjugatsetningen**.

Alle kvadratsetningene er *identiteter*. En **identitet** er en likning som er oppfylt uansett hvilke verdier man gir variablene i likningen.

Eksempel 1

Skriv om $a^2 + 8a + 16$ til et fullstendig kvadrat.

Svar

$$\begin{aligned} a^2 + 8a + 16 &= a^2 + 2 \cdot 4a + 4^2 \\ &= (a + 4)^2 \end{aligned}$$

Eksempel 2

Skriv om $k^2 + 6k + 7$ til et uttrykk der k er et ledd i et fullstendig kvadrat.

Svar

$$\begin{aligned} k^2 + 6k + 7 &= k^2 + 2 \cdot 3k + 7 \\ &= k^2 + 2 \cdot 3k + 3^2 - 3^2 + 7 \\ &= (k + 3)^2 - 2 \end{aligned}$$

Eksempel 3

Faktoriser $x^2 - 10x + 16$.

Svar

Vi starter med å lage et fullstendig kvadrat:

$$\begin{aligned}x^2 - 10x + 16 &= x^2 - 2 \cdot 5x + 5^2 - 5^2 + 16 \\&= (x - 5)^2 - 9\end{aligned}$$

Vi legger merke til at $9 = 3^2$, og bruker 3. kvadratsetning:

$$\begin{aligned}(x - 5)^2 - 3^2 &= (x - 5 + 3)(x - 5 - 3) \\&= (x - 2)(x - 8)\end{aligned}$$

Altså er

$$x^2 - 10x + 16 = (x - 2)(x - 8)$$

2.1 Kvadratsetningene (forklaring)

Kvadratsetningene følger direkte av distributiv lov ved multiplikasjon (se [MB](#)).

2.2 Sum-produkt-metoden

Gitt $x, b, c \in \mathbb{R}$. Hvis $a_1 + a_2 = b$ og $a_1 a_2 = c$, er

$$x^2 + bx + c = (x + a_1)(x + a_2) \quad (2.1)$$

Eksempel 1

Faktoriser uttrykket $x^2 - x - 6$.

Svar

Siden $2 \cdot (-3) = -6$ og $2 + (-3) = -1$, er

$$x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$$

Eksempel 2

Faktoriser uttrykket $b^2 - 5b + 4$.

Svar

Siden $(-4) \cdot (-1) = 4$ og $-4 + (-1) = -5$, er

$$b^2 - 5b + 4 = (b - 4)(b - 1)$$

2.2 Sum-produkt-metoden (forklaring)

Vi har at

$$\begin{aligned}(x + a_1)(x + a_2) &= x^2 + xa_2 + a_1x + a_1a_2 \\ &= x^2 + (a_1 + a_2)x + a_1a_2\end{aligned}$$

Hvis $a_1 + a_2 = b$ og $a_1a_2 = c$, er

$$(x + a_1)(x + a_2) = x^2 + bx + c$$

Fortegnsskjema

En funksjon $f(x)$ består gjerne av uttrykk som har positive og negative verdier for forskjellige verdier av x . For å få et tydeligere bilde av når f er positiv eller negativ, kan vi lage et **fortegnsskjema**.

Eksempel 1

Løs ulikheten


$$x^2 - 8x - 9 \leq 0$$

Svar

Siden $1 \cdot (-9) = -9$ og $1 + (-9) = -8$, er

$$x^2 - 8x - 9 = (x + 1)(x - 9)$$

Vi setter $f = (x + 1)(x - 9)$, og lager et fortegnsskjema:



Skjemaet viser følgende:

- Uttrykket $x + 1$ er negativt når $x < -1$, lik 0 når $x = -1$, og positivt når $x > -1$.
- Uttrykket $x - 9$ er negativt når $x < 9$, lik 0 når $x = 9$, og positivt når $x > 9$.
- Siden $f = (x + 1)(x - 9)$, er

$$f > 0 \text{ når } x \in (-\infty, -1) \cup (9, \infty)$$

$$f = 0 \text{ når } x \in \{-1, 9\}$$

$$f < 0 \text{ når } x \in (-1, 9)$$

Altså er $x^2 - 8x - 9 \leq 0$ når $x \in [-1, 9]$.


Eksempel 2

Løs ulikheten

$$\frac{(x-3)(x+2)}{x-4} > 0$$

Svar

Vi setter $f = \frac{(x-3)(x+2)}{x-4}$, og lager et fortegnsskjema:



Skjemaet viser følgende:

- Uttrykket $x - 3$ er negativt når $x < 3$, lik 0 når $x = 3$, og positivt når $x > 3$.
- Uttrykket $x + 2$ er negativt når $x < -2$, lik 0 når $x = -2$, og positivt når $x > -2$.
- Uttrykket $x - 4$ er negativt når $x < 4$, lik 0 når $x = 4$, og positivt når $x > 4$.
- Siden $f = \frac{(x-3)(x+2)}{x-4}$, har vi at

$$f > 0 \text{ når } x \in (-2, 3) \cup (4, \infty)$$

$$f \text{ er ikke definert for } x = 4$$

$$f = 0 \text{ når } x \in \{-2, 3\}$$

$$f < 0 \text{ når } x \in (-\infty, -2) \cup (3, 4)$$

Altså er $\frac{(x-3)(x+2)}{x-4} > 0$ for $x \in (-2, 3) \cup (4, \infty)$.

Merk: Siden $x - 4$ kan være både positiv og negativ, kan vi ikke multiplisere ulikheten med denne faktoren (fordi vi ikke kan vite om retningen på ulikhetstegnet endres eller ikke).

2.2 Andregradslikninger

2.3 Andregradslikning med konstantledd

Gitt likningen

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (2.2)$$

hvor $a, b, c \in \mathbb{R}$, og $a \neq 0$. Da er

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (abc\text{-formelen})$$

Hvis $x = x_1$ og $x = x_2$ er løsningene gitt av abc -formelen, er

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) \quad (2.3)$$

Hvis $b^2 - 4ac < 0$, har ikke likningen noen reell løsning.

Eksempel 1

a) Løs likningen $2x^2 - 7x + 5 = 0$.

b) Faktoriser uttrykket på venstre side i oppgave a).

Svar

a) Vi bruker abc -formelen. Da er $a = 2$, $b = -7$ og $c = 5$.

Dermed er

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5}}{2 \cdot 2} \\ &= \frac{7 \pm \sqrt{49 - 40}}{4} \\ &= \frac{7 \pm \sqrt{9}}{4} \\ &= \frac{7 \pm 3}{4} \end{aligned}$$

Enten er

$$x = \frac{7 + 3}{4} = \frac{5}{2}$$

eller så er

$$x = \frac{7 - 3}{4} = 1$$

b) $2x^2 - 7x + 5 = 2(x - 1)\left(x - \frac{5}{2}\right)$

Eksempel 2

Løs likningen

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

Svar

Vi bruker *abc*-formelen. Da er $a = 1$, $b = 3$ og $c = -10$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned}x &= \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-10)}}{2 \cdot 1} \\&= \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 40}}{2} \\&= \frac{-3 \pm 7}{2}\end{aligned}$$

Altså er

$$x = -5 \quad \vee \quad x = 2$$

Eksempel 3

Løs likningen

$$4x^2 - 8x + 1 = 0$$

Svar

Av *abc*-formelen har vi at

$$\begin{aligned}x &= \frac{8 \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1}}{2 \cdot 4} \\&= \frac{8 \pm 4\sqrt{4 - 1}}{8} \\&= \frac{2 \pm \sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

Altså er

$$x = \frac{2 + \sqrt{3}}{2} \quad \vee \quad \frac{2 - \sqrt{3}}{2}$$

Andregradslikninger (forklaring)

Gitt likningen

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Vi starter med å omskrive likningen:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

Så lager vi et fullstendig kvadrat, og anvender konjugatsetningen til å faktorisere uttrykket:

$$\begin{aligned}x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \frac{c}{a} \\&= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \\&= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\&= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}\right)^2 \\&= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right)^2 \\&= \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right) \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right)\end{aligned}$$

Uttrykket over er lik 0 når

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \vee \quad x = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

2.3 Polynomdivisjon

Metoder

Når to tall ikke er delelige med hverandre, kan vi kombinere et heltall og en brøk for å uttrykke kvotienten. For eksempel er

$$\frac{17}{3} = 5 + \frac{2}{3} \quad (2.4)$$

Tanken bak (2.4) er at vi skriver om telleren slik at vi får fram den delen av 17 som er delelig med 3:

$$\frac{17}{3} = \frac{5 \cdot 3 + 2}{3} = 5 + \frac{2}{3}$$

Den samme tankegangen kan brukes for brøker med polynomer¹, og da kalles det **polynomdivisjon**.

Eksempel 1

Utfør polynomdivisjon på uttrykket

$$\frac{2x^2 + 3x - 4}{x + 5}$$

Svar

Metode 1

Vi gjør følgende trinnvis; med den største potensen av x i telleren som utgangspunkt, lager vi uttrykk som er delelige med telleren.

$$\begin{aligned} \frac{2x^2 + 3x - 4}{x + 5} &= \frac{2x(x + 5) - 10x + 3x - 4}{x + 5} \\ &= 2x + \frac{-7x - 4}{x + 5} \\ &= 2x + \frac{-7(x + 5) + 35 - 4}{x + 5} \\ &= 2x - 7 + \frac{31}{x + 5} \end{aligned}$$

¹Se [vedlegg A](#)

Metode 2

(Se utregningen under punktene)

- i) Leddet med den høyeste graden av x i dividenden er $2x^2$.
Dette uttrykket kan vi få ved å multiplisere divisoren med $2x$. Vi skriver $2x$ til høyre for likhetstegnet, og subtraherer $2x(x + 5) = 2x^2 + 10x$.
- ii) Differansen fra punkt i) er $-7x - 4$. Vi kan få leddet med den høyeste graden av x ved å multiplisere divisoren med -7 . Vi skriver -7 til høyre for likhetstegnet, og subtraherer $-7(x + 5) = -7x - 35$.
- iii) Differansen fra punkt ii) er 31. Dette er et uttrykk som har lavere grad av x enn dividenden, og dermed skriver vi $\frac{31}{x+5}$ til høyre for likhetstegnet.

$$\begin{array}{r} (2x^2 + 3x - 4) : (x + 5) = 2x - 7 + \frac{31}{x + 5} \\ - (2x^2 + 10x) \\ \hline \phantom{(2x^2 + 3x - 4) : (x + 5) = 2x - 7 + \frac{31}{x + 5}} - 7x - 4 \\ - (-7x - 35) \\ \hline \phantom{(2x^2 + 3x - 4) : (x + 5) = 2x - 7 + \frac{31}{x + 5}} 31 \end{array}$$

Eksempel 2

Utfør polynomdivisjon på uttrykket

$$\frac{x^3 - 4x^2 + 9}{x^2 - 2}$$

Svar

Metode 1

$$\begin{aligned}\frac{x^3 - 4x^2 + 9}{x^2 - 2} &= \frac{x(x^2 - 2) + 2x - 4x^2 + 9}{x^2 - 2} \\ &= x + \frac{-4x^2 + 2x + 9}{x^2 - 2} \\ &= x + \frac{-4(x^2 - 2) - 8 + 2x + 9}{x^2 - 2} \\ &= x - 4 + \frac{2x + 1}{x^2 - 2}\end{aligned}$$

Metode 2

$$\begin{array}{r} (x^3 - 4x^2 + 9) : (x^2 - 2) = x - 4 + \frac{2x + 1}{x^2 - 2} \\ - (x^3 - 2x) \\ \hline - 4x^2 + 2x + 9 \\ - (-4x^2 + 8) \\ \hline 2x + 1 \end{array}$$

Eksempel 3

Utfør polynomdivisjon på uttrykket

$$\frac{x^3 - 3x^2 - 6x + 8}{x - 4}$$

Svar

Metode 1

$$\begin{aligned}\frac{x^3 - 3x^2 - 6x + 8}{x - 4} &= \frac{x^2(x - 4) + 4x^2 - 3x^2 - 6x + 8}{x - 4} \\ &= x^2 + \frac{x^2 - 6x + 8}{x - 4} \\ &= x^2 + \frac{x(x - 4) + 4x - 6x + 8}{x - 4} \\ &= x^2 + x + \frac{-2x + 8}{x - 4} \\ &= x^2 + x - 2\end{aligned}$$

Metode 2

$$\begin{array}{r} (x^3 - 3x^2 - 6x + 8) : (x - 4) = x^2 + x - 2 \\ -(x^3 - 4x^2) \\ \hline x^2 - 6x + 8 \\ -(x^2 - 4x) \\ \hline -2x + 8 \\ -(-2x + 8) \\ \hline 0 \end{array}$$

Delelighet og faktorer

Eksemplene på side 30-33 peker på noen viktige sammenhenger som gjelder for generelle tilfeller:

2.4 Polynomdivisjon

La A_k betegne et polynom A med grad k . Gitt heltallene m og n , hvor $m \geq n > 0$ og polynomet P_m . Da finnes polynomene Q_n , S_{m-n} og R_{n-1} slik at

$$\frac{P_m}{Q_n} = S_{m-n} + \frac{R_{n-1}}{Q_n} \quad (2.5)$$

Språkboksen

Hvis $R_{n-1} = 0$, sier vi at P_m er **delelig** med Q_n .

Eksempel 1

Undersøk om polynomene er delelige med $x - 3$.

a) $P(x) = x^3 + 5x^2 - 22x - 56$

b) $K(x) = x^3 + 6x^2 - 13x - 42$

Svar

a) Ved polynomdivisjon finner vi at

$$\frac{P}{x-3} = x^2 + 8x + 2 - \frac{50}{x-3}$$

Altså er P ikke delelig med $x - 3$.

b) Ved polynomdivisjon finner vi at

$$\frac{K}{x-3} = x^2 + 9x + 14$$

Altså er K delelig med $x - 3$.

2.5 Faktorer i polynomer

Gitt et polynom $P(x)$ og en konstant a . Da har vi at

$$P \text{ er delelig med } x - a \iff P(a) = 0$$

Hvis ett av vilkårene over er oppfylt, finnes det et polynom $S(x)$ slik at

$$P = (x - a)S$$

Eksempel 1

Gitt polynomet

$$P(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$$

- a) Vis at $x = 1$ løser likningen $P = 0$.
- b) Faktoriser P .

Svar

- a) Vi undersøker $P(1)$:

$$P(1) = 1^3 - 3 \cdot 1^2 - 6 \cdot 1 + 8 = 0$$

Altså er $P = 0$ når $x = 1$.

- b) Siden $P(1) = 0$, er $x - 1$ en faktor i P . Ved polynomdivisjon finner vi at

$$P = (x - 1)(x^2 - 2x - 8)$$

Da $2 \cdot (-4) = -8$ og $-4 + 2 = -2$, er

$$x^2 - 2x - 8 = (x + 2)(x - 4)$$

Dette betyr at


$$P = (x - 1)(x + 2)(x - 4)$$

2.4 Eulers tall

Eulers tall er en konstant som har så stor betydning i matematikk at den har fått sin egen bokstav e . Tallet er irrasjonalt, og de ti første sifrene er

$$e = 2.718281828\dots$$

De mest fascinerende egenskapene til dette tallet kommer til syne når man undersøker funksjonen $f(x) = e^x$. Dette er en eksponentialfunksjon¹ som er så viktig at den rett og slett går under navnet **eksponentialfunksjonen**. Denne funksjonen skal vi undersøke nærmere i vedlegg D og kapittel 6.



¹Se vedlegg A.

2.5 Logaritmer

I [MB](#) så vi at potenstall består av et grunntall og en eksponent. En **logaritme** er en matematisk operasjon relativ til et tall. Hvis en logaritme er relativ til grunntallet til en potens, vil operasjonen resultere i eksponenten.

Logaritmen relativ til 10 skrives $\log_{10}$. Da er for eksempel

$$\log_{10} 10^2 = 2$$

Videre er for eksempel

$$\log_{10} 1000 = \log_{10} 10^3 = 3$$

Følgelig kan vi skrive

$$1000 = 10^{\log_{10} 1000}$$

Med potensreglene som utgangspunkt (se [MB](#)), kan man utlede mange regler for logaritmer.

2.6 Logaritmer

La $\log_a$ betegne logaritmen relativ til $a > 0$. For $m \in \mathbb{R}$ er da

$$\log_a a^m = m \tag{2.6}$$

For $m > 0$ kan vi alternativt skrive

$$m = a^{\log_a m} \tag{2.7}$$

Eksempel 1

$$\log_5 5^9 = 9$$

Eksempel 2

$$3 = 8^{\log_8 3}$$

Språkboksen

$\log_{10}$ skrives ofte som $\log$ eller $\lg$, mens $\log_e$ skrives ofte som $\ln$ eller (!) $\log$. Når man bruker digitale hjelpemidler til å finne verdier til logaritmer er det derfor viktig å sjekke hva som er grunntallet. I denne boka skal vi skrive $\log_{10}$ som $\log$, og $\log_e$ som $\ln$.

Logaritmen med e som grunntall kalles den **naturlige logaritmen**.

Uttrykket $(\ln x)^2$ skrives gjerne som $\ln^2 x$.

Eksempel 3

$$\log 10^7 = 7$$

Eksempel 4

$$\ln e^{-3} = -3$$

2.7 Logaritmereglene

Merk: Logaritmereglene er her gitt ved den naturlige logaritmen. De samme regelen vil gjelde ved å erstatte $\ln$ med $\log_a$, og e med a for $a > 0$.

For $x, y > 0$, har vi at

$$\ln e = 1 \quad (2.8)$$

$$\ln 1 = 0 \quad (2.9)$$

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y \quad (2.10)$$

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y \quad (2.11)$$

For $y \in \mathbb{R}$ og $x > 0$, er

$$\ln x^y = y \ln x \quad (2.12)$$

Eksempel 1

$$\ln(ex^5) = \ln e + \ln x^5 = 1 + 5 \ln x$$

Eksempel 2

$$\ln \frac{1}{2} = \ln 1 - \ln 2 = -\ln 2$$

Eksempel 3

Løs likningen $7^x = 3$.

Svar

$$\ln 7^x = \ln 3$$

$$x \ln 7 = \ln 3$$

$$x = \frac{\ln 3}{\ln 7}$$

(2.5) Logaritmerregler (forklaring)

Likning (2.8)

$$\ln e = \ln e^1 = 1$$

Likning (2.9)

$$\ln 1 = \ln e^0 = 0$$

Likning (2.10)

For $m, n \in \mathbb{R}$, har vi at

$$\ln e^{m+n} = m + n = \ln e^m + \ln e^n$$

Vi setter¹ $x = e^m$ og $y = e^n$. Siden $\ln e^{m+n} = \ln(e^m \cdot e^n)$, er da

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y$$

Likning (2.11)

Ved å undersøke $\ln e^{m-n}$, og ved å sette $y = e^{-n}$, blir forklaringen tilsvarende den gitt for likning (2.10).

Likning (2.12)

Siden $x = e^{\ln x}$ og² $(e^{\ln x})^y = e^{y \ln x}$, har vi at

$$\ln x^y = \ln e^{y \ln x} = y \ln x$$

¹Vi tar det her for gitt at alle positive tall forskjellige fra 0 kan uttrykkes som et potensfall.

²Se potensregler i [MB](#).

2.6 Forklaringer

2.4 Polynomdivisjon (forklaring)

Gitt heltallene m og n , hvor $m > n > 0$, og polynomene

P_m , hvor ax^m er leddet med høyest grad

Q_n , hvor bx^n er leddet med høyest grad

Da kan vi skrive

$$P_m = \frac{a}{b}x^{m-n}Q_n - \frac{a}{b}x^{m-n}Q_n + P_m$$

Vi setter $U = -\frac{a}{b}x^{m-n}Q_n + P_m$, og merker oss at U nødvendigvis har grad lavere eller lik $m - 1$. Videre har vi at

$$\frac{P_m}{Q_n} = \frac{a}{b}x^{m-n} + \frac{U}{Q_n} \quad (2.13)$$

La oss kalle det første og det andre leddet på høyresiden i (2.13) for henholdsvis et "potensledd" og en "resterende brøk". Ved å følge prosedyren som ledet oss til (2.13), kan vi også uttrykke $\frac{U}{Q_n}$ ved et "potensledd" og et "resterende ledd". Dette "potensleddet" vil ha grad mindre eller lik $m - 1$, mens telleren i det "resterende leddet" vil ha grad mindre eller lik $m - 2$. Ved å anvende (2.13) kan vi stadig lage nye "potensledd" og "resterende ledd" fram til vi har et "resterende ledd" med grad $n - 1$.

2.5 Faktorisering av polynom (forklaring)

P er delelig med $x - a \Rightarrow P(a) = 0$

Gitt at P er delelig med $x - a$. For et polynom S har vi da av (2.5) at

$$\begin{aligned}\frac{P}{x - a} &= S \\ P &= (x - a)S\end{aligned}$$

Da er åpenbart $x = a$ en løsning for likningen $P = 0$, og da er $P(a) = 0$.

$P(a) = 0 \Rightarrow P$ er delelig med $x - a$

Av (2.5) finnes et polynom S og en konstant R slik at

$$\begin{aligned}\frac{P}{x - a} &= S + \frac{R}{x - a} \\ P &= (x - a)S + R\end{aligned}$$

Hvis $P(a) = 0$, er $R = 0$, og da er P delelig med $x - a$.

Oppgaver for kapittel 2

2.1.1

Skriv som fullstendige kvadrat.

- a) $x^2 + 6x + 9$ b) $b^2 + 14b + 49$ c) $a^2 - 2a + 1$
d) $k^2 - \frac{2}{3}k + \frac{1}{9}$ e) $c^2 - \frac{1}{2}c + \frac{1}{16}$ f) $y^2 + \frac{6}{7}y + \frac{9}{49}$

2.1.2

Skriv som fullstendige kvadrat.

- a) $25a^2 + 90a + 81$ b) $9b^2 + 12a + 4$ c) $64c^2 - 16c + 1$
d) $\frac{1}{4}d^2 + \frac{3}{4}d + \frac{9}{16}$ e) $\frac{1}{25}e^2 + \frac{4}{35}e + \frac{4}{49}$ f) $\frac{81}{64}f^2 - \frac{15}{4}f + \frac{25}{9}$

2.1.3

Vis at

- a) $(a - b)^2 - b^2 = a(a - 2b)$
b) $(k + x)^2 - (k - x)^2 = 4kx$

2.1.4 (1TV22)

Bestem r og s slik at likningen blir en identitet.

$$9x^2 - 30x + r = (3x - s)^2$$

2.1.5 (1TV21)

Bestem r , s og t slik at likningen blir en identitet.

$$4x^2 + 16x + r = (sx + t)^2$$


2.1.6

Lag et fortegnsskjema for f . Skriv de repsektive definisjonsmengdene hvor f er positiv og negativ.

- a) $f(x) = 4(x - 2)(x + 1)(x - 7)$ b) $f(x) = x^2 - 2x - 3$

2.1.7 (1TV24)

Et kvadrat er delt inn i to grønne rektangler og et hvitt kvadrat. Sett opp en matematisk identitet med utgangspunkt i arealet til det grønne området.



2.1.8

- a) Gitt to heltall a og b . Forklar hvorfor $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b})$ er et heltall.
- b) Skriv om brøken $\frac{5}{4-\sqrt{3}}$ til en brøk med heltalls nevner.
- c) Vis at

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$$

2.1.9

Skriv om til et uttrykk der x er et ledd i et fullstendig kvadrat.

- a) $x^2 + 6x - 7$ b) $x^2 - 8x - 20$ c) $x^2 + 12x + 117$
- d) $4x^2 - 12x + 11$ e) $49x^2 + 126x + 80$

2.1.10

Hvorfor er det ved bruk av [sum-produkt-metoden](#) lurt å starte med å finne tall som oppfyller kravet $a_1 a_2 = c$ (i motsetning til å finne tall som oppfyller kravet $a_1 + a_2 = b$)?

2.1.11

Faktoriser uttrykkene fra [oppgave 2.1.9](#) a) og b).

2.1.12

Faktoriser uttrykkene.

a) $x^2 - 10kx + 25k^2$ b) $y^2 + 8yz + 16z^2$ c) $a^2 - 20aq + 100q^2$

2.1.13 (1TV23D1)

Gitt likningen

$$x^3 - 5x^2 - 8x + 12 = (x - 1)(x + a)(x - b)$$

Bestem a og b slik at likningen blir en identitet.

2.1.14 (1TH21, 1TV25 og 1TV26)

Løs ulikhetene.

a) $x^2 + 2x - 8 < 0$ b) $x^2 - 4x - 12 < 0$ c) $x^2 + 7x + 6 \leq 0$


2.1.15

Gitt ulikheten

$$x^2 - 9x + 20 > x - 1$$

a) Bruk figuren under til å løse ulikheten.

b) Løs ulikheten ved hjelp av faktorisering.



2.1.16 (1TH21 og 1TV21)

Skriv så enkelt som mulig.

a) $\frac{2x^2 - 2}{x^2 - 2x + 1}$ b) $\frac{x}{x - 3} + \frac{x - 6}{x + 3} - \frac{18}{x^2 - 9}$

2.1.17

Gitt ulikheten

$$\frac{10}{x+3} - \frac{2}{x+5} > 0$$

- a) Forklar hvorfor det er problematisk å gange begge sider av ulikheten med en fellesnevner.
- b) Løs ulikheten.

2.2.1

Gitt likningen

$$ax^2 + bx = 0$$

Vis, uten å bruke *abc*-formelen, at

$$x = 0 \quad \vee \quad x = -\frac{b}{a}$$

2.2.2

Løs likningene.

- a) $2x^2 - 4x = 0$ b) $3x^2 + 27x = 0$
- c) $7x^2 + 2x = 0$ d) $8x - 9x^2 = 0$

2.2.3 (1TV23D1)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^2 - 2x - 8$$

I hvilke punkt skjærer grafen til funksjonen x -aksen?

2.2.4

Løs likningene.

- a) $x^2 + 2x - 15 = 0$ b) $x^2 + 3x - 70 = 0$ c) $x^2 + 5x - 7 = 0$
- d) $x^2 - x - 1 = 0$ e) $x^2 - 2x - 9 = 0$ f) $x^2 - 4x - 4 = 0$
- g) $5x^2 + 2x - 7 = 0$ h) $8x^2 - 2x^2 - 9 = 0$ i) $3x^2 - 12x + 1 = 0$

2.2.5 (1TH21D1)

Grafen til en andregradsfunksjon f går gjennom punktene $(0, 12)$, $(-3, 0)$ og $(2, 0)$. Bestem $f(x)$.


2.2.6 (1TV21)

Bestem k slik at likningen har én løsning

$$x^2 + 2kx - 2k - 1 = 0$$

2.2.7

Grafen til $f(x) = x^2 + 2x - 8$ er symmetrisk¹ om vertikallinja som går gjennom bunnpunktet. Finn x -verdien til dette punktet.



2.2.8 (1TV26)

Gitt likningssystemet

$$-x^2 + 4 = y \quad (\text{I})$$

$$x - y = 2 \quad (\text{II})$$

- a) Løs likningssystemet ved rekning.
- b) Løs likningssystemet grafisk.

2.2.9 (1TH21)

$$x^2 + 2x - y = -1 \quad (\text{I})$$

$$x + y = -2 \quad (\text{II})$$

Vis at likningssystemet ikke har en løsning

- a) grafisk
- b) ved regning

¹Se også **Gruble 1**.

2.2.10

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ og tallene $t = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ og $s = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

- a) Hva er verdiene til $f(t)$ og $f(s)$? Grunngi svaret uten bruk av utregning.
- b) Bekreft svaret fra a) ved utregning.
- c) Regn ut $t - s$. Hvilken sammenheng er det mellom dette tallet og nullpunktene til f ?
- d) Regn ut $\frac{s+t}{2}$. Hvilken sammenheng er det mellom dette tallet og nullpunktene til f ?
- e) Regn ut st . Hvis $f(0) = 15$ og $st = 3$, hva er da verdiene til a og c ?

2.3.1

Utfør polynomdivisjon på uttrykkene

- a) $\frac{x^4 - 2x^3 + x^2 - 2x}{x^3 + x}$
- b) $\frac{-4x^4 + 7x^2 - 3}{-4x^2 + 3}$
- c) $\frac{2x^3 - 6x^2 + 9x - 27}{2x^2 + 9}$
- d) $\frac{x^2 + 2x + 1}{x - 2}$

2.3.2 (1TV24)

Vis at

$$2x^3 + 3x^2 - 11x - 6 = (2x^2 + 7x + 3)(x - 2)$$

ved å utføre to forskjellige polynomdivisjoner.

(Utfør polynomdivisjon med to forskjellige divisorer.)

2.3.3 (1TV22)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = 2x^3 + x^2 - 18x - 9$$

Vis at divisjonen $f(x) : (x - 3)$ går opp.

2.3.4

$P(x) = 0$ for én av $x \in \{-1, 2, 3\}$. Faktoriser P når

a) $P = x^3 - 37x + 84$

b) $P = x^3 + 9x^2 + 23x + 15$

c) $P = 2x^3 + 21x^2 + 61x + 42$

2.3.5 (1TV21)

Bestem en verdi for k slik at divisjonen går opp.

$$(x^3 + x^2 - 2x - 8) : (x + k)$$

2.3.6

Gitt funksjonene $f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 8$ og $g(x) = 2x + 8$. Finn skjæringspunktene til f og g .

2.5.1 (R1H23D1)

Skriv uttrykkene nedenfor i stigende rekkefølge

$$2 \ln e \quad , \quad 3 \log 70 \quad , \quad e^{3 \ln 2}$$

Grunngi svaret.

2.5.2 (R1H22)

Hvilke av tallene er mindre enn 10?

$$3\sqrt{11} \quad , \quad 10 \log 9 \quad , \quad 5 \ln 9$$

Grunngi svaret.

2.5.3

Løs likningen.

a) $7 \cdot 5^x = 14$

b) $3 \cdot 8^x = 27$

c) $11 \cdot 2^x = 19$

2.5.4

Vis at likningen

$$b \cdot a^x = c$$

har løsningen

$$x = \log_a \frac{c}{b}$$

2.5.5

Finn eventuelle nullpunkt til funksjonene

a) $g(x) = \frac{1}{2}e^x(2x - 1)^2$ b) $f(x) = (x^2 + 2x - 3)(e^x - 1)$

2.5.6

Løs likningen. (Hint; se [vedlegg B](#))

a) $(\ln x)^2 - 5 \ln x + 6 = 0$ b) $\ln^2 x - 3 \ln x - 70 = 0$

c) $e^{2x} - 2e^x - 3 = 0$ d) $e^{2x} + 7e^x - 18 = 0$

e) $e^{2x} - e^x = 2$ f) $(\log x)^2 - 2 \log x = 8$

g) $100^x - 3 \cdot 10^x$ h) $\ln^2 x - \ln x = 6$

2.5.7 (R1V26)

a) Sorter uttrykkene i stigende rekkefølge.

$$\log_2 8 \quad e^{3 \ln 1} \quad \lg 7 \quad \sqrt[4]{3^3}$$

b) Skriv så enkelt som mulig.

$$\lg(ab) - \lg\left(\frac{a}{b}\right) + \lg(100b^3)$$

2.5.8 (R1H25)

Bestem a slik at

$$\log_a \frac{1}{64} = -3$$

2.5.9

Løs likningene

a) $\ln(2x - 6) = 2$ b) $3^{x+2} - 5 = 76$

c) $\frac{3^{2x} + 3^{2x} + 4}{2} = 29$ d) $3 \ln x + 2 \ln x^2 + \ln \frac{1}{x^9} = 2$

Gruble* 1

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$. Vis at grafen til f er symmetrisk om linja $x = -\frac{b}{2a}$.

Gruble* 2 (1TH23)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

I hvilke punkt skjærer grafen til funksjonen x -aksen?

Gruble* 3 (1TV26)

Løs likningen

$$2x^3 + 3x^2 - 18x + 8 = 0$$

Gruble* 4 (1TV26)

Gitt likningen

$$a(x + b)^2 = x^2 + 8x + c$$

Bestem a , b og c slik at likningen blir en identitet.

Gruble* 5 (1TV25)

En andregradsfunksjon $f(x)$ har ett nullpunkt. Grafen til f skjærer y -aksen i punktet $(0, 9)$.

Bestem et mulig funksjonsuttrykk for f .

Gruble* 6 (1TH24)

Finn bunnpunktet til $f(x) = (x - 1)(x + 3)$.

Gruble* 7 (1TH24)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 + 7x^2 + 4x - 12$$

Løs ulikheten $f(x) < 0$, og illustrer løsningen grafisk ved å lage en skisse.

Gruble* 8 (1TH21)

Løs likningen


$$x^3 + 2x^2 - 7x + 4 = 0$$

Gruble* 9 (1TV24)


Figuren under viser grafen til funksjonen f .

a) Bestem $f(x)$.


b) Løs ulikheten $f(x) > 12$.

**Gruble* 10** (R1H24)

Figuren under viser et utsnitt av grafen til $f(x) = \log_a x$. Finn verdien til a .

**Gruble* 11**

$A = (4, 1)$, $B = (12, 3)$ og $C = (3, 3)$. Linja $x = c$ deler $\triangle ABC$ i to områder med likt areal. Finn verdien til c .



Gruble* 12

Funksjonen $f(x) = x^3 + 11x^2 + 8x - 20$ har $x^2 + x - 2$ som faktor. Finn nullpunktene til f .

Gruble* 13

Faktoriser uttrykkene

- a) $x^2 + xy - 20y^2$
- b) $a^2 - 9ab + 14b^2$
- c) $y^2 - 9k^5y - k^2y + 9k^7$

Gruble* 14

Vis at

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Gruble* 15

For en trekant med sidelengder a , b og c er arealet T gitt ved

Hérons formel:

$$T = \frac{1}{4} \sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(b+c-a)}$$

Bevis formelen.

Gruble* 16

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$.

- a) Finn et uttrykk for ekstremalverdien¹ til f . (Se [gruble 1](#)).
- b) Forklar hvorfor
 - en endring av c vil føre til en vertikalforskyvning av grafen til f .
 - en endring av a eller b vil føre til både en horisontalforskyvning og en vertikalforskyvning av grafen til f .

¹Definisjonen av *ekstremalverdi* finner du på side 168

Gruble* 17

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$. I [gruble 1](#) viste vi at f er symmetrisk om linja $x = -\frac{b}{2a}$. Videre kan det vises at for alle tall k er

$$f\left(\pm k - \frac{b}{2a}\right) = \frac{4a^2k^2 - b^2}{4a} + c$$

Bruk dette til å utlede abc -formelen.

Gruble 18

Forklar hvorfor påstanden er riktig/ikke riktig:

Grafen til $f(x) = \ln(ax)$ tilsvarer grafen til $\ln(x)$ forskjøvet langs y -aksen.

Gruble 19

$$\sqrt{27} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

Finn de heltallige verdiene til x og y .

Gruble 20

Skriv uttrykkene på formen $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$, hvor a og b er heltall.

- a) $10 - 2\sqrt{21}$ b) $13 + 2\sqrt{22}$ c) $8 + 4\sqrt{3}$ d) $42 - 14\sqrt{5}$

Gruble 21

a) Faktoriser uttrykket $q^3 - p^3$.

b) Vis at

$$\frac{1}{2}(p+q)(q^2-p^2) - pq(q-p) - \frac{1}{3}(q^3-p^3) = \frac{1}{6}(q-p)^3$$

Gruble 22

Faktoriser uttrykket $d^2r^2 - (d+r)^2r^2 + 4bd^2(b-r)$ slik at $2bd - 2dr - r^2$ er en faktor.

Kapittel 3


Geometri

3.1 Definisjoner

3.1 Halveringslinje


Gitt $\angle BAC$. For et punkt P på **halveringslinja** til vinkelen (blå linje i figuren) er

$$\angle BAP = \angle PAC = \frac{1}{2} \angle BAC$$




3.2 Midtpunkt

Midtpunktet C til AB er punktet på linjestykket slik at $AC = CB$.




3.3 Midtnormal

Midtnormalen til AB (blå linje i figuren) står normalt på AB , og går gjennom midtpunktet til AB .



3.4 sin, cos og tan I

Gitt en rettvinklet trekant med katetene a og b , hypotenus c , og vinkel v , som vist i figuren under.



Da er

$$\sin v = \frac{a}{c}$$

$$\cos v = \frac{b}{c}$$

$$\tan v = \frac{a}{b}$$

Språkboksen


I figuren over blir a kalt den **motstående** kateten til vinkel v , og b den **hosliggende** kateten til vinkel v .

sin, cos og tan er forkortelser for henholdsvis **sinus**, **cosinus** og **tangens**.

Eksaktverdier

De aller fleste sinus-, cosinus- og tangensverdier er irrasjonale tall, i praktiske anvendelser av verdiene er det derfor vanlig å benytte digitale hjelpemidler. Verdiene som er viktigst for teoretiske formål er gitt i **vedlegg C**.


Eksempel



$$\sin v = \frac{3}{5} \quad , \quad \cos v = \frac{4}{5} \quad , \quad \tan v = \frac{3}{4}$$

3.5 sin, cos og tan II

Gitt $\triangle ABC$, hvor $v = \angle BAC > 90^\circ$, som vist i figuren under.




Da er

$$\sin v = \frac{CD}{AC}$$

$$\cos v = -\frac{AD}{AC}$$

$$\tan v = -\frac{CD}{AD}$$

Eksempel



I figuren over er $CD = \sqrt{3}$, $AD = 1$ og $AC = 2$. Da er

$$\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad , \quad \cos 120^\circ = -\frac{1}{2} \quad , \quad \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$$


3.2 Egenskaper til sirkler

3.6 Tangent

En linje som skjærer en sirkel i bare ett punkt, kalles en **tangent** til sirkelen.

La S være sentrum i en sirkel, og la A være skjæringspunktet til denne sirkelen og en linje. Da har vi at

linja er en tangent til sirkelen $\iff AS$ står vinkelrett på linja



3.7 Sentral- og periferivinkel




Både periferi- og sentralvinkler har vinkelbein som ligger (delvis) inni en sirkel.

En **sentralvinkel** har toppunkt i sentrum av en sirkel.

En **periferivinkel** har toppunkt på sirkelbuen.



Gitt en periferivinkel u og en sentralvinkel v , som er innskrevet i samme sirkel og som spanner over samme sirkelbue. Da er

$$v = 2u$$



3.3 Egenskaper til trekanter


3.8 Arealsetningen



Arealet T til $\triangle ABC$ er

$$T = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin \angle A$$



Eksempel



Da $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, er arealet T til $\triangle ABC$ gitt som

$$T = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$


3.9 Sinussetningen



$$\frac{\sin \angle A}{BC} = \frac{\sin \angle B}{AC} = \frac{\sin \angle C}{AB}$$

Eksempel

$BC = \sqrt{2}$, $\angle A = 135^\circ$, og $\angle B = 30^\circ$. Finn lengden til AC .



Svar

Vi har at

$$\frac{AC}{\sin \angle B} = \frac{BC}{\sin \angle A}$$

Dermed er



$$AC = \frac{\sin \angle B}{\sin \angle A} BC$$

Da $\sin 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ og $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, har vi at

$$AC = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2} = 1$$

3.10 Cosinussetningen

Gitt en trekant med sidelengder a , b og c , og vinkel v , som vist i figurene under.




Da er

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos v$$

Eksempel

Finn verdien til x .



Svar

Vi har at

$$x^2 = 2^2 + (1 + \sqrt{3})^2 - 2 \cdot 2(1 + \sqrt{3}) \cos 60^\circ$$

Da $\cos 60 = \frac{1}{2}$, har vi at


$$x^2 = 2^2 + (1 + \sqrt{3})^2 - 2(1 + \sqrt{3}) = 6$$

Altså er $x = \sqrt{6}$.

3.11 Median

En **median** er et linjestykke som går fra et hjørne i en trekant til midtpunktet på den motstående siden i trekanten.

De tre medianene i en trekant skjærer hverandre i ett og samme punkt.




Gitt $\triangle ABC$ med medianer CD , BF og AE , som skjærer hverandre i G . Da er

$$\frac{CG}{GD} = \frac{BG}{GF} = \frac{AG}{GE} = 2$$


3.12 Omskrevet sirkel

Midtnormalene til en trekant møtes i ett og samme punkt, som er sentrum i den **omskrevne sirkelen** til trekanten. Hjørnene til trekanten ligger på buen til den omskrevne sirkelen.




3.13 Innskrevet sirkel

Halveringslinjene til vinklene i en trekant møtes i ett og samme punkt. Dette punktet er sentrum i trekantens **innskrevne sirkel**, som tangerer hver av sidene til trekanten.



3.4 Forklaringer

3.11 Median (forklaring)



Medianene møtes i ett og samme punkt

Vi vil her skrive arealet til en trekant $\triangle ABC$ som ABC . Vi lar G være skjæringspunktet til BF og AE , og tar det for gitt at dette ligger inne i $\triangle ABC$. Da $AF = \frac{1}{2}AC$ og $BE = \frac{1}{2}BC$, er $ABF = BAE = \frac{1}{2}ABC$. Dermed har F og E lik avstand til AB , som betyr at $FE \parallel AB$. Videre har vi også at

$$\begin{aligned} ABG + AFG &= ABG + BGE \\ AFG &= BGE \end{aligned}$$

G har lik avstand til AF og FC , og $AF = FC$. Dermed er $AFG = GFC$. Tilsvarende er $BGE = GEC$. Altså har disse fire trekantene likt areal. Videre er

$$\begin{aligned} AFG + GFC + GEC &= AEC \\ GEC &= \frac{1}{6}ABC \end{aligned}$$

La H være skjæringspunktet til AE og CD . Med samme framgangsmåte som over kan det vises at

$$HEC = \frac{1}{6}ABC$$

Da $\triangle GEC$ og $\triangle HEC$ har CE som side og likt areal, og både G og H ligger på AE , må $G = H$. Altså skjærer medianene hverandre i ett og samme punkt.

Forholdstall lik 2

$\triangle ABC \sim \triangle FEC$ fordi de har parvis parallelle sider. Dermed er

$$\frac{AB}{FE} = \frac{BC}{CE} = 2$$


$\triangle ABG \sim \triangle EFG$ fordi $\angle EGF$ og $\angle AGB$ er toppvinkler og $AB \parallel FE$. Dermed er

$$\frac{GB}{FG} = \frac{AB}{FE} = 2$$

Tilsvarende kan det vises at

$$\frac{CG}{GD} = \frac{AG}{GE} = 2$$


3.12 Omskrevet sirkel (forklaring)



Gitt $\triangle ABC$ med midtpunktene D , E og F . Vi lar S være skjæringspunktet til de respektive midtnormalene til AC og AB . $\triangle AFS \cong \triangle CFS$ fordi begge er rettvinklede og har FS som katet, og $AF = FC$. Tilsvarende er $\triangle ADS \cong \triangle BDS$. Følgelig er $CS = AS = BS$. Dette betyr at

- $\triangle BSC$ er likebeint, og da går midtnormalen til BC gjennom S .
- A , B og C har lik avstand til S , og ligger da på buen til sirkelen med sentrum i S og radius $AS = BS = CS$.

3.13 Innskrevet sirkel (forklaring)



Det kan innskrives en sirkel som tangerer sidene


Gitt $\triangle ABC$. Vi lar S være skjæringspunktet til de respektive halveringslinjene til $\angle BAC$ og $\angle CBA$. Videre plasserer vi D , E og F slik at $DS \perp AB$, $ES \perp BC$ og $FS \perp AC$. $\triangle ASD \cong \triangle ASF$ fordi begge er rettvinklede og har hypotenus AS , og $\angle DAS = \angle SAF$. Tilsvarende er $\triangle BSD \cong \triangle BSE$. Dermed er $SE = SD = SF$. Sirkelen med sentrum i S og radius SE vil dermed tangere sidene til $\triangle ABC$ i F , D og E .

Halveringslinjene møtes i sentrum i den innskrevne sirkelen

Vi har at $\triangle CSE \cong \triangle CSF$, fordi begge er rettvinklede og har hypotenus CS , og $SF = SE$. Altså er $\angle FCS = \angle ECS$, som betyr at CS ligger på halveringslinja til $\angle ACB$.


3.6 Tangent (forklaring)

Linja er en tangent til sirkelen $\Rightarrow AS$ står vinkelrett på linja



Vi antar at vinkelen mellom linja og AS er ulik 90° . Da må det finnes et punkt B på linja slik at $\angle BAS = \angle SBA$, som betyr at $\triangle ASB$ er likebeint. Følgelig er $AS = BS$, og da AS er lik radien i sirkelen, må dette bety at B også ligger på sirkelen. Dette motsier at A er det eneste skjæringspunktet til sirkelen og linja, og dermed må vinkelen mellom linja og AS være 90° .


AS står vinkelrett på linja $\Rightarrow$ Linja er en tangent til sirkelen



Gitt et vilkårlig punkt B , som ikke samsvarer med A , på linja. Da er BS hypotenusen i $\triangle ASB$. Dette innebærer at BS er større enn radien til sirkelen ($BS > AS$), og da kan B umulig ligge på sirkelen. Altså er A det eneste punktet som ligger på både linja og sirkelen, og dermed er linja en tangent til sirkelen.

3.8 Arealsetningen (forklaring)

Gitt to tilfeller av $\triangle ABC$, som vist i figurene under. Det éne hvor $\angle BAC \in (0^\circ, 90^\circ]$, det andre hvor $\angle BAC \in (90^\circ, 180^\circ)$. La h være høyden med grunnlinje AB .



Arealet T til $\triangle ABC$ er i begge tilfeller


$$T = \frac{1}{2} AB \cdot h$$

Av henholdsvis [definisjon 3.4](#) og [definisjon 3.5](#) har vi at $h = AC \cdot \sin \angle BAC$, og da er

$$T = \frac{1}{2} AB \cdot h = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin \angle BAC$$

3.10 Cosinussetningen (forklaring)

Tilfellet hvor $v \in (90^\circ, 180^\circ]$



Av Pytagoras' setning har vi at

$$x^2 = b^2 - h^2 \quad (3.1)$$

og at

$$a^2 = (x + c)^2 + h^2 \quad (3.2)$$

$$= x^2 + 2xc + c^2 + h^2 \quad (3.3)$$

Ved å sette uttrykket for x^2 fra (3.1) inn i (3.3), får vi at


$$a^2 = b^2 - h^2 + 2xc + c^2 + h^2 \quad (3.4)$$

$$= b^2 + c^2 + 2xc \quad (3.5)$$

Av [definisjon 3.5](#) har vi at $x = -b \cos v$, og da er

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos v$$

Tilfellet hvor $v \in [0^\circ, 90^\circ]$



Dette tilfellet skiller seg fra tilfellet hvor $v \in (90^\circ, 180^\circ]$ på to måter:

(i) I (3.2) får vi $(c - x)^2$ i stedet for $(x + c)^2$. I (3.5) får vi da $-2xc$ i stedet for $+2xc$.

(ii) Av [definisjon 3.4](#) er $x = b \cos v$. Av punkt (i) følger det da at


$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos v$$

3.7 Sentral- og periferivinkel (forklaring)

Tilhørende periferi- og sentralvinkler kan deles inn i tre tilfeller.

(i) En diameter i sirkelen er høyre eller venstre vinkelbein i begge vinklene

I figuren under er S sentrum i sirkelen, $\angle BAC = u$ en periferivinkel og $\angle BSC = v$ den tilhørende sentralvinkelen. Vi setter $\angle SCB = a$. $\angle ACS = \angle SAC = u$ og $\angle CBS = \angle SCB = a$ fordi både $\triangle ASC$ og $\triangle SBC$ er likebeinte.



Vi har at

$$2a = 180^\circ - v \quad (3.6)$$

$$2u + 2a = 180^\circ \quad (3.7)$$


Vi setter uttrykket for $2a$ fra (3.6) inn i (3.7):

$$2u + 180^\circ - v = 180^\circ$$

$$2u = v$$

(ii) Vinklene ligger innenfor samme halvdel av sirkelen

I figuren under er u en periferivinkel og v den tilhørende sentralvinkelen. I tillegg har vi tegnet inn en diameter, som er med på å danne vinklene a og b . Både u og v ligger i sin helhet på samme side av denne diameteren.



Ettersom $u + a$ er en periferivinkel, og $v + b$ den tilhørende sentralvinkelen, vet vi av tilfelle 1 at

$$2(u + a) = v + b$$


Men ettersom a og b også er samhørende periferi- og sentralvinkler, er $2a = b$. Det betyr at

$$2u + b = v + b$$

$$2u = v$$

(iii) Vinklene ligger ikke innenfor samme halvdel av sirkelen

I figuren under er u en periferivinkel og v den tilhørende sentralvinkelen. I figuren til høyre har vi tegnet inn en diameter. Den deler u inn i vinklene a og c , og v inn i b og d .



a og c er begge periferivinkler, med henholdsvis b og d som tilhørende sentralvinkler. Av tilfelle i) har vi da at

$$2a = b$$

$$2c = d$$

Dermed er

$$2a + 2c = b + d$$


$$2(a + c) = v$$

$$2u = v$$

Oppgaver for kapittel 3

3.1.1

- a) Vis at $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Finn $\sin 45^\circ$.
- b) Vis at $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.
- c) Vis at $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- d) Finn $\sin 60^\circ$ og $\cos 60^\circ$.
- e) Finn $\tan 45^\circ$, $\tan 30^\circ$ og $\tan 60^\circ$



3.1.2

Gitt en rettvinklet trekant hvor u og v er de to spisse vinklene.
Vis at


$$\cos(90^\circ - u) = \cos(v)$$

3.1.3

Vis at $\tan v = \frac{\sin v}{\cos v}$.

3.1.4

Vis at hvis $u = 180^\circ - v$, så er $\sin u = \sin v$ og $\cos u = -\cos v$.



3.1.5

Bruk [oppgave 3.1.4](#) til å finne $\sin x$, $\cos x$ og $\tan x$ når

- a) $x = 180^\circ$ b) $x = 150^\circ$ c) $x = 135^\circ$ d) $x = 120^\circ$

3.1.6 (1TH22, 1TV23 og 1TV24)

- a) Bruk figuren til å vise at

$$(\sin u)^2 + (\cos u)^2 = 1$$


- b) Bruk figuren til å vise at

$$\frac{\sin u}{\cos u} = \tan u$$

- c) Bruk figuren til å vise at



$$\tan u \tan v = 1$$

- d) Vis at likningene fra a), b) og c) gjelder for alle rettvinklede trekanter.




3.2.1

De markerte punktene er sentrum i sirklene. Finn verdien til v .



3.2.2

Forklar hvorfor det av [regel 3.7](#) følger at to periferivinkler som spenner over samme sirkelbue er like store.




3.2.3

- a) Vis at Tales' setning (se [MB](#)) følger av [regel 3.7](#).
- b) Gitt en rettvinklet trekant $\triangle ABC$ med hypotenus AB . Hvilken av $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ og $\Longleftrightarrow$ skal erstatte $?$ under for å beskrive det *omvendte* tilfellet av Tales' setning?

$\angle C = 90^\circ$? AB er en diameter i den omskrevne sirkelen til $\triangle ABC$

3.2.4

Den røde linja tangerer sirkelen. Vis at $\angle BAC = \angle EBC$.



3.2.5


Gitt en trekant med sidelengder a , b og c og innskrevet sirkel med radius r . Vis at arealet T til trekanten er gitt ved

$$T = \frac{1}{2}(a + b + c)r$$

3.2.6

La $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$ og $DM = r$.

- Vis at $r = \frac{ac}{a+b+c}$.
- Vis at $2r = a + c - b$.
- Bruk uttrykkene fra oppgave a) og b) til å finne b^2 uttrykt ved a og c .



3.3.1 (1TV21)

I $\triangle ABC$ er $AC = 10$ hypotenusen, og $\sin \angle A = \frac{3}{5}$. Bestem lengden til BC .

3.3.2 (1TV25)

- Gitt $\triangle ABC$ der $AB = 10$, $AC = 6$, og $\angle A = 30^\circ$. Finn arealet til trekanten.
- Gitt $\triangle PQR$ der $PQ = 8$, $PR = 3$ og $P = 60^\circ$. Finn lengden til QR .

3.3.3

Finn arealet til $\triangle ABC$ når

- $\angle A = 60^\circ$, $AB = 5$ og $AC = 7$.
- $\angle B = 18^\circ$, $AB = 4$ og $BC = 3$. $\left(\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}\right)$
- $\angle A = 75^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $AC = \sqrt{6}$ og $BC = \sqrt{3} + 1$

3.3.4

Bruk arealsetningen til å finne arealet til en likesidet trekant med sidelengde 4.

3.3.5

- a) Bevis arealsetningen. b) Bevis sinussetningen.

3.3.6 (1TH21)

Om en rettvinklet trekant $\triangle ABC$ får du vite at

- $\cos \angle A = \frac{1}{2}$
- $\sin \angle C = \frac{1}{2}$
- $AB = 4$


Bestem AC .

3.3.7 (1TV26)

Om en trekant $\triangle ABC$ får du vite at $\angle B = 90^\circ$ og $\tan \angle A = 1$.
Lag en figur og forklar hvordan denne trekanten kan se ut.


3.3.8 (1TH21D1)

Bestem lengden til BC .




3.3.9 (1TV26)

- a) Bestem arealet til trekanten.
b) Bestem omkretsen til trekanten.



Gruble* 23

De respektive stigningstallene til de lineære funksjonene f og g er q og p . Forklar at $q = \tan u$ og $p = -\tan v$.



Gruble* 24 (1TV24)

For $\triangle ABC$ har vi at


- $AB = 8$
- $\angle A = 120^\circ$
- Arealet til trekanten er $4\sqrt{3}$

Finne de respektive lengdene til AC og BC .

Gruble* 25 (1TH22)


Arealet til $\triangle SBC$ er $3\sqrt{2}$. S er sentrum i sirkelen.

- Finne radien til sirkelen.
- Finne arealet til $\triangle ABC$.



Gruble* 26 (1TV23)

Arealet til $\triangle ABC$ er $2\sqrt{3}+6$. S er sentrum i sirkelen. Finn radien til sirkelen.

**Gruble* 27** (1TH22)

Den ukjente sidelengden x i en trekant oppfyller cosinussetningen

$$14^2 = 16^2 + x^2 - 16x$$


- Hvilke flere opplysninger om trekanten vet vi ut fra dette?
- Finn sidelengdene trekanten potensielt kan ha.
- Bytt ut 14 i likningen med tallet som gjør at det bare er én løsning for x .

Gruble* 28

Vi har at $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$. Finn $\cos 15^\circ$, $\sin 75^\circ$, $\cos 75^\circ$ og $\tan 15^\circ$.

Gruble* 29 (1TV22)

Finn omkretsen til $\square ABCD$ uttrykt ved a .



Gruble* 30 (1TV21D1)


Sorter verdiene i stigende rekkefølge.

$$\sin 60^\circ, \quad \left(\frac{3}{4}\right)^{-1}, \quad \sin 160^\circ, \quad \log 1$$

Grunngi svaret ditt.

Gruble* 31 (1TH23 og 1TH24)

- Bruk trekanten til å vise at $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.
- $2 \sin u \cos u = \sin(2u)$ er en identitet. Bruk trekanten til å vise at dette stemmer for $u = 30^\circ$.

**Gruble* 32** (1TV22)

Om en rettvinklet trekant $\triangle ABC$ får du vite at $\tan \angle B = \frac{3}{4}$.


- Kan det være riktig at $\sin \angle B = \frac{3}{10}$?
- Kan det være riktig at de respektive lengdene til de to katetene er 6 og 8?
- Kan det være riktig at hypotenusen er kortere enn 4?

Begrunn svarene dine.

Gruble* 33 (1TH23)

Hvilken av de to trekantene har størst areal?


Husk å argumentere for at svaret ditte er rett.



Gruble* 34 (1TV25)

En tolvkant med areal 120 er innskrevet i en sirkel. Tolvkanten kan deles inn i 12 kongruente trekkanter.


- a) Finn radien til sirkelen.
- b) Finn omkretsen til tolvkanten



Gruble* 35

Vis at


$$u = 180^\circ - v$$



Gruble* 36

Vis at

$$AP \cdot PB = DP \cdot PC$$




Merk: Dette resultatet kalles ofte **kordeteoremet**.

Gruble* 37

Bevis cosinussetningen.

Gruble* 38

La r være radien til halvsirkelen. Uttrykk arealet til det blå området ved v og r .



Gruble* 39


Vis at

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Gruble* 40

La r være radien til den omskrevne sirkelen til $\triangle ABC$. Vis at

$$r = \frac{abc}{4A_{\triangle ABC}}$$



Gruble* 41

Vis at

$$\cos(u + v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v$$


Det er tilstrekkelig å undersøke tilfellet hvor $v, u \in [0^\circ, 90^\circ]$.

Gruble* 42

Bevis det omvendte tilfellet av Tales teorem (se [oppgave 3.2.3](#)).

Gruble 43


E er midtpunktet til kvadratet. Finn verdien til v .



Gruble 44


Vis at

$$AB^2 = BC \cdot BD$$



Gruble 45

Vis at $\sin 18^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{5} - 1)$. (Hint: Se figur.)




Kapittel 4

Vektorer

4.1 Definisjoner

En **todimensjonal vektor** angir en forflytning i et koordinatsystem med en x -akse og en y -akse. En vektor tegner vi som et linjestykke mellom to punkt, i tillegg til at vi lar en pil vise til hva som er endepunktet. Det betyr at forflytningen starter i punktet uten pil, og ender i punktet med pil.



I figur (a) er vektoren $\vec{v}$ vist med startpunkt $(0,0)$ og endepunkt $(2,3)$. Når en vektor har startpunkt $(0,0)$, sier vi at den er vist i **grunnstillingen**. I figur (b) er $\vec{v}$ vist med startpunkt $(1,-2)$ og endepunkt $(3,1)$. Forflytningen $\vec{v}$ viser til er å vandre 2 mot høyre langs x -aksen og 3 opp langs y -aksen. Dette skriver vi som $\vec{v} = [2, 3]$, som er $\vec{v}$ skrevet på **komponentform**. 2 og 3 er henholdsvis x -komponenten og y -komponenten til $\vec{v}$.


Språkboksen

En vektor med to komponenter kalles en **todimensjonal vektor** eller en **vektor i planet**.

Komponent kan i mange sammenhenger ses på som et synonym for *koordinat*.

Eksempel 1

$$\vec{a} = [1, 3] \quad , \quad \vec{b} = [0, -2] \quad , \quad \vec{c} = [-3, -4] \quad , \quad \vec{d} = [5, 0]$$



4.1 Vektoren mellom to punkt

En vektor $\vec{v}$ med startpunkt (x_1, y_1) og endepunkt (x_2, y_2) er gitt som

$$\vec{v} = [x_2 - x_1, y_2 - y_1]$$

Eksempel 1

Skriv vektorene på komponentform.

$\vec{a}$ har startpunkt $(1, 3)$ og endepunkt $(7, 5)$.

$\vec{b}$ har startpunkt $(0, 9)$ og endepunkt $(-3, 2)$.

$\vec{c}$ har startpunkt $(-3, 7)$ og endepunkt $(2, -4)$.

$\vec{d}$ har startpunkt $(-7, -5)$ og endepunkt $(3, 0)$.

Svar

$$\vec{a} = [7 - 1, 5 - 3] = [6, 2]$$

$$\vec{b} = [-3 - 0, 2 - 9] = [-3, -7]$$

$$\vec{c} = [2 - (-3), -4 - 7] = [5, -11]$$

$$\vec{d} = [3 - (-7), 0 - (-5)] = [10, 5]$$

Punkt eller vektor

Rent matematisk er det ingen forskjell på et punkt og en vektor; punktet (a, b) viser til akkurat samme plassering som vektoren $[a, b]$, og begge kan vise til den samme forflytningen. Ofte kan det likevel være greit å skille mellom når vi snakker om en plassering og når vi snakker om en forflytning, og til det bruker vi begrepene punkt (plassering) og vektorer (forflytning).

4.2 Regneregler for vektorer

4.2 Addisjon og subtraksjon av vektorer


Gitt vektorene $\vec{u} = [x_1, y_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2]$, og punktet $A = (x_0, y_0)$. Da er

$$A + \vec{u} = (x_0 + x_1, y_0 + y_1)$$

$$\vec{u} + \vec{v} = [x_1 + x_2, y_1 + y_2]$$

$$\vec{u} - \vec{v} = [x_1 - x_2, y_1 - y_2]$$

Summen eller differansen av $\vec{u}$ og $\vec{v}$ kan vi tegne slik:



4.3 Regneregler for vektorer

For vektorene $\vec{u} = [x_1, y_1]$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$, og et tall t , har vi at

$$t\vec{u} = [tx_1, ty_1]$$

$$t(\vec{u} + \vec{v}) = t\vec{u} + t\vec{v}$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$$

$$\vec{u} - (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} - \vec{v} - \vec{w}$$

Eksempel 1

Skriv uttrykket så enkelt som mulig.


$$t(\vec{u} + \vec{v}) - (t\vec{u} + \vec{v})$$

Svar

$$t(\vec{u} + \vec{v}) - (t\vec{u} + \vec{v}) = t\vec{u} + t\vec{v} - t\vec{u} - \vec{v} = (t - 1)\vec{v}$$

Eksempel 2

I trekanten under er $AB = 5AD$ og $BC = 4BF$.
Finn $\overrightarrow{AC}$ uttrykt ved $\vec{u}$ og $\vec{v}$.




Svar

Vi har at

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \\ &= 5\overrightarrow{AD} + 4\overrightarrow{BF} \\ &= 5\vec{u} + 4 \cdot (-\vec{v}) \\ &= 5\vec{u} - 4\vec{v}\end{aligned}$$

4.4 Vinkelen mellom to vektorer

Vinkelen mellom to vektorer er (den minste) vinkelen som blir dannet når vektorene plasseres i samme startpunkt. For to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ skriver vi denne vinkelen som $\angle(\vec{u}, \vec{v})$.




Vinkelmål

I vektorregning er det vanlig å oppgi vinkler i grader, altså på intervallet $[0^\circ, 180^\circ]$.

4.3 Lengden til en vektor

Gitt en vektor $\vec{v} = [x_1, y_1]$. **Lengden** til $\vec{v}$ er avstanden mellom startpunktet og endepunktet.



Av en vektor kan vi danne en rettvinklet trekant hvor $|\vec{v}|$ er lengden til hypotenusen, og $|x_1|$ og $|y_1|$ er de respektive lengdene til katetene. Dermed er $|\vec{v}|$ gitt av Pytagoras' setning.

4.5 Lengden til en vektor

Gitt en vektor $\vec{v} = [x_1, y_1]$. Lengden $|\vec{v}|$ er da

$$|\vec{v}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

Eksempel 1

Finn lengdene til vektorene $\vec{a} = [7, 4]$ og $\vec{b} = [-3, 2]$.

Svar

$$|\vec{a}| = \sqrt{7^2 + 4^2} = \sqrt{65}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

4.4 Skalarproduktet

Skalarproduktet I

4.6 Skalarproduktet I

For to vektorer $\vec{u} = [x_1, y_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2]$, er **skalarproduktet** gitt som

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

Språkboksen

Skalarproduktet kalles også **prikkproduktet** eller **indreproduktet**.

Ordet *skalar* viser til en éndimensjonal størrelse, altså et tall.

Eksempel 1

Gitt vektorene $\vec{a} = [3, 2]$, $\vec{b} = [4, 7]$ og $\vec{c} = [1, -9]$. Regn ut $\vec{a} \cdot \vec{b}$ og $\vec{a} \cdot \vec{c}$.

Svar

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 7 = 26$$

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = 3 \cdot 1 + 2(-9) = -15$$

4.7 Regneregler for skalarproduktet

For vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$ har vi at

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

$$(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$$

Eksempel

Forkort uttrykket

$$\vec{b} \cdot (\vec{a} + \vec{c}) + \vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{b}^2$$

når du vet at $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$.

Svar

$$\begin{aligned}\vec{b} \cdot (\vec{a} + \vec{c}) + \vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{b}^2 &= \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 \\ &= \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 \\ &= (\vec{a} + \vec{b})^2\end{aligned}$$

Skalarproduktet II

Gitt vektoren $\vec{u} - \vec{v}$, hvor $\vec{u} = [x_1, y_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2]$. Da er

$$\vec{u} - \vec{v} = [x_1 - x_2, y_1 - y_2]$$


Av [regel 4.5](#) har vi at

$$\begin{aligned}|\vec{u} - \vec{v}| &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \\ &= \sqrt{x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + y_1^2 - 2y_1y_2 + y_2^2}\end{aligned}\tag{4.1}$$

Ved hjelp av [regel 4.6](#) og [regel 4.7](#) kan vi skrive (4.1) som

$$|\vec{u} - \vec{v}| = \sqrt{\vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2}\tag{4.2}$$

Videre merker vi oss følgende figur:



Av [cosinussetningen](#) ([regel 3.10](#)) og (4.2) er

$$\begin{aligned} |(\vec{v} - \vec{u})|^2 &= |\vec{v}|^2 + |\vec{u}|^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}| \cos \angle(\vec{u}, \vec{v}) \\ \vec{v}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u}^2 &= \vec{v}^2 + \vec{u}^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}| \cos \angle(\vec{u}, \vec{v}) \\ \vec{u} \cdot \vec{v} &= |\vec{u}||\vec{v}| \cos \angle(\vec{u}, \vec{v}) \end{aligned}$$

4.8 Skalarproduktet II

For to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \angle(\vec{u}, \vec{v})$$

Eksempel

For vektorene $\vec{u}$ og $\vec{v}$ har vi at $|\vec{u}| = 4$, $|\vec{v}| = 5$, og $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 60^\circ$. Finn skalarproduktet av $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

Svar

Da $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, har vi at

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = 10$$

4.5 Vektorer vinkelrett på hverandre

Fra [regel 4.8](#) kan vi gjøre en viktig observasjon; hvis $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 90^\circ$, er $\cos \angle(\vec{u}, \vec{v}) = 0$, og da blir

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

4.9 Vinkelrette vektorer

For to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ har vi at

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \vec{u} \perp \vec{v}$$

Språkboksen

Det er mange måter å uttrykke at $\vec{u} \perp \vec{v}$ på. Blant annet kan vi si at

- $\vec{u}$ og $\vec{v}$ står vinkelrette på hverandre.
- $\vec{u}$ og $\vec{v}$ står normalt på hverandre.
- $\vec{u}$ er en normalvektor til $\vec{v}$ (og omvendt).
- $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er ortogonale.

Eksempel 1

Sjekk om vektorene $\vec{a} = [5, -3]$, $\vec{b} = [6, 10]$ og $\vec{c} = [2, 7]$ er ortogonale.

Svar

Vi har at

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 5 \cdot 6 + (-3) \cdot 10 = 0$$

Altså er $\vec{a} \perp \vec{b}$. Videre er

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = 5 \cdot 2 + (-3) \cdot 7 = 11$$

Altså er $\vec{a}$ og $\vec{c}$ *ikke* ortogonale. Videre er

$$\vec{b} \cdot \vec{c} = 6 \cdot 2 + 10 \cdot 7 = 82$$

Altså er $\vec{b}$ og $\vec{c}$ *ikke* ortogonale.

Nullvektoren

I forkant av [regel 4.9](#) har vi bare argumentert for at $\vec{u} \perp \vec{v} \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. For å rettferdiggjøre vilkåret som går begge veier, må vi vise at hvis $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, så er $\vec{u} \perp \vec{v}$.


På intervallet $[0^\circ, 180^\circ]$ er det bare $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 90^\circ$ som gir at $\cos \angle(\vec{u}, \vec{v}) = 0$. Skal skalarproduktet være 0 for andre vinkler, må derfor lengden av $\vec{u}$ eller $\vec{v}$ være 0. Den eneste vektoren med lengde 0 er **nullvektoren** $\vec{0} = [0, 0]$, som rett og slett ikke har noen retning¹. Det er likevel vanlig å definere at nullvektoren står vinkelrett på *alle* vektorer.

¹Eventuelt kan man si at den peker i alle retninger!

4.6 Parallele vektorer

4.10 Parallele vektorer

Hvis vinkelen mellom to vektorer er 0° eller 180° , er de parallelle.



Gitt vektorene $\vec{u} = [x_1, y_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2]$. La θ og α være vinkelen mellom x -aksen og henholdsvis $\vec{u}$ og $\vec{v}$, med x -aksen som høyre vinkelbein. Da er $\tan \theta = \frac{y_1}{x_1}$ og $\tan \alpha = \frac{y_2}{x_2}$. Hvis $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$, er det to muligheter:

(i) $\theta = 0^\circ$ og $\alpha = 180^\circ$, eller omvendt.

(ii) $\theta = \alpha$

I begge tilfeller er $\angle(\vec{u}, \vec{v})$ enten 0° eller 180° , og da er $\vec{u}$ og $\vec{v}$ parallelle. Det omvendte gjelder også: Hvis punkt (i) eller (ii) gjelder, er $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$. Det er ofte praktisk å omskrive denne sammenhengen til forholdet mellom **samsvarende komponenter**¹:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} \quad (4.3)$$

Det er også nyttig å merke seg at det må finnes to tall s og t slik at $\vec{u} = [sx_2, ty_2]$. Hvis $\vec{u} \parallel \vec{v}$, følger det av (4.3) at $\frac{sx_2}{x_2} = \frac{ty_2}{y_2}$. Dermed er $s = t$. Omvendt; hvis $\vec{u} = t[x_2, y_2]$, oppfyller $\vec{u}$ og $\vec{v}$ åpenbart (4.3).

¹For vektorene $[x_1, y_1]$ og $[x_2, y_2]$ er disse samsvarende komponenter:

- x_1 og x_2
- y_1 og y_2

4.11 Parallele vektorer

For to vektorer $\vec{u} = [x_1, y_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2]$ har vi at

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$$

Alternativt, for et tall t har vi at

$$\vec{u} = t\vec{v} \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$$

Språkboksen

Når $\vec{u} = t\vec{v}$, sier vi at $\vec{u}$ er et **multiplum** av $\vec{v}$ (og omvendt). Vi sier også at $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er **lineært avhengige**.

Om to vektorer ikke er parallelle, sier vi at de er **lineært uavhengige**.

Eksempel

Sjekk om $\vec{a} = [2, -3]$ og $\vec{b} = [20, -45]$ er parallelle med $\vec{c} = [10, -15]$.

Svar

Vi har at

$$\vec{c} = 5[2, -3] = 5\vec{a}$$

Dermed er $\vec{a} \parallel \vec{c}$. Da $\frac{20}{10} \neq \frac{-45}{-15}$, er $\vec{b}$ og $\vec{c}$ *ikke* parallelle.

4.7 Vektorfunksjoner

Parameterisering

4.12 Vektorfunksjon

Gitt to funksjoner $f(t)$ og $g(t)$. En vektor $\vec{v}$ på formen


$$\vec{v}(t) = [f(t), g(t)]$$

er da en **vektorfunksjon**.

Alternativt kan $\vec{v}$ skrives som

$$\vec{v}(t) : \begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$$

Mengden av alle endepunktene til $\vec{v}$ utgjør grafen til $\vec{v}$.




Språkboksen

Koordinater uttrykt ved én eller flere variabler (parametre) kalles en **parameterisering**. En vektorfunksjon er altså en parameterisering av en kurve.

Vektorfunksjonen til en linje

Gitt en linje beskrevet av vektorfunksjonen $\vec{l}(t)$, som vist i figuren under. Vi omtaler denne linja som linja $\vec{l}$.



Hvis en vektor $\vec{r}$ er parallell med $\vec{l}$, kalles den en **retningsvektor** for linja. Si at $\vec{r} = [a, b]$ er en retningsvektor for $\vec{l}$, og at $A = (x_0, y_0)$ er et punkt på $\vec{l}$. Om vi starter i A og vandrer parallellt med $\vec{r}$, kan vi være sikre på at vi fortsatt befinner oss på linja. Dette må bety at vi for en variabel t kan nå et vilkårlig punkt $B = (x, y)$ på linja ved følgende utregning:

$$B = A + t\vec{r}$$

På koordinatform kan vi skrive dette som

$$(x, y) = (x_0 + at, y_0 + bt)$$

Altså kan linja skrives som en vektorfunksjon:

4.13 Linje som vektorfunksjon

En linje $\vec{l}(t)$ som går gjennom punktet $A = (x_0, y_0)$ og har retningsvektor $\vec{r} = [a, b]$ er gitt ved

$$\vec{l} = A + t\vec{r} = [x_0 + at, y_0 + bt]$$

Eksempel 1

En linje $\vec{l}(t)$ går gjennom punktene $(3, 6)$ og $(5, 13)$. Finn uttrykket til $\vec{l}$.

Svar

Vi finner retningsvektoren $\vec{r}$ til linja:

$$\vec{r} = [5 - 3, 13 - 6] = [2, 7]$$

Altså er

$$\vec{l}(t) = (3, 6) + t[2, 7] = [3 + 2t, 6 + 7t]$$

Alternativt kan vi skrive

$$\vec{l}(t) : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 6 + 7t \end{cases}$$

Merk: Vi kunne like gjerne brukt $(5, 13)$ i stedet for $(3, 6)$ i uttrykket til $\vec{l}$.

Eksempel 2

Gitt linja $\vec{l}(t) = [2 + 3t, 6 - 5t]$.

- Bruk uttrykket til $\vec{l}$ for å finne et punkt på linja, og for å finne en retningsvektor for linja.
- Avgjør om punktet $(32, -60)$ ligger på linja.

Svar

- Av uttrykket til $\vec{l}$ ser vi at $(2, 6)$ er et punkt på linja, og at $[3, -5]$ er en retningsvektor for linja.

b) Metode 1

Skal punktet ligge på linja, må vektoren mellom $(2, 6)$ og $(32, -60)$ være en retningsvektor til linja. Denne vektoren er gitt som

$$[32 - 2, -60 - 6] = [30, -66] = 6[5, -11]$$

Denne vektoren er ikke parallell med $[3, -5]$, og dermed ligger ikke $(32, -60)$ på linja.

Metode 2


Skal $(32, -60)$ ligge på linja, må vi ha at

$$\begin{aligned} 2 + 3t &= 32 \\ t &= 10 \end{aligned}$$

Men $6 - 5 \cdot 10 \neq -60$, og dermed ligger ikke punktet på linja.

4.8 Sirkellikningen

Gitt en sirkel med sentrum $S = (x_0, y_0)$, og et punkt $A = (x, y)$.



Da er

$$\overrightarrow{SA} = [x - x_0, y - y_0]$$

Av [regel 4.5](#) er da

$$|\overrightarrow{SA}|^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$$

Vi lar r være radien til sirkelen. Hvis A ligger på sirkelen, er $|\overrightarrow{SA}| = r$, og dermed kan vi uttrykke r ved koordinatene til S og A . Hvis A ikke ligger på sirkelen, er $|\overrightarrow{SA}| \neq r$.

4.14 Sirkellikningen

Gitt en sirkel med radius r og sentrum $S = (x_0, y_0)$. Hvis punktet $A = (x, y)$ ligger på buen til sirkelen, er

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

Hvis likningen ikke er oppfylt, ligger ikke A på sirkelbuen.

Eksempel

Finn sentrum og radien til sirkelen gitt av likningen

$$x^2 + y^2 - 4x + 10y - 20 = 0 \quad (4.4)$$

Svar

Vi starter med å lage fullstendige kvadrat:

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 2^2$$

$$y^2 + 10y = (y + 5)^2 - 5^2$$

Altså kan vi skrive (4.4) som

$$(x - 2)^2 + (y + 5)^2 - 2^2 - 5^2 - 20 = 0$$

$$(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 7^2$$

Dermed har sirkelen sentrum $(2, -5)$ og radius 7.

4.9 Determinanter

4.15 2×2 determinanter

Determinanten $\det(\vec{u}, \vec{v})$ av to vektorer $\vec{u} = [a, b]$ og $\vec{v} = [c, d]$ er gitt som

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Eksempel

Gitt vektorene $\vec{u} = [-1, 3]$ og $\vec{v} = [-2, 4]$. Regn ut $\det(\vec{u}, \vec{v})$.


Svar

$$\begin{aligned} \det(\vec{u}, \vec{v}) &= \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} \\ &= (-1) \cdot 4 - 3 \cdot (-2) \\ &= 2 \end{aligned}$$

4.16 Arealformler med determinanter


Arealet A til et parallelogram formet av to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er gitt som

$$A = |\det(\vec{u}, \vec{v})|$$



Arealet A til en trekant formet av to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er gitt som

$$A = \frac{1}{2} |\det(\vec{u}, \vec{v})|$$



Eksempel

Finn arealet A til parallelogrammet utspent av vektorene $\vec{u} = [1, 1]$ og $\vec{v} = [-2, 5]$.

Svar


Vi har at

$$A = |\det(\vec{u}, \vec{v})| = |1 \cdot 5 - 1 \cdot (-2)| = 7$$

4.17 Avstand mellom punkt og linje

Avstanden h mellom et punkt B og en linje gitt av punktet A og retningsvektoren $\vec{r}$ er gitt som

$$h = \frac{|\det(\overrightarrow{AB}, \vec{r})|}{|\vec{r}|}$$



Eksempel

Finn avstanden h mellom punktet $B = (-2, 3)$ og linja $\vec{l}(t) = [1 + t, -2 + 5t]$.

Svar

Linja er gitt av punktet $A = (1, -2)$ og retningsvektoren $\vec{r} = [1, 5]$. Da $\overrightarrow{AB} = [-3, 5]$, har vi at


$$\det(\overrightarrow{AB}, \vec{r}) = (-3) \cdot 5 - 5 \cdot 1 = -20$$

Videre er $|\vec{r}| = \sqrt{1^2 + 5^2} = \sqrt{26}$. Følgelig har vi at

$$h = \frac{|\det(\overrightarrow{AB}, \vec{r})|}{|\vec{r}|} = \frac{20}{\sqrt{26}}$$

4.17 Avstand mellom punkt og linje (forklaring)

La en linje $\vec{l}(t)$ i rommet være gitt av et punkt A og en rettingsvektor $\vec{r}$. I tillegg ligger et punkt B utenfor linja, som vist i figuren under



Den korteste avstanden fra B til linja er høyden h i trekanten formet av $\vec{r}$ og $\vec{AB}$. Arealet til denne trekanten er gitt av [regel 4.16](#):

$$\frac{1}{2} \left| \det \left(\vec{AB}, \vec{r} \right) \right|$$


Av den klassiske arealformelen for en trekant (se [MB](#)) har vi at

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} |\vec{r}| h &= \frac{1}{2} \left| \det \left(\vec{AB}, \vec{r} \right) \right| \\ h &= \frac{\left| \det \left(\vec{AB}, \vec{r} \right) \right|}{|\vec{r}|} \end{aligned}$$

4.10 Forklaringer

4.16 Arealformler med determinanter (forklaring)

Vi lar A_N betegne arealet til en geometrisk form N .



Gitt to vektorer $\vec{u} = [a, b]$ og $\vec{v} = [c, d]$, hvor $a, b, c, d > 0$, som vist i figur (a). Plasserer vi vektorene i grunnstillingen er punktene vist i figur (b) gitt som

$$\begin{aligned} O &= (0, 0) & B &= (a, b) & C &= (a + b, c + d) \\ D &= (c, d) & E &= (a + c, 0) & F &= (0, b + d) \end{aligned}$$

Med OE som grunnlinje, har $\triangle OEB$ høyde b , altså er

$$2A_{\triangle OEB} = (a + c)b$$

Tilsvarende er

$$2A_{\triangle FDO} = (b + d)c$$

Da $A_{\triangle OEB} = A_{\triangle CDF}$ og $A_{\triangle FDO} = A_{\triangle EBC}$, har vi at

$$\begin{aligned} A_{\square ABCD} &= A_{\square OECF} - 2A_{\triangle OEB} - 2A_{\triangle FDO} \\ &= (a + c)(b + d) - (a + c)b - (b + d)c \\ &= (a + c)d - (b + d)c \\ &= ad - bc \end{aligned}$$

I figurene har vi antatt at (den minste) vinkelen mellom $\vec{v}$ og x -aksen er mindre enn vinkelen mellom $\vec{u}$ og x -aksen. I omvendt tilfelle ville vi fått at

$$A_{\square OECF} = bc - ad$$

Altså er

$$A_{\square OECF} = |ad - bc|$$


På lignende måte kan det vises at dette gjelder for alle $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

Merk: Dette kan også vises veldig kortfattet ved å anvende trigonometri. Dette er gitt som en oppgave i [TM2](#).

Oppgaver for kapittel 4

4.1.1

Skriv $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$ og $\overrightarrow{CD}$ på komponentform.



4.2.1

Bruk figuren fra [oppgave 4.1.1](#), og vis ved regning at

a) $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD}$ b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$

4.2.2

Gitt punktene $A = (m, n)$ og $B = (s, t)$, og vektorene $\vec{a} = [m, n]$ og $\vec{b} = [s, t]$. Vis at midtpunktet til linjestykket AB er gitt ved uttrykket $(0, 0) + \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v})$.


4.2.3

Gitt vektorene $\vec{u} = [2, 1]$ og $\vec{v} = [1, -1]$. Tegn vektorene $\vec{a} = 2\vec{u} + \vec{v}$ og $\vec{b} = -\vec{u} - 3\vec{v}$ i grunnstillingen, i et rutenett bestående av kvadrater med lengde 1. Marker hver $\vec{u}$ og hver $\vec{v}$ (eventuelt med -1 som fortegn) henholdsvis $\vec{a}$ og $\vec{b}$ består av.

4.2.4

E er midtpunktet på CD , F utgjør $\frac{1}{3}$ av BC , og $AB = 4AD$. Finn vektorene uttrykt ved $\vec{u}$ og $\vec{v}$ (eller bare én av dem).

- a) $\overrightarrow{AF}$ b) $\overrightarrow{BC}$ c) $\overrightarrow{AC}$ d) $\overrightarrow{DC}$ e) $\overrightarrow{DE}$



4.3.1

Bestem lengden til hver av vektorene.

$$\vec{a} = [3, 4] \quad , \quad \vec{b} = [-1, 7] \quad , \quad \vec{c} = [-8, 6] \quad , \quad \vec{d} = [4, -3]$$

4.4.1

Gitt vektorene $\vec{u} = [-1, 5]$, $\vec{v} = [3, 7]$ og $\vec{w} = [-4, 0]$. Regn ut $\vec{u} \cdot \vec{v}$ og $\vec{u} \cdot \vec{w}$.

4.4.2

Gitt vektorene $\vec{u} = a[x_1, y_1]$ og $\vec{v} = b[x_2, y_2]$. Vis at

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = ab(x_1x_2 + y_1y_2)$$

4.4.3

a) Gitt $\vec{v} = [ca, cb]$. Vis at $|\vec{v}| = |c|\sqrt{a^2 + b^2}$.

b) Vis at $|\vec{u}|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$.

4.4.4

For vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$, og $\vec{w}$ har vi at $|\vec{u}| = 2$, $|\vec{v}| = 5$ og $|\vec{w}| = 4$. I tillegg er $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$ og $\vec{w} \cdot \vec{u} = 7$. Regn ut.

- a) $2\vec{u}^2 + 3\vec{u}(\vec{v} - \vec{w})$ b) $(\vec{u} - \vec{w})^2 + (\vec{u} + \vec{v})^2$

4.4.5

Finn skalarproduktet av $\vec{u}$ og $\vec{v}$ når

- a) $|\vec{u}| = 2$, $|\vec{v}| = 10$ og $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 30^\circ$.
- b) $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 7$ og $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 45^\circ$.
- c) $|\vec{u}| = 1$, $|\vec{v}| = 5$ og $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 120^\circ$.

4.4.6

Finn verdien til $\angle(\vec{u}, \vec{v})$ når du vet at

- a) $|\vec{u}| = 1$, $|\vec{v}| = 2$ og $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{3}$.
- b) $|\vec{u}| = 4$, $|\vec{v}| = 5$ og $\vec{u} \cdot \vec{v} = 10$.
- c) $|\vec{u}| = 3\sqrt{2}$, $|\vec{v}| = \sqrt{2}$ og $\vec{u} \cdot \vec{v} = -3\sqrt{2}$.

4.4.7

Erstatt $?$ med det riktige valget av $\geq$, $\leq$ eller $=$. Grunngi svaret.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} \quad ? \quad |\vec{u}||\vec{v}|$$

4.5.1

Undersøk om noen av vektorene fra [oppgave 4.3.1](#) står vinkelrett på hverandre.

4.5.2

Gitt vektorene $\vec{a} = [s, 1]$ og $\vec{b} = [-2, 8]$. Bestem s slik at $\vec{a}$ og $\vec{b}$ står vinkelrett på hverandre.

4.5.3

Gitt $\vec{v} = [a, b]$ og $\vec{u} = [-b, a]$. Vis at $\vec{u} \perp \vec{v}$.

4.5.4

Avgjør om påstanden er riktig: *To vektorer som begge har bare positive komponenter eller bare negative komponenter, kan umulig stå vinkelrett på hverandre.*

4.6.1

Undersøk om noen av vektorene fra oppgave 4.3.1 er parallelle.

4.6.2

Undersøk om noen av vektorene er parallelle.

$$\vec{a} = [1, 7] \quad , \quad \vec{b} = [3, 9] \quad , \quad \vec{c} = [5, 35]$$

4.6.3

Gitt vektorene $\vec{a} = [7, -3]$ og $\vec{b} = [-14, s]$. Bestem s slik at $\vec{a} \parallel \vec{b}$.

4.7.1

Linja $\vec{l}$ går gjennom punktene A og B . Finn uttrykket til $\vec{l}$. Skriv uttrykket på to måter.

a) $A = (-2, 7)$ og $B = (3, -5)$ b) $A = (3, 9)$ og $B = (10, -7)$

4.7.2

Gitt linja $\vec{l}(t) = [2 + 4t, 3 - 5t]$.

- a) Bruk uttrykket til $\vec{l}$ for å finne et punkt som ligger på linja, og for å finne en retningsvektor for linja.
- b) Finn t når $\vec{l} = [-22, 33]$.
- c) Avgjør om punktene $(30, -31)$ og $(42, -47)$ ligger på linja.

4.7.3

Gitt en linje $\vec{l}(t)$ med retningsvektor $\vec{r} = [a, b]$, hvor $a > 0$. La $f(x)$ være den lineære funksjonen som beskriver den samme linja som $\vec{l}$. Hva er stigningstallet til f ?

4.8.1

Forklar hvordan du kan bruke sirkellikningen til å avgjøre om et punkt ligger inne i en sirkel, utenfor sirkelen, eller på sirkelbuen.

4.8.2

Finn sentrene og radiene til sirklene gitt av sirkellikningene.

a) $x^2 - 6x + y^2 + 2y - 6 = 0$

b) $y^2 - 10y + x^2 - 56 = 0$

4.9.1

Finn arealet til henholdsvis parallellogrammet og trekanten utspent av $\vec{u} = [-1, 3]$ og $\vec{v} = [4, 5]$.

4.9.2

Finn avstanden mellom linjen og punktet.

a) $\vec{p}(t) = [-1 + 2t, 4 + 3t]$ og $(2, 1)$

b) $\vec{q}(t) = [3t, -5 - t]$ og $(0, 0)$

Gruble* 46

a) Gitt en vektor $\vec{v}$. Vis at lengden til vektoren $\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ er lik 1.

b) Bestem uttrykket for vektoren som er parallell med vektoren $[3, 4]$, og som har lengde 10.

Merk: $\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ kalles den **normaliserte** utgaven av $\vec{v}$.

Gruble* 47

Gitt en lineær funksjon f med stigningstall a . Forklar hvorfor grafen til alle lineære funksjoner med stigningstall $-\frac{1}{a}$ vil stå vinkelrett på grafen til f .

Gruble* 48 (R1V23D1)

Gitt tre punkt $A = (1, 3)$, $B = (4, 0)$ og $C = (9, 4)$.

a) Bruk vektorregning til å avgjøre om $\angle CBA$ er mindre enn, lik eller større enn 90° .

Et punkt P ligger på linja som går gjennom B og C .

b) Bruk vektorregning til å bestemme koordinatene til punktet P slik at $AB \perp AP$.

Gruble* 49 (R1H23D1)

I trekanten $\triangle ABC$ er $A = (-3, -1)$, $B = (2, -2)$ og $C = (5, 2)$.

- a) Avgjør hvilken side i trekanten som er kortest.
- b) Avgjør om noen av vinklene i trekanten er 90° .

Gruble* 50 (R1V22)

For vektorene $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ og $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$. Gitt vektorene $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$ og $\vec{v} = \vec{a} - 6\vec{b}$.

- a) Bestem de respektive lengdene til $\vec{u}$ og $\vec{v}$.
- b) Finn cosinusverdien til vinkelen mellom $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

Gruble* 51 (R1V24)

Gitt punktene $A = (3, 4)$, $B = (-1, -2)$ og $C = (3 + t, 2t)$.

- a) Bestem t slik at A , B og C ligger på linje.
- b) Bestem t slik at $\angle BCA = 90^\circ$.

Gruble* 52 (R1V22)

Gitt tallet t og punktene $A = (1, 2)$, $B = (-1, 5)$ og $C = (t, 4)$.

- a) Bestem t slik at $\angle BAC = 90^\circ$.
- b) Bestem t slik at A , B og C ligger på linje.

Gruble* 53 (R1H22)

Gitt punktene $A = (1, 1)$, $B = (9, 7)$ og $P = (5, 9)$.

- a) Vis at $\angle APB = 90^\circ$.
- b) En linje l er parallell med $\vec{AB}$, og går gjennom punktet P .
Det er også et annet punkt Q på l som er slik at $\angle AQB = 90^\circ$. Bestem koordinatene til Q .

Gruble* 54 (R1H25)

Gitt punktene $A = (-2, 3)$ og $B = (3, 2)$.

- a) Bestem lengden til AB .
- b) Linja gjennom A og B skjærer x -aksen i punktet C . Bestem koordinatene til C .
- c) $D = (2, t)$ der $t \in \mathbb{R}$. Bestem t slik at $\angle ABD = 90^\circ$.

Gruble* 55 (R1H24)

Gitt vektorene $\vec{u} = [3, -2]$, $\vec{v} = [4, 6]$, $\vec{w} = [2, -3]$ og $\vec{p} = [8, 12]$

- a) Avgjør om noen av vektorene er like lange.
- b) Avgjør om noen av vektorene er ortogonale.
- c) Gitt vektoren $\vec{q} = [2a - 3, 1 + 3b]$. Bestem a og b slik at $\vec{u} + 2\vec{q} = [7, 5]$.

Gruble* 56 (R1H25)

Gitt vektorene $\vec{a}$ og $\vec{b}$ hvor $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 2\sqrt{3}$, og $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = 30^\circ$.
For vektoren $\vec{p}$ har vi at $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b}$.

- a) Finn lengden til $\vec{p}$.
- b) For vektoren $\vec{q}$ har vi at $\vec{q} = t\vec{a} + \vec{b}$. Bestem t slik at $\vec{p}$ og $\vec{q}$ er ortogonale.

Gruble* 57 (R1V25)

Gitt punktene $O = (0, 0)$, $A = (-1, 2)$, og $B = (1, 1)$.

- a) Finn lengden til AB .
- b) Vektoren fra O til $C = (-1, a)$ er parallell med $\overrightarrow{AB}$. Finn a .
- c) Punktet M er plassert slik at $|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{10}$ og $\angle OBM = 90^\circ$,
og slik at avstanden mellom M og A er minst mulig. Finn M .

Gruble* 58 (R1V26)

Gitt punktene $A = (1, -3)$, $B = (4, 1)$ og $C = (-2, a)$, hvor $a \in \mathbb{R}$.

- Bestem a slik at $\angle BAC = 90^\circ$.
- Bestem a slik at $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}|$.

Gruble* 59

Gitt punktet $A = (3, 2)$, tallet t og vektorene $\vec{u} = [4, 3]$ og $\vec{v} = [2t, 5t]$. I parallelogrammet $\square ABCD$ er $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ og $\overrightarrow{AD} = \vec{v}$.

- Bestem koordinatene til C og D uttrykt ved t .
- Bestem t slik at skjæringspunktet mellom diagonalene i parallelogrammet er $P = (8, 11)$.


Gruble* 60 (R1V26)

Gitt trekant $\triangle OAB$ i figuren under.

- Punktet P er plassert slik at OP utgjør $\frac{2}{3}$ av OA .
- Punktet R er plassert slik at OR utgjør $\frac{2}{3}$ av OB .

Vi setter $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ og $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$.

- Finn $\overrightarrow{AB}$ og $\overrightarrow{PR}$ uttrykt ved $\vec{a}$ og $\vec{b}$.
- Vis at $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{PR}$.
- Finn lengden til AB hvis $PR = \frac{\sqrt{2}}{3}$.




Gruble* 61

Sirkelen er gitt ved likningen

$$x^2 + y^2 - 4y = 0$$

$\overrightarrow{SB}$ er parallell med x -aksen. Finn retningssektoren til tangenten til sirkelen i punktet A .



Gruble* 62 (R1H22)

Gitt punktene $A = (0, 0)$, $B = (9, 1)$ og $C = (24, 10)$. En linje l er gitt ved parameterfremstillingen

$$l(x) = \begin{cases} x = 12t \\ y = 5t \end{cases}, \quad t > 0$$

- a) Vis at C ligger på l .
- b) Finn cosinusverdien til $\angle BAC$.
- c) På linja ligger et punkt D slik at $\angle ADB = 120^\circ$. Forklar hvorfor t -verdien til D er gitt ved likningen

$$\frac{169t - 113}{13\sqrt{169t^2 - 226t + 82}} = \frac{1}{2}$$

- d) Punktet E ligger på l slik at arealet til $\triangle ABE$ er 11. Finn koordinatene til E .

Gruble* 63

En sirkel er gitt ved likningen

$$x^2 + y^2 - 8y - 9 = 0$$

I tillegg har vi linjene

$$\vec{a}(t) = [-1 + t, -3 + 2t]$$

$$\vec{b}(s) = (-1 + 3s, 11 + 4s)$$

$$\vec{c}(q) = [-7 + q, 7 + q]$$

- a) Finn sentrum S og radien r til sirkelen.
- b) Finn avstanden mellom sentrum i sirkelen og hver av de tre linjene. Bruk dette til å forklare hvilke av linjene som
 - tangerer sirkelen
 - skjærer sirkelen i to punkt
 - ikke skjærer sirkelen
- c) Finn tangeringspunktet og de to skjæringspunktene.

Gruble 64

Gitt et parallellogram $\square ABCD$. Vis at midpunktet til diagonalen AC også er midpunktet til diagonalen BD .

Kapittel 5

Grenseverdier og kontinuitet

5.1 Grenseverdier

Si at vi starter med verdien 0.9, og deretter stadig legger til 9 som bakerste siffer. Da får vi verdiene 0.9, 0.99, 0.999 og så videre. Ved å legge til 9 som bakerste siffer på denne måten, *kan vi komme så nærme vi måtte ønske – men aldri nå eksakt – verdien 1*. Det å ”komme så nærme vi måtte ønske – men aldri nå eksakt – en verdi” vil vi heretter kalle å ”gå mot en verdi”. Metoden vi akkurat beskrev kan vi se på som en metode for å gå mot 1. Vi kan da si at **grenseverdien** til denne metoden er 1. For å indikere en grenseverdi skriver vi **lim**.

Det er viktig å tenke over at vi kan gå mot et tall fra to sider; fra venstre eller fra høyre på tallinja. Med en metode som gir oss verdiene 0.9, 0.99, 0.999 og så videre, nærmer vi oss 1 fra venstre. Lager vi oss en metode som gir verdiene 1.1, 1.01, 1.001 og så videre, nærmer vi oss 1 fra høyre.

5.1 Grenseverdier

$x \rightarrow a^+$ ” x går mot a fra høyre”

$x \rightarrow a^-$ ” x går mot a fra venstre”

$x \rightarrow a$ ” x går mot a (fra både høyre og venstre)”

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ”grenseverdien til f når x går mot a ”

Merk

$x \rightarrow a$ omfatter de to tilfellene $x \rightarrow a^+$ og $x \rightarrow a^-$. Ofte vil disse være så like at vi kan behandle $x \rightarrow a$ som ett tilfelle.

Språkboksen

Å gå mot en verdi fra høyre/venstre kalles også å gå mot en verdi ovenfra/nedenfra.

Vi kan også si at $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ er "verdien f går mot når x går mot a ".

Både $\lim_{x \rightarrow a^-}$ og $\lim_{x \rightarrow a^+}$ kalles **ensidige grenser**, mens $\lim_{x \rightarrow a}$ kalles den **tosidige grensen**.

Hvis $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ er et eksakt tall, sier vi at **grensen eksisterer**.

Hvis den *ikke* er et eksakt tall, sier vi at **grensen ikke eksisterer**. Krav for at grense skal eksistere er altså at

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq \pm\infty$. Hvis grensen er tosidig kreves det i tillegg at $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$.

Hvis $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq \pm\infty$, sier vi at grensen "går mot $\pm$ uendelig", selv om grensen ikke eksisterer.

En utvidelse av $=$

Det litt paradoksale med grenseverdier hvor x går mot a , er at vi ofte ender opp med å erstatte x med a , selv om vi per definisjon har at $x \neq a$. For eksempel er

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + 1) = 2 + 1 = 3 \quad (5.1)$$

Det er verdt å filosofere litt over likhetene i (5.1). Når x går mot 2, vil x aldri bli eksakt lik 2. Dette betyr at $x + 1$ aldri kan bli eksakt lik 3. Men *jo nærmere* x er lik 2, *jo nærmere* er $x + 1$ lik 3. Med andre ord går $x + 1$ mot 3 når x går mot 2. Den venstre likheten i (5.1) viser altså ikke til et uttrykk som er *eksakt lik* en verdi, men et uttrykk som *går mot* en eksakt verdi. Dette gjør altså at grenseverdier bringer en utvidet betydning av $=$.

5.2 Regneregler for grenseverdier

Gitt funksjonene $f(x)$ og $g(x)$ hvis $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ og $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ eksisterer, er

$$\lim_{x \rightarrow a} (f + g) = \lim_{x \rightarrow a} f + \lim_{x \rightarrow a} g$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (fg) = \lim_{x \rightarrow a} f \cdot \lim_{x \rightarrow a} g$$

Merk

De to likningene over kan også være gyldige hvis grenseverdiene til f eller g går mot $\pm\infty$, men dette må avgjøres for hvert konkrete tilfelle.

Eksempel 1

Gitt $f(x) = \frac{x^2+2x-3}{x-1}$. Finn $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Svar

Når $x \neq 1$, har vi at

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+3)}{x-1} = x+3$$

Dette betyr at

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x+3) = \lim_{x \rightarrow 1} x + \lim_{x \rightarrow 1} 3 = 4$$

Eksempel 2

Gitt funksjonen $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, hvor $a > 0$. Vis at $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$ og at $\lim_{x \rightarrow \infty} f = \infty$.

Svar

Vi har at

$$f(x) = x^3 \left(a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + \frac{d}{x^3} \right)$$

Dermed er

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f &= x^3 \left(a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + \frac{d}{x^3} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \left(a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + \frac{d}{x^3} \right) \\ &= \infty \cdot a \\ &= \infty \end{aligned}$$

Tilsvarende finner vi at

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$$

Angående forklaring av regel 5.2

I bokserien som denne boka er en del av, etterstrebes det at alle regler skal være ledsaget av en forklaring. Regnereglene for grenseverdier er såpass intuitive sanne, og samtidig så avansert å bevise, at vi her gjør en unntak.

5.2 Kontinuitet

5.3 Kontinuitet

Gitt en funksjon $f(x)$ og et tall c . f er **kontinuerlig** for $x = c$ bare hvis

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

Hvis likningen er ugyldig, er f **diskontinuerlig** for $x = c$.

Språkboksen

Hvis en funksjon $f(x)$ er kontinuert for alle x , kalles f en **kontinuerlig funksjon**.

Hvis en funksjon $f(x)$ er diskontinuerlig for $x = c$, kalles c et **bruddpunkt** for f .

Eksempel 1

Undersøk om funksjonene er kontinuerte for $x = 2$.

a)

$$f(x) = \begin{cases} x + 4 & , \quad x < 2 \\ -3x + 12 & , \quad x \geq 2 \end{cases}$$

b)

$$g(x) = \begin{cases} x + 1 & , \quad x \leq 2 \\ -x + 6 & , \quad x > 2 \end{cases}$$

Svar

a) Vi har at

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) = -3 \cdot 2 + 12 = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 + 4 = 6$$

Altså er f kontinuert for $x = 2$.

b) Vi har at


$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = g(2) = 2 + 1 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = -2 + 6 = 4$$

Altså er g ikke kontinuert for $x = 2$.

Visualisering av kontinuitet

Visuelt kan vi skille mellom kontinuerlige og diskontinuerlige funksjoner slik; kontinuerlige funksjoner har sammenhengende grafer, diskontinuerlige funksjoner har det ikke. Et utsnitt av grafene til funksjonene fra *Eksempel 1* på side 126 ser slik ut:



Grafer fungerer utmerket til å avgjøre hvilke funksjoner vi *forventer* å være kontinuerlige eller ikke, men er aldri gyldige som et bevis for dette.

Oppgaver for kapittel 5

5.2.1

Undersøk om funksjonene er kontinuerlige.

$$f(x) = \begin{cases} x - 5 & , \quad x < 4 \\ -x + 3 & , \quad x \geq 4 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 7 & , \quad x < 1 \\ 5x + 1 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

$$h(x) = \begin{cases} 2x^2 - 4 & , \quad x \leq -2 \\ -\frac{1}{2}x + 3 & , \quad x > -2 \end{cases}$$

5.2.2

Bestem a slik at f er kontinuerlig

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 + a & , \quad x < 3 \\ 2x + 1 & , \quad x \geq 3 \end{cases}$$

5.2.3

Bestem grenseverdiene.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3(x^2 - 3)}{x - 3} & \text{b) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x + 12}{2x^2 - 18} & \text{c) } \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \\ \text{d) } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} & \text{e) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x^2 + x - 12} & \text{f) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \\ \text{g) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 2}{3x^2 + 2} & & \end{array}$$

5.2.4 (R1H22)

Bestem grenseverdien

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4 + h)^2 - 4^2}{h}$$

5.2.5 (R1H25)

a) Forklar hvorfor grenseverdien ikke eksisterer.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4x + 2}{x^2 - 2x - 8}$$

b) Bestem a slik at grenseverdien eksisterer, og finn grenseverdien.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + ax + 2}{x^2 - 2x - 8}$$

Gruble* 65 (R1V23D1)

Bestem grenseverdien

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$$

Gruble* 66 (R1H24)

Vurder om påstanden er rett.

Dersom $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ og $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$,
så er $f(x) = g(x)$.

Kapittel 6


Derivasjon

6.1 Definisjoner

Gitt en funksjon $f(x)$ og to x -verdier a og b . Endringen til f relativ til endringen til x for disse verdiene er gitt som

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (6.1)$$

I MB har vi sett at uttrykket over gir stigningstallet til linja som går gjennom punktene $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$. I en matematisk sammenheng er det ekstra interessant å undersøke (6.1) når b nærmer seg a . Å **derivere** innebærer å undersøke grenseverdien til denne brøken når b går mot a .



Merk

I teksten og figurene over har vi tatt utgangspunkt i at $b > a$, men dette er ikke en forutsetning for at uttrykkene er gyldige.

6.1 Den deriverte


Gitt en funksjon $f(x)$. Den **deriverte** av f i $x = a$ er da gitt som

$$f'(a) = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Alternativt kan vi skrive

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Linja som har stigningstall $f'(a)$, og som går gjennom punktet $(a, f(a))$, kalles **tangeringslinja** til f for $x = a$.



Eksempel 1

Gitt $f(x) = x^2$. Finn $f'(2)$.

Svar

Vi har at

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2 + h) - f(2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 + h)^2 - 2^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2^2 + 4h + (h)^2 - 2^2}{h} \\ &= 4 \end{aligned}$$

Eksempel 2

Gitt $f(x) = x^3$. Finn $f'(a)$.

Svar

Vi har at

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^3 - a^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3 - a^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3a^2 + 3ah + h^2) \\ &= 3a^2 \end{aligned}$$

Altså er $f'(a) = 3a^2$.

Språkboksen

Et annet ord for en *tangeringslinje* er en **tangent**.

Hvis vi for to funksjoner $f(x)$ og $g(x)$ har at $f'(a) = g'(a)$ og $f(a) = g(a)$, sier vi at funksjonene tangerer hverandre for $x = a$ (eventuelt i punktet $(a, f(a))$).

Hvis vi for en funksjon $f(x)$ har at $f'(a)$ eksisterer, sier vi at f er **deriverbar** for $x = a$.

6.2 Derivasjonsregler

Den deriverte funksjonen

Eksempel 2 på side 134 belyser noe viktig; hvis grenseverdien gitt i [definisjon 6.1](#) eksisterer, vil $f'(a)$ være uttrykt ved a . Og selv om a betraktes som en konstant langs veien som fører til dette uttrykket, er det ingenting som hindrer oss i å etterpå behandle a som en variabel. Hvis $f'(a)$ er et resultat av derivasjon av funksjonen $f(x)$ er det også hendig å omdøpe a til x :

6.2 Den deriverte funksjonen

Gitt en funksjon $f(x)$. Den **deriverte funksjonen** til f er funksjonen som fremkommer ved å erstatte a i [definisjon 6.1](#) med x . Denne funksjonen skriver vi som $f'(x)$.

Eksempel

Gitt $f(x) = x^3$. Siden¹ $f'(a) = 3a^2$, er $f'(x) = 3x^2$.

¹Se *Eksempel 2*, side 134.

Språkboksen

Alternative skrivemåter for $f'(x)$ er f' , $(f)'$ og $\frac{d}{dx}f$.

Den deriverte funksjonen til f kalles også den **førstederiverte** funksjonen av f .

En funksjon $f(x)$ som er deriverbar for alle $x \in D_f$ kaller vi en **deriverbar funksjonderiverbar**.

Den deriverte av høyere orden

Gitt en funksjon f . Hvis vi deriverer f' , får vi den **andred-eriverte** funksjonen av f , som vi skriver som f'' . Altså er $(f')' = f''$. På samme måte er $(f'')' = f'''$, $(f''')' = f''''$ og så videre.

6.3 Deriverbarhet impliserer kontinuitet

Gitt en funksjon $f(x)$. Hvis f er deriverbar for $x = a$, er f kontinuerlig for $x = a$.

(6.3) Deriverbarhet impliserer kontinuitet (forklaring)

Av [definisjon 6.1](#) har vi at

$$f'(a) = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

For at denne grensen skal eksistere, må vi ha at

$\lim_{b \rightarrow a} (f(b) - f(a)) = 0$ (hvis ikke går grensen mot $\pm\infty$, og da er ikke den deriverte definert), og følgelig er $\lim_{b \rightarrow a} f(b) = f(a)$.

Dermed er f kontinuerlig for $x = a$.

Merk

Det er veldig viktig å være klar over at vilkåret i [regel 6.3](#) ikke kan bli snudd; at en funksjon er kontinuerlig gir ingen garanti for at den er deriverbar. Men [regel 6.3](#) gir et krav om at en funksjon må være kontinuerlig i et punkt for å være deriverbar i det samme punktet.

6.4 Den deriverte ved delt forskrift

Gitt funksjonene $g(x)$ og $k(x)$, hvor $D_g = \mathbb{R}$ og $D_k = \mathbb{R}$, og

$$f(x) = \begin{cases} g & , \quad x \leq a \\ k & , \quad x > a \end{cases}$$

Hvis f er kontinuerlig for $x = a$, og $g'(a) = k'(a)$, er $f'(a) = g'(a) = k'(a)$.

Hvis $g'(a) \neq k'(a)$, er ikke f deriverbar for $x = a$.

Eksempel 1

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} x & , \quad x \leq 0 \\ x^2 + x & , \quad x > 0 \end{cases}$$

Finn $f'(0)$ hvis verdien eksisterer.

Svar

Vi setter $g(x) = x$ og $k(x) = x^2 + x$. Vi har at

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g = \lim_{x \rightarrow 0^+} k = 0$$

Dermed er f kontinuert for $x = 0$. Videre er

$$g'(x) = 1 \quad , \quad k'(x) = 2x + 1$$

Følgelig er $g'(0) = k'(0) = 1$. Dette betyr at $f'(0) = 1$.

Eksempel 2

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & , \quad x \leq 0 \\ x^2 + x & , \quad x > 0 \end{cases}$$

Finn $f'(0)$ hvis verdien eksisterer.

Svar

Vi setter $g(x) = x + 1$ og $k(x) = x^2 + x$. Vi har at

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} k = 0$$

Dermed er ikke f kontinuert for $x = 0$, og vi kan ikke bruke [regel 6.4](#), selv om $g'(0) = k'(0)$.

Merk

[Regel 6.4](#) er også gyldig for funksjoner hvor den delte forskriften er gitt ved andre kombinasjoner av $>$, $\geq$, $\neq$ og $=$.

Derivert med hensyn på

Derivasjon som vi har sett på så langt har vært en brøk med en differanse av x -verdier i nevner og den tilknyttede differansen av f -verdier i teller. Da sier vi at f er derivert med **hensyn på x** . I denne bokserien skal vi i all hovedsak se på funksjoner som bare er avhengige av én variabel. Gitt en funksjon $f(x)$, er det da underforstått at f' symboliserer f derivert med hensyn på x .

Samtidig er det greit å være klar over at en funksjon kan være avhengig av flere variabler. For eksempel er funksjonen

$$f(x, y) = x^2 + y^3$$

en **flervariabel funksjon**, avhengig av både x og y . I dette tilfellet kan vi skrive $\frac{d}{dx}f$ for å indikere derivasjon med hensyn på x , og $\frac{d}{dy}f$ for å indikere derivasjon med hensyn på y . Da er

$$\frac{d}{dx}f = 2x \quad , \quad \frac{d}{dy}f = 3y^2,$$

Den deriverte av elementære funksjoner

6.5 Den deriverte av elementære funksjoner

For en variabel x og en konstant r er

$$(e^x)' = e^x \quad (6.2)$$

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x} \quad (6.3)$$

$$(x^r)' = rx^{r-1} \quad (6.4)$$

Eksempel

Deriver uttrykket x^7 .

Svar

$$(x^7)' = 7x^{7-1} = 7x^6$$

6.6 Den deriverte av sammensatte funksjoner

Gitt en konstant a og funksjonene $f(x)$ og $g(x)$. Da er

$$(a \cdot f)' = a \cdot f'$$

$$(f + g)' = f' + g'$$

$$(f - g)' = f' - g'$$

Eksempel

Deriver uttrykket $2e^x - 4x^2 + 3 \ln x$.

Svar

$$(2e^x - 4x^2 + 3 \ln x)' = 2e^x - 8x + \frac{3}{x}$$

(6.6) Den deriverte av sammensatte funksjoner (forklaring)

De tre likningene følger så og si direkte av [definisjon 6.1](#).

Kjerne-, produkt- og divisjonsregelen ved derivasjon

6.7 Kjerneregelen

For en funksjon $f(x) = g[u(x)]$ har vi at

$$f'(x) = g'(u)u'(x)$$

Eksempel

Finn $f'(x)$ når $f(x) = e^{x^2+x+1}$.

Svar

Vi setter $u = x^2 + x + 1$, og får at

$$g(u) = e^u \quad , \quad g'(u) = e^u \quad , \quad u'(x) = 2x + 1$$

Altså er

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(u)u'(x) \\ &= e^u(2x + 1) \\ &= e^{x^2+x+1}(2x + 1) \end{aligned}$$

6.8 Produktregelen

Gitt funksjonene $f(x)$, $u(x)$ og $v(x)$, hvor $f = uv$. Da er

$$f' = u'v + uv'$$

Eksempel 1

Finn den deriverte av funksjonen $f(x) = x^2e^x$.

Svar

Vi setter $u(x) = x^2$ og $v(x) = e^x$. Da er

$$f = uv \quad , \quad u' = 2x, \quad , \quad v' = e^x$$

Altså er

$$\begin{aligned} f' &= u'v + uv' \\ &= 2xe^x + x^2e^x \\ &= xe^x(2 + x) \end{aligned}$$

6.9 Divisjonsregelen

Gitt funksjonene $f(x)$, $u(x)$ og $v(x)$, hvor $f = \frac{u}{v}$. Da er

$$f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Eksempel

Finn den deriverte av funksjonen $f(x) = \frac{\ln x}{x^4}$.

Svar

Vi setter $u(x) = \ln x$ og $v(x) = x^4$. Da er

$$f = \frac{u}{v} \quad , \quad u' = x^{-1} \quad , \quad v' = 4x^3$$

Altså er

$$\begin{aligned} f' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\ &= \frac{x^{-1} \cdot x^4 - \ln x \cdot 4x^3}{x^8} \\ &= \frac{1 - 4 \ln x}{x^5} \end{aligned}$$

Merk: Vi kan også finne f' ved å sette $u(x) = \ln x$ og $v(x) = x^{-4}$, for så å bruke produktregelen.

6.10 L'Hopitals regel

Gitt to deriverbare funksjoner $f(x)$ og $g(x)$, hvor

$$f(a) = g(a) = 0$$

Da er

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'}{g'}$$

Eksempel

Finn grenseverdien til $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

Svar

Vi setter $f(x) = e^x - 1$ og $g(x) = x$, og merker oss at $f(0) = g(0) = 0$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f}{g} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'}{g'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

6.3 Derivasjon av vektorfunksjoner

6.11 Den deriverte til en vektorfunksjon


Gitt to deriverbare funksjoner $f(t)$ og $g(t)$, og vektorfunksjonen

$$\vec{r}(t) = [f(t), g(t)]$$

Den deriverte funksjonen $\vec{r}'(t)$ til $\vec{r}$ er da definert som

$$\vec{r}'(t) = [f'(t), g'(t)]$$

$\vec{r}'(a)$ er en retningsvektor til tangenten til $\vec{r}$ for $t = a$.



Den andrederiverte funksjonen $\vec{r}''(t)$ til $\vec{r}$ er definert som

$$\vec{r}''(t) = (\vec{r}')' = [f''(t), g''(t)]$$

Eksempel

Gitt vektorfunksjonen $\vec{r}(t) = [2t^2, 5 + e^t]$.

a) Finn $\vec{r}'(t)$.

b) Finn $\vec{r}''(2)$.

Svar

a) Vi har at

$$\vec{r}'(t) = [(2t^2)', (e^t)'] = [4t, e^t]$$

b) Vi har at

$$\vec{r}''(t) = [(4t)', (e^t)'] = [4, e^t]$$

Dermed er $\vec{r}''(2) = [4, e^2]$

6.4 Forklaringer

6.4 Den deriverede ved delt forskrift (forklaring)

Vi har at

$$g'(a) = \lim_{b \rightarrow a^-} \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = \lim_{b \rightarrow a^+} \frac{g(b) - g(a)}{b - a}$$

$$k'(a) = \lim_{b \rightarrow a^-} \frac{k(b) - k(a)}{b - a} = \lim_{b \rightarrow a^+} \frac{k(b) - k(a)}{b - a}$$

Hvis $f'(a)$ eksisterer, er

$$f'(a) = \lim_{b \rightarrow a^-} \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = \lim_{b \rightarrow a^+} \frac{k(b) - g(a)}{b - a}$$

Når f er kontinuert, er $\lim_{b \rightarrow a} g(a) = \lim_{b \rightarrow a} k(a)$, som betyr at

$$\lim_{b \rightarrow a^+} \frac{k(b) - k(a)}{b - a} = \lim_{b \rightarrow a^+} \frac{k(b) - g(a)}{b - a}$$

Siden $g'(a) = k'(a)$, er

$$\lim_{b \rightarrow a^-} \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = \lim_{b \rightarrow a^+} \frac{k(b) - k(a)}{b - a} = \lim_{b \rightarrow a^+} \frac{k(b) - g(a)}{b - a}$$

Dermed er

$$f'(a) = g'(a) = k'(a)$$

Hvis vi derimot har at $g'(a) \neq k'(a)$, er

$$\lim_{b \rightarrow a^-} \frac{g(b) - g(a)}{b - a} \neq \lim_{b \rightarrow a^+} \frac{k(b) - g(a)}{b - a}$$

Dermed er ikke f deriverbar for $x = a$.

6.7 Kjernerregelen (forklaring)

Gitt en deriverbar funksjon $k(x)$. Vi lar $v_k(b)$ være funksjonen slik at

$$k(b) - k(x) = (b - x) [k'(x) + v_k(b)] \quad (6.5)$$

Ved å undersøke dette uttrykket for tilfellet hvor $b \rightarrow x$, finner vi at $\lim_{b \rightarrow x} v_k(b) = 0$.

Vi setter $t = u(x)$ og $s = u(b)$. Ved å bruke uttrykket fra (6.5) kan vi nå skrive

$$t - s = u(b) - u(x) = (b - x)[f'(x) + v_u(b)]$$

$$f(b) - f(x) = g(s) - g(t) = (t - s)[g'(t) + v_g(b)]$$

Ved å sette uttrykket for $t - s$ inn i uttrykket for $f(b) - f(x)$, har vi at

$$f(b) - f(x) = (b - x)[u'(x) + v_u(b)][g'(t) + v_g(b)]$$

$$\frac{f(b) - f(x)}{b - x} = [u'(x) + v_u(b)][g'(t) + v_g(b)]$$

Følgelig har vi at

$$\lim_{b \rightarrow x} \frac{f(b) - f(x)}{b - x} = \lim_{b \rightarrow x} [u'(x) + v_u(b)] \lim_{b \rightarrow x} [g'(t) + v_g(b)]$$

$$f'(x) = u'(x)g'(u)$$

6.8 Produktregelen (forklaring)

Gitt funksjonene $f(x)$, $u(x)$ og $v(x)$, hvor

$$f = uv$$

Av (6.1) er da

$$f' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - uv}{h}$$

La oss skrive $u(x+h)$ og $v(x+h)$ som henholdsvis $\tilde{u}$ og $\tilde{v}$:

$$f' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tilde{u}\tilde{v} - uv}{h}$$

Vi legger til 0 i form av $\frac{u\tilde{v}}{h} - \frac{u\tilde{v}}{h}$:

$$\begin{aligned} f' &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\tilde{u}\tilde{v} - uv}{h} + \frac{u\tilde{v}}{h} - \frac{u\tilde{v}}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{(\tilde{u} - u)\tilde{v}}{h} + \frac{u(\tilde{v} - v)}{h} \right] \end{aligned}$$

Siden vi for en kontinuerlig funksjon g har at $\lim_{h \rightarrow 0} \tilde{g} = g$ og

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = g', \text{ er}$$

$$f' = u'v + uv'$$

6.5 Den deriverte av elementære funksjoner (forklaring)

Likning (6.2)

Se [vedlegg D](#).

Likning (6.3)

Gitt at $x > 0$, da er $x = e^{\ln x}$. Vi setter $u = \ln x$ og $g(u) = e^u$.

Da har vi at $x = g(u)$, og at

$$g'(u) = e^u = e^{\ln x} = x$$

$$u'(x) = (\ln x)'$$

Av [kjerneregelen](#) ([regel 6.7](#)) har vi at

$$\begin{aligned}(x)' &= g'(u)u'(x) \\ &= x (\ln x)'\end{aligned}$$

Da¹ $(x)' = 1$, har vi at

$$1 = x (\ln x)'$$

Altså er

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

for $x > 0$.

Gitt at $x < 0$, da er $x = -e^{\ln(-x)}$. Ved å sette $u = \ln(-x)$ og $g(u) = -e^u$, har vi av kjerneregelen at

$$(x)' = -e^{\ln(-x)} \cdot (\ln(-x))'$$

Dermed er

$$(\ln(-x))' = \frac{1}{x}$$

for $x < 0$.

Likning (6.4)

Gitt at $x > 0$, da har vi at

$$(\ln x^r)' = (r \ln x)' = \frac{r}{x}$$

Vi setter $u = x^r$. Av kjerneregelen har vi at

$$\begin{aligned}\frac{r}{x} &= (\ln u)' \\ &= \frac{1}{u} u' \\ &= \frac{1}{x^r} (x^r)'\end{aligned}$$

Altså er

$$(x^r)' = \frac{r}{x} x^r = r x^{r-1}$$

For tilfellet hvor $x < 0$, men x^r og $(-1)^r$ er definert, kan vi skrive

$$x^r = ((-1)(-x))^r = (-1)^r (-x)^r = (-1)^r \left(e^{\ln(-x)} \right)^r = (-1)^r e^{r \ln(-x)}$$

Ved å sette $u = r \ln(-x)$, har vi av kjerneregelen at

$$(x^r)' = (-1)^r e^{r \ln(-x)} \frac{1}{x} = (-1)^r (-x)^r \frac{r}{x} = r x^{r-1}$$

¹Se [oppgave 6.1.2](#).

6.9 Divisjonsregelen (forklaring)

Vi har at

$$f' = \left(\frac{u}{v} \right)' = (uv^{-1})'$$

Av [produktregelen](#) ([regel 6.8](#)) og [kjerneregelen](#) ([regel 6.7](#)) er da

$$f' = u'v^{-1} - uv^{-2}v' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

6.10 L'Hopitals regel (forklaring)

Siden $f(a) = g(a) = 0$, er

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}}$$

Av [definisjon 6.1](#) har vi da at

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Oppgaver for kapittel 6

6.1.1

Bruk definisjonen av den deriverte til å vise at for funksjonen $f(x) = \frac{1}{x}$ er $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

6.1.2

- a) Bruk definisjonen av den deriverte til å finne den deriverte funksjonen til henholdsvis $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x^2$, $f_3(x) = x^3$.
- b) La $f_n(x) = x^n$ for $n \in \mathbb{N}$. Bruk det du fant i oppgave a) til å foreslå et uttrykk for $f'_n(x)$ når $f_n(x) = x^n$.

6.2.1

Deriver uttrykkene

- a) $5x^3$ b) $-8x^6$ c) $\frac{3}{7}x^7$ d) $-x^{\frac{2}{3}}$ e) $x^{\frac{9}{7}}$

6.2.2

Deriver uttrykkene

- a) $2e^x$ b) $-30e^x$ c) $8 \ln x$ d) $-4 \ln x$

6.2.3

Skriv om uttrykket $\frac{1}{x^k}$ slik at (6.4) kan anvendes. Finn den deriverte av uttrykket.

6.2.4

Deriver uttrykkene (Hint: Se [oppgave 6.2.3](#))

- a) $\frac{5}{x^2}$ b) $\frac{7}{x^{10}}$ c) $-\frac{2}{9x^7}$ d) $\frac{3}{11x^{\frac{8}{5}}}$

6.2.5

Deriver uttrykkene

- a) $3x^3 - 4x + \frac{1}{x}$ b) $x^5 + \ln x$ c) $\ln x + x^2 + 2$ d) $x + e^x$
e) $e^x + \ln x$ f) $\frac{1}{3}x^3 + \sqrt{x} + 2$

6.2.6 (R1V25)

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & , \quad x < 0 \\ 2e^x & , \quad x \geq 0 \end{cases}$$

a) Avgjør om f er kontinuerlig i $x = 0$.

b) Avgjør om f er deriverbar i $x = 0$.

6.2.7

Deriver uttrykkene med hensyn på x .

a) $ax^2 + bx + c$ b) $7x^5 - 3ax + b$ c) $-9qx^7 + 3px^3 + b^3$

6.2.8

Deriver uttrykkene.

a) e^{2x} b) $5e^{-x}$ c) $\ln(5x)$ d) $-2\ln(x^3 - x)$

6.2.9

Vis at

a) $(e^{kx})' = ke^{kx}$ b) $(\ln(kx))' = \frac{1}{x}$

6.2.10

Deriver uttrykkene.

a) $x \ln x$ b) $-2x^3 e^x$ c) $4x^{-3} \ln x$ d) $e^x \ln x$

6.2.11

Deriver uttrykkene.

a) $\frac{e^x}{x^2}$ b) $\frac{x+2}{\ln x}$ c) $\frac{2x+3}{x-1}$ d) $\frac{\ln x + e^x}{x^4}$

6.2.12

Deriver uttrykkene.

a) $x\sqrt{1-2x}$ b) $3xe^{2x}$ c) $3x^2 \ln x$
d) $\sqrt{4x^2 - 5}$ e) $x^3\sqrt{2x-1}$ f) $\frac{x^3}{x^2-2}$
g) $(x^2 + 2)^7$ h) $\frac{x}{e^{x^2}}$ i) $\frac{e^{2x}}{x}$
j) $4x^2 \ln(3x)$ k) xe^{-4x} l) $3x^2 - 5 + \frac{3}{x-2}$

6.2.13

Løs gruble 65 ved hjelp av L'Hopitals regel.


6.2.14 (R1H25)

Funksjonen $g(x) = \frac{2x-3}{e^x}$ er kontinuerlig og deriverbar for alle $x \in \mathbb{R}$.

- Finn $g'(2)$ og $g'(3)$.
- Hva forteller svarene i oppgave a) om grafen til g når $x \in [2, 3]$?

Gruble* 67 (1TV24)

Den rette linja i figuren under er grafen til den deriverte funksjonen til $f(x)$. Punktet $P = (1, 2)$ ligger på grafen til f . Finn uttrykket til tangenten til f i punktet P .



Gruble* 68 (1TH23)

Gitt funksjonen

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 64$$

Vi har at

- Punktet $(-8, 0)$ er et toppunkt for f
- Stigningstallet til linja gjennom punktene $(0, f(0))$ og $(5, f(5))$ er $\frac{64}{5}$.

Bestem a , b og c .

Gruble* 69 (1TV22)

Gitt funksjonen

$$f(x) = x^3 - 2bx^2 + (b^2 + 3)x$$

- Vis at f bare har ett nullpunkt, uavhengig av verdien til b .
- For hvilke verdier av b har f bare ett stasjonært punkt?
- Hvis $b \neq 0$, har f to tangenter med stigningstall 3. Bestem uttrykkene for hver av tangentene.

Gruble* 70 (1TH22)

Gitt en andregradsfunksjon $f(x)$. Vi har at

- tangenten i punktet $(2, 0)$ har likningen $y = 9x + 18$.
 - tangenten i punktet $(8, -10)$ har likningen $y = -11x + 78$.
- Bestem $f'(x)$.

Gruble* 71 (T1H23D1)

Funksjonen f er gitt ved


$$f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 4$$

Bestem likningen for tangenten til f i punktet $(1, f(1))$.

Gruble* 72 (1TV26)

Under ser du et utsnitt av grafen til en andregradsfunksjon $f(x)$. Figuren viser bunnpunktet til f og tangenten til f i $(4, 0)$.

- Forklar hvorfor $f'(4) = 5$.
- Bestem $f'(x)$.



Gruble* 73 (1TH21)

Tredjegradsfunksjonen f har bunnpunkt $(-2, -11)$ og toppunkt $(4, 25)$. Likningen til tangenten til f i punktet $(1, 7)$ er $y = 9x - 2$.

Finn $f(x)$.

Gruble* 74 (R1V22)

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & , \quad x < 2 \\ x - t & , \quad x \geq 2 \end{cases}$$

- a) Bestem tallet t slik at f blir en kontinuerlig funksjon. Husk å grunngi svaret.
- b) Avgjør om f er deriverbar i $x = 2$ for den verdien av t du fant i oppgave a).

Gruble* 75 (R1H25)

Vurder om påstanden er rett.

Funksjonen $f(x) = |x|$ er deriverbar for alle $x \in \mathbb{R}$,
bortsett fra for $x = 0$.

Gruble* 76 (R1V26)

Gitt funksjonen $f(x) = e^x(6 - e^x)$


- a) Bestem eventuelle nullpunkt til f .
- b) Vis at $f'(x) = 2e^x(3 - e^x)$.
- c) Bestem koordinatene til eventuelle topp- eller bunnpunkt til f . Grunngi hvorfor eventuelle punkt er topp- eller bunnpunkt.

Gruble* 77 (R1H24)

I figuren under ser du et utsnitt av grafene til tre funksjoner. For funksjonen $f(x)$ har vi at

- $\frac{f(4)-f(0)}{4} = \frac{1}{2}$
- $f'(1) = 1$

Hvilken av grafene er grafen til f ?



Gruble* 78

Bruk [produktregelen](#) (regel 6.8) og [kjerneregelen](#) (regel 6.7) til å vise [divisjonsregelen](#) (regel 6.9).

Gruble* 79

Vis at $(a^x)' = a^x \ln a$.

Gruble* 80 (R1V26)

Gitt funksjonen $f(x) = e^{2x}$. I punktet T har grafen til f en tangent som går gjennom origo. Finn T .

Gruble* 81 (R1V25)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 1$$

og har definisjonsmengde $D_f = [a, b]$.

- Bestem a og b slik at D_f blir størst mulig, og slik at f har en omvendt funksjon g og $2 \in D_f$.
- Finn stigningstallet til tangenten til g i punktet $(-10, 3)$.
- g har en annen tangent med samme stigningstall som tangenten i $(-10, 3)$. Finn dette tangeringspunktet.

Gruble* 82 (R1H25)

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} -9x - 15 & , \quad x \leq -2 \\ ax^3 + bx^2 + c + d & , \quad -2 < x < k \\ \frac{x^2}{2} - x - \frac{7}{2} & , \quad x \geq k \end{cases}$$

- Avgjør om funksjonen er kontinuerlig når $x = -2$ hvis $a = 2$ og $b = -2$.
- Bestem a , b , c og k slik at f er kontinuerlig og deriverbar når $x = -2$ og $x = k$.

Gruble* 83 (R1V25)

Gitt funksjonen


$$f(x) = \begin{cases} -9x - 15 & , \quad x \leq 2 \\ ax^3 + bx^2 + c + d & , \quad -2 < x < 1 \\ \frac{x^2}{2} - x - \frac{7}{2} & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

Bestem a , b , c og d slik at f er kontinuerlig og deriverbar for alle $x \in \mathbb{R}$.

Gruble* 84 (R1V25)

I figuren under vises grafen til funksjonen $f(x) = \ln x$. Tangenten til f i punktet B går gjennom $A = (0, 0)$. Punktet C er plassert på linja $y = x$ slik at $\angle ACB = 90^\circ$.

- Finn B .
- Finn arealet til $\triangle ABC$.


**Gruble* 85**

Gitt en logistisk funksjon

$$f(x) = \frac{a}{1 + Ce^{-bx}}$$


hvor $a, b, C > 0$.

- Vis at $f' = \frac{b}{a} f \cdot (a - f)$.
- Vi lar d være tallet slik at $f''(d) = 0$. Finn d .
- Vis at $f(d+x) + f(d-x) = a$.
- Vi setter $h_0 = f(d) - f(d-x)$ og $h_1 = f(d+x) - f(d)$. Vis at $h_0 = h_1$. Gi en geometrisk tolkning av denne identiteten.
- Vis at $f''(d+x) = -f''(d-x)$. Hvilket punkt tilsier denne identiteten at $x = d$ er for f ? Hvilket punkt er $(d, f(d))$ for f ?



Gruble* 86

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2$. Tangenten til f i punktet A skjærer x -aksen i punktet B . Vis at hvis $A = (c, f'(c))$, så er $B = (\frac{c}{2}, 0)$.




Gruble* 87

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ og punktene $A = (p, f(p))$ og $B = (q, f(q))$. Tangenten til f i punktet $C = (t, f(t))$ er parallell med segmentet AB .

a) Vis at $t = \frac{1}{2}(p + q)$.

b) Vis at $A_{\triangle ABC} = \frac{1}{8}(q - p)^3$



Gruble* 88

Gitt funksjonen $f(x) = x^2$. Det finnes et **brennpunkt** $F = (0, p)$ og en **styrelinje** gitt ved $s(x) = -p$ slik at $AF = AB$, hvor A ligger på grafen til f , $AF \perp AB$, og $p \neq 0$.

a) Finn verdien til p .


Vi setter $C = (c, f(c))$.

b) Finn lengden til FC uttrykt ved c .

c) Vis at $FC = CD$.

d) E er skjæringspunktet til tangenten til f i C og x -aksen. Finn x -koordinaten til E , og vis at E ligger på FD .

e) Vis at $\angle HCG = \angle FCE$.



Merk: Egenskapene vi har vist her kan generaliseres til å gjelde for alle parabler.

Gruble 89

Gitt at $f'(x)$ er kontinuert, vis at

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = 2f'(x)$$

Kapittel 7

Funksjonsdrøfting

7.1 Monotoniegenskaper

De fleste funksjonsverdier varierer. Beskrivelser av hvordan funksjonene varierer kaller vi beskrivelser av funksjonenes **monotoniegenskaper**.


7.1 Voksende og avtagende funksjoner

Gitt en funksjon $f(x)$.

- f er **voksende** på intervallet $[a, b]$ hvis vi for alle $x_1, x_2 \in [a, b]$ har at

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2) \quad (7.1)$$


Hvis $f(x_1) \leq f(x_2)$ kan erstattes med $f(x_1) < f(x_2)$, er f **strengt voksende** på intervallet.



- f er **avtagende** på intervallet $[a, b]$ hvis vi for alle $x_1, x_2 \in [a, b]$ har at

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2) \quad (7.2)$$

Hvis $f(x_1) \geq f(x_2)$ kan erstattes med $f(x_1) > f(x_2)$, er f **strengt avtagende** på intervallet.



7.2 Monotoniegenskaper og den deriverte

Gitt funksjonen $f(x)$, deriverbar på intervallet $[a, b]$. Vi har at

- $f' \geq 0$ for $x \in (a, b) \iff f$ er voksende for $x \in [a, b]$
- $f' \leq 0$ for $x \in (a, b) \iff f$ er avtagende for $x \in [a, b]$

Hvis henholdsvis $\geq$ og $\leq$ kan erstattes med $>$ og $<$, er f strengt voksende/strengt avtagende.

Eksempel

Avgjør på hvilke intervaller f er voksende/avtagende når

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 12x \quad , \quad x \in [0, 8]$$


Svar

Vi har at

$$f'(x) = x^2 - 8x + 12$$

For å tydeliggjøre når f' er positiv, negativ eller lik 0 gjør vi to ting; vi faktoriserer uttrykket til f' , og tegner et fortegnsskjema:

$$f'(x) = (x - 2)(x - 6)$$



Vi har at

$$f' \geq 0 \text{ for } x \in (0, 2) \cup (6, 8)$$

$$f' = 0 \text{ for } x \in \{2, 6\}$$

$$f' \leq 0 \text{ for } x \in (2, 6)$$

Dette betyr at


$$f \text{ er voksende for } x \in [0, 2] \cup [6, 8]$$

$$f \text{ er avtagende for } x \in [2, 6]$$


7.3 Konvekse og konkave funksjoner

Gitt en kontinuerlig funksjon $f(x)$.

Hvis hele linja mellom $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ ligger over grafen til f på intervallet $[a, b]$, er f **konveks** for $x \in [a, b]$.



Hvis hele linja mellom $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ ligger under grafen til f på intervallet $[a, b]$, er f **konkav** for $x \in [a, b]$.



7.2 Ekstremalpunkt, vendepunkt og infleksjonspunkt

7.4 Bruddpunkt

Et tall c er et bruddpunkt for en funksjon $f(x)$ hvis minst én av følgende gjelder:

- f er diskontinuerlig for $x = c$.
- f er ikke definert for $x = c$.
- f har en vertikal asymptote for $x = c$.

7.5 Maksimum og minimum

Gitt en funksjon $f(x)$ og et tall c .

- f har **absolutt maksimum** $f(c)$ hvis $f(c) \geq f(x)$ for alle $x \in D_f$.
- f har **absolutt minimum** $f(c)$ hvis $f(c) \leq f(x)$ for alle $x \in D_f$.
- f har et **lokalt maksimum** $f(c)$ hvis det finnes et åpent intervall I om c slik at $f(c) \geq f(x)$ for $x \in I$.
- f har et **lokalt minimum** $f(c)$ hvis det finnes et åpent intervall I om c slik at $f(c) \leq f(x)$ for $x \in I$.

Språkboksen

Et maksimum/minimum blir også kalt en **maksimumsverdi**/minimumsverdi.

Gitt en funksjon $f(x)$. Hvis $D_f = [a, b]$, sier vi at a og b er endepunktene til f .

7.6 Ekstremalverdi og ekstremalpunkt

Gitt en funksjon $f(x)$ med maksimum/minimum $f(c)$. Da er

- $f(c)$ en **ekstremalverdi** for f .
- c et **ekstremalpunkt** for f . Nærmere bestemt et maksimumpunkt/minimumpunkt for f .
- $(c, f(c))$ et **toppunkt/bunnpunkt** for f .

7.7 Kritiske punkt

Et tall c er et **kritisk punkt** for en funksjon $f(x)$ hvis ett av følgende gjelder:

- $f'(c) = 0$.
- $f'(c)$ er ikke definert.

7.8 $f' = 0$ for lokale ekstremalpunkt

Gitt en deriverbar funksjon $f(x)$ og tallene a, b og c , hvor $a < c < b$ og $a, b, c \in D_f$.

- (i) Hvis c er et lokalt ekstremalpunkt for f , er $f'(c) = 0$.
- (ii) Hvis $f' > 0$ for $x \in (a, c)$ og $f' < 0$ for $x \in (c, b)$, er c et lokalt maksimumspunkt for f .
- (iii) Hvis $f' < 0$ for $x \in (a, c)$ og $f' > 0$ for $x \in (c, b)$, er c et lokalt minimumspunkt for f .

Språkboksen

Det som blir beskrevet i punkt (ii) og (iii) over omtales som at " f skifter fortegn i c ".

Hvis $f'(c) = 0$, kalles c også et **stasjonært punkt**.

Obs!

I andre tekster kan man finne definisjoner som skiller seg noe fra de vi har bestemt her. I noen tekster er for eksempel c et kritisk punkt hvis f ikke er deriverbar for $x = c$.

7.9 Naboliggende ekstremalpunkt

Gitt en kontinuerlig funksjon $f(x)$ med lokale ekstremalpunkt c og d . Gitt videre at f ikke har andre lokale ekstremalpunkt på intervallet (c, d) . Da har vi at

- $f(c) > f(d)$, er c et lokalt maksimalpunkt og d et lokalt minimumspunkt.
- $f(d) > f(c)$, er d et lokalt maksimalpunkt og c et lokalt minimumspunkt.

Eksempel

Finn det lokale bunnpunktet og toppunktet til

$$f(x) = 2x^3 + 9x^2 - 60x$$

Svar

Vi starter med å finne f' :

$$f' = 6x^2 + 18x - 60 = 6(x^2 + 3x - 10)$$

Siden $5 \cdot (-2) = -10$ og $5 + (-2) = 3$, har vi av [regel 2.2](#) at

$$f' = 6(x - 2)(x + 5)$$

$f' = 0$ for $x = 2$ og $x = -5$. Videre har vi at

$$f(2) = 2^3 + 9 \cdot 2^2 - 60 \cdot 2 = -68$$

$$f(-5) = 5^3 + 9 \cdot 5^2 - 60 \cdot 5 = 275$$

$f(-5) > f(2)$, altså er $(-5, 275)$ toppunktet til f og $(2, -68)$ er bunnpunktet til f .

7.9 Naboliggende ekstremalpunkt (forklaring)

Da c er et lokalt ekstremalpunkt, skifter f' fortegn i c . Og siden d er det neste lokale ekstremalpunktet, må f' har likt fortegn på intervallet (c, d) . Siden $f(c) > f(d)$, må f være avtagende på intervallet (c, d) , som betyr at $f' < 0$ på dette intervallet.

7.10 Andrederiverttesten

Gitt en deriverbar funksjon $f(x)$ og et tall c .

- Hvis $f'(c) = 0$ og $f''(c) < 0$, er $f(c)$ et lokalt maksimum.
- Hvis $f'(c) = 0$ og $f''(c) > 0$, er $f(c)$ et lokalt minimum.
- Hvis $f'(c) = f''(c) = 0$, kan man ikke ut fra denne informasjonen alene si om $f(c)$ er et lokalt maksimum eller minimum.

Eksempel 1

Finn lokale maksimum og minimum til funksjonen

$$f(x) = x^3 - 3x^2.$$

Svar

Vi har at

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

Altså er $f' = 0$ for $x = 0$ og $x = 2$. Videre har vi at

$$f''(x) = 6x - 6$$

$$f''(0) = -6$$

$$f''(2) = 6$$

Dermed er $f(0) = 0$ et lokalt maksimum, og $f(2) = -4$ et lokalt minimum.

7.10 Andrederiverttesten (forklaring)

Av definisjonen for den deriverte har vi at

$$f''(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(c+h) - f'(c)}{h}$$

Når $f'(c) = 0$, er

$$f''(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(c+h)}{h}$$

Når $f''(c) < 0$, betyr dette at

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(c+h)}{h} < 0$$

Altså må $f'(c+h)$ være positiv når h går mot 0 fra venstre og negativ når h går mot 0 fra høyre. Dermed skifter f' fortegn i c , som da må være et lokalt maksimalpunkt for f . Tilsvarende må c være et lokalt minimumspunkt for f hvis $f'(c) = 0$ og $f''(c) > 0$.


7.11 Infleksjonspunkt og vendepunkt

For en kontinuerlig funksjon $f(x)$ har vi at

- Hvis $f''(c) = 0$ og f'' skifter fortegn i c , er c et **inflexjonspunkt** for f .
- Hvis c er et infleksjonspunkt for f , er $(c, f(c))$ et **vendepunkt** for f .

Eksempel

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 144x - 140 \quad , \quad x \in [-14, 16]$$



punkt/verdi	type
$A = (-14, -1456)$	absolutt bunnpunkt
-14	ekstremalpunkt; absolutt minimum
-1456	absolutt minimum
$B = (-6, 400)$	lokalt toppunkt
-6	ekstremalpunkt; lokalt maksimalpunkt
400	lokalt maksimum
$C = (-1, -286)$	vendepunkt
-1	infleksjonspunkt
$D = (8, -972)$	lokalt bunnpunkt
8	ekstremalpunkt; lokalt minimumspunkt
-972	lokal minimum
$E = (16, 884)$	absolutt maksimum
16	ekstremalpunkt; absolutt maksimumspunkt
884	absolutt maksimum
-10, -1 og 14	nullpunkt

Språkboksen

Et nullpunkt til en funksjon kalles også **roten** til funksjonen.

7.3 Asymptoter

7.12 Vertikale asymptoter

Gitt en funksjon $f(x)$ og en konstant c .

- Hvis $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \pm\infty$, er c en **vertikal asymptote ovenfra** for f .
- Hvis $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \pm\infty$, er c en **vertikal asymptote nedenfra** for f .
- Hvis $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm\infty$, er c en **vertikal asymptote** for f .

Eksempel

Finn den vertikale asymptoten til

$$f(x) = \frac{1}{x-3} + 2$$

Svar

Vi har at

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left[\frac{1}{x-3} + 2 \right] = \pm\infty$$

Altså er $x = 3$ en vertikal asymptote for f .

7.13 Horisontale asymptoter

Gitt en funksjon $f(x)$. Hvis $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c$ eller $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = c$, er $y = c$ en **horisontal asymptote** for f

Eksempel

Finn den horisontale asymptoten til

$$f(x) = \frac{1}{x-3} + 2$$

Svar

Vi har at

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{x-3} + 2 \right) = 2$$

Altså er $y = 2$ en horisontal asymptote for f .

7.4 Injektive og omvendte funksjoner

Injektive funksjoner

7.14 Injektive funksjoner

Gitt en funksjon $f(x)$. Hvis $f(x_1) \neq f(x_2)$ for alle $x_1, x_2 \in [a, b]$, er f **injektiv** på dette intervallet.

Språkboksen

Et annet ord for injektiv er **én-entydig**.

Omvendte funksjoner

Gitt funksjonen $f(x) = 2x + 1$, som åpenbart er injektiv for alle $x \in \mathbb{R}$. Dette betyr at likningen $f = 2x + 1$ bare har én løsning, uavhengig om vi løser med hensyn på x eller f . Løser vi med hensyn på x , får vi at

$$x = \frac{f - 1}{2}$$

Nå har vi gått fra å ha et uttrykk for f til det "omvendte", et uttrykk for x . Siden x og f begge er variabler, er x en funksjon av f , og for å tydeliggjøre dette kunne vi ha skrevet

$$x(f) = \frac{f - 1}{2}$$

Denne funksjonen kalles den **omvendte funksjonen** til f . Setter vi uttrykket til f inn i uttrykket til $x(f)$, får vi nødvendigvis x :

$$\begin{aligned} x(2x + 1) &= \frac{2x + 1 - 1}{2} \\ &= x \end{aligned}$$

Likningen over synliggjør et problem; det er veldig rotete å behandle x som en funksjon og som en variabel samtidig. Det er derfor vanlig å omdøpe både f og x , slik at den omvendte funksjonen og variabelen den avhenger av får nye symboler. For eksempel kan vi sette $y = f$ og $g = x$. Den omvendte funksjonen $g(y)$ til f er da

$$g(y) = \frac{y - 1}{2}$$

7.15 Omvendte funksjoner

Gitt to injektive funksjoner $f(x)$ og $g(y)$. Hvis

$$g[f(x)] = x$$

er f og g omvendte funksjoner.

Eksempel 1

Gitt funksjonen $f(x) = 5x - 3$.

- a) Finn den omvendte funksjonen $g(y)$ til f .
- b) Vis at $g[f(x)] = x$.

Svar

- a) Vi setter $y = f$, og løser likningen med hensyn på x :

$$\begin{aligned}y &= 5x - 3 \\x &= \frac{y + 3}{5}\end{aligned}$$

Da er $g(y) = \frac{y+3}{5}$.

- b) Vi har at

$$\begin{aligned}g[f(x)] &= g(5x - 3) \\&= \frac{5x - 3 + 3}{5} \\&= x\end{aligned}$$

Merk

Når vi studerer omvendte funksjoner i denne boka, tar vi utgangspunkt i funksjoner uten delt forskrift. Om vi anser en funksjon med delt forskrift for injektiv eller ikke vil spesifiseres for hvert tilfelle (dette er først aktuelt i avsnittet med oppgaver).

7.16 Den deriverte til en omvendt funksjon

Gitt funksjonen $f(x)$, og la $g(y)$ være den omvendte funksjonen til f . Hvis $f'(x) \neq 0$, er

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

7.16 Den deriverte til en omvendt funksjon (forklaring)

Vi har at $g(y) = x$. Dermed er $\frac{d}{dx}g = \frac{d}{dx}x = 1$. Av kjerneregelen er

$$\frac{d}{dx}g = g'(y)y'(x)$$

Dermed er

$$\begin{aligned} g'(y)y'(x) &= 1 \\ g'(y) &= \frac{1}{y'(x)} \end{aligned}$$

Da $y = f$, er

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

f^{-1}

Hvis f og g er omvendte funksjoner, skrives g ofte som f^{-1} . Da er det viktig å merke seg at f^{-1} ikke er det samme som $(f)^{-1}$. For eksempel, gitt $f(x) = x + 1$. Da er

$$f^{-1} = x - 1 \quad , \quad (f)^{-1} = \frac{1}{x + 1}$$

I alle andre tilfeller enn ved $n = -1$, vil det i denne boka være slik at

$$f^n = (f)^n$$

7.5 Forklaringer

7.2 Monotoniegenskaper og den deriverte (forklaring)

$f' \geq 0$ for $x \in (a,b) \Rightarrow f$ er voksende for $x \in [a,b]$

Gitt $f(x)$, hvor $f' \geq 0$ for $x \in [a,b]$. La $x_1, x_2 \in (a,b)$ og $x_2 > x_1$. Av [middelverdisetningen](#) (se side 204) finnes det et tall $c \in (x_1, x_2)$ slik at

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Da $c \in [a,b]$, er $f'(c) \geq 0$, og da er

$$0 \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Følgelig er $f(x_2) \geq f(x_1)$, og av [definisjon 7.1](#) er da f voksende på intervallet (a,b) .

$f' \geq 0$ for $x \in (a,b) \Leftarrow f$ er voksende for $x \in [a,b]$

Av definisjonen til den deriverte har vi at

$$f'(x_1) = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

For $x_1, x_2 \in (a,b)$ vet vi (siden f er voksende på intervallet) at $f(x_2) \geq f(x_1)$ hvis $x_2 > x_1$, og at $f(x_1) > f(x_2)$ hvis $x_2 < x_1$. I begge tilfeller får vi at $f'(x_1) \geq 0$.

7.8 $f' = 0$ for lokale ekstremalpunkt (forklaring)

Punkt (i)

La c være et lokalt maksimumspunkt for f . For alle tall h slik at $x \in (c - |h|, c + |h|)$ er da

$$f(c + h) - f(c) \leq 0$$

Dette betyr at

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} \leq 0$$

og at

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} \geq 0$$

Følgelig er

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c + h) - f(c)}{h} = 0$$

Altså er $f'(c) = 0$, og f' skifter fortegn fra positiv til negativ i c . Med samme framgangsmåte kan det vises at dette også gjelder dersom c er et minimumspunkt, bare at da skifter f' fra negativ til positiv.

Punkt (ii)

Hvis $f' > 0$ på intervallet (a, c) , har vi av [regel 7.2](#) at f er strengt voksende på intervallet. Hvis $f' < 0$ på (c, b) , er f strengt avtagende på intervallet. Dette må nødvendigvis bety at $f(c) \geq f(x)$ for $x \in (a, b)$, og da er c et maksimumspunkt.

Punkt (iii)

Tilsvarende resonnement som for punkt (ii).

Oppgaver for kapittel 7

7.2.1

Finn eventuelle topp- og bunnpunkt til funksjonene.

a) $f(x) = 4x^2 \ln x$ b) $g(x) = \frac{1}{2}e^x(2x - 1)^2$

7.2.2

Gitt funksjonen $f(x) = a(b - x)(c - x)$.

- a) Finn ekstremalpunktet til f uttrykt ved b og c .
b) Vis at hvis ekstremalverdien til f er t , så er $a = -\frac{4t}{(b-c)^2}$.

7.2.3 (1TV21)

Gitt funksjonen $f(x) = -5x^2 + ax + 1$. Toppunktet til f er $(2, f(2))$.
Finn a .

7.2.4

Gitt en andregradsfunksjon $f(x)$. Finn uttrykket til f når

- a) f har nullpunkt $x = 3$ og $x = -4$, og ekstremalverdi 5.
b) f har nullpunkt $x = -1$ og $x = 10$, og ekstremalverdi -100 .
c) f har nullpunkt $x = 8$ og toppunkt $(10, 9)$.

7.2.5

Gitt funksjonen

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Vis at f er konveks vis $a > 0$ og konkav hvis $a < 0$.

7.3.1

Finn eventuelle horisontale og vertikale asymptoter, og eventuelle skjæringspunkt med y -aksen, for funksjonene.

a) $f(x) = \frac{4}{x-2}$ b) $g(x) = \frac{7}{x+3}$ c) $h(x) = \frac{x^2}{x^2-16}$
d) $j(x) = \frac{x-3}{x-2}$ e) $p(x) = \frac{x-8}{x}$ f) $f(x) = \frac{12x-3}{2x+1}$

7.3.2 (1TV22)

En rasjonal funksjon $f(x)$ har vertikal asymptote $x = -2$ og horisontal asymptote $y = 3$.

Bestem to mulige funksjonsuttrykk for f .

7.4.1

Finn den omvendte funksjonen $g(y)$ til f , og bekreft at $g(f) = x$.

a) $f(x) = 3x$ b) $f(x) = -9x + 2$ c) $f(x) = \frac{5}{2}x - 7$

d) $f(x) = \frac{3}{x-5}$ e) $f(x) = \sqrt{x}$

f) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ g) $f(x) = \sqrt[4]{x+9}$

7.4.2

Finn den omvendte funksjonen $g(y)$ til f , og bekreft at $g(f) = x$.

a) $f(x) = e^x + 2$ b) $f(x) = \ln(x+5)$ c) $f(x) = \frac{1}{\ln(x)}$

7.4.3 (R1V26)

Funksjonen $f(x) = \ln(x+2)$ har en omvendt funksjon g . Finn $g'(1)$.

7.4.4 (R1H22)

Avgjør om funksjonen har en omvendt funksjon for hele definisjonsmengden. Begrunn svaret ditt.

a) $f(x) = x^4$, $D_f = \mathbb{R}$.

b) $g(x) = e^{-(x-2)^2}$, $D_g = [2, \rightarrow]$

7.4.5

Funksjonen $f(x) = a(2 - x - x^3)$ har en omvendt funksjon $g(y)$, og $g(490) = -4$. Finn verdien til a .

7.4.6

Gitt en polynomfunksjon med ekstremalpunkt a og b , som er de eneste ekstremalpunktene til funksjonen på intervallet $[a, b]$.

Forklar hvorfor funksjonen er injektiv på dette intervallet.

Gruble* 90

Hvilke typer punkt må vi undersøke for å finne absolutte/lokale maksimum/minimum?

Gruble* 91 (1TH24)

Gitt funksjonen

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

Vi har at


- Grafen til f skjærer punktet $(2, 6)$
- Punktet $(-2, 8)$ er et toppunkt for f
- Tangenten til f når $x = 3$ har stigningstall 4

Finn de respektive verdiene til a , b , c og d .

Gruble* 92 (1TV23)

Nedenfor ser du grafen til en rasjonal funksjon.

Bestem $f(x)$. Argumenter for svaret ditt.



Gruble* 93 (1TH24)

En rasjonal funksjon $f(x)$ har asymptotene $x = 2$ og $x = 4$.

Nullpunktet til funksjonen er $x = -3$. Finn et mulig funksjonsuttrykk for f . Begrunn påstanden din.

Gruble* 94 (1TV26)

a) En rasjonal funksjon $f(x)$ har

- ingen nullpunkt.
- to vertikale asymptoter.

Bestem et mulig funksjonsuttrykk for f . Grunngi svaret ditt.


b) En rasjonal funksjon $g(x)$ har horisontal asymptote $y = 2$. Grafen til g skjærer ikke y -aksen. Bestem et mulig funksjonsuttrykk for g . Grunngi svaret ditt.

Gruble* 95 (1TV25)


a) Løs likningen

$$x^3 - 7x^2 - 10x + 16 = 0$$


b) Gitt funksjonen $f(x) = x^3 - 7x^2 - 10x + 16$. Hvilken av figurene under kan vise grafen til f ?




(a)



(b)



(c)




(d)

Gruble* 96 (1TH23)

Gitt funksjonene

$$f(x) = \frac{2x - 8}{x + 2} \quad , \quad g(x) = \frac{x^2 - 4}{(x - 3)(x + 3)}$$

- a) Hvilken av figurene viser grafen til f ?
 b) Hvilken av figurene viser grafen til g ?

**Gruble* 97**

Vis at funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ er konveks hvis $a > 0$ og konkav hvis $a < 0$.

Gruble* 98 (R1V22)

Gitt funksjonen

$$f(x) = x^3 - 6x$$

Bestem det største intervallet I slik at $1 \in I$, og slik at f har en omvendt funksjon når $D_f = I$.

Gruble* 99 (R1V26)

Avgjør om påstandene er riktige. Grunngi svaret ditt.

a) Gitt funksjonene

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x - d} \quad , \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

Påstand: f har en vertikal asymptote $x = d$.

b) Gitt funksjonen

$$g(x) = e^{x-3} \quad , \quad x \in \mathbb{R}$$

Påstand: Den omvendte funksjonen til g er $g^{-1} = \ln x + 3$, hvor $D_{g^{-1}} = (0, \rightarrow)$

Gruble* 100 (R1H23)


Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + (2+k)x & , \quad x < k \\ x^2 + (2-k)x & , \quad x \geq k \end{cases}$$

- Forklar hvorfor f er kontinuertlig for alle k .
- Bestem k slik at f har en kontinuerlig derivert funksjon.
- For hvilke verdier av k er f éntydig over hele definisjonsmengden?

Gruble* 101

Et rektangel er innskrevet i en sirkel. Vis at rektangelets areal er størst hvis det er et kvadrat.




Gruble* 102

Gitt punktet $A = (0, 0)$ og funksjonen

$$f(x) = -x^2 + 4 \quad , \quad x \in [0, 2]$$

Punktet C ligger på grafen til f . Finn koordinatene til C slik at rektangelet $\square ABCD$ får størst mulig areal.




Gruble* 103 (R1H22)

Gitt funksjonen

$$f(x) = 1 - x^2 \quad , \quad x \in [0, 1]$$


Tangenten til f i punktet $P = (a, f(a))$ skjærer henholdsvis x - og y -aksen i punktene A og B .

- a) Finn arealet til $\triangle OAB$ når $a = \frac{1}{2}$.
- b) Finn a når $\triangle OAB$ har så lite areal som mulig.



Gruble* 104

Under ser du grafene til en lineær funksjon, en andregradsfunksjon og en tredjegradsfunksjon.



- Hvilken av funksjonene har en omvendt funksjon uten delt forskrift?
- Finn uttrykkene til $f(x)$, $g(x)$ og $h(x)$.
- Finn de omvendte funksjonene $i(y)$, $j(y)$ og $k(y)$ til henholdsvis f , g og h , hvor vi godtar omvendte funksjoner med delt forskrift.

Gruble* 105 (R1V23)

La f være en tredjegradsfunksjon. Avgjør om påstandene er sanne eller usanne. Begrunn svaret ditt.

- Grafen til f har minst ett ekstremalpunkt.
- Alle linjer gitt som $y = ax + b$ vil skjære grafen til f .
- Dersom f har et vendepunkt for $x = 3$, er $f'(1) = f'(5)$.

Gruble* 106 (R1V22)

Gitt funksjonene





$$f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 2x + 3 \quad , \quad g(x) = 2x + 3$$

- Vis at f og g skjærer hverandre i to punkt.
- Vis at f og g tangerer hverandre i ett av skjæringspunktene.
- Vis at hvis $F(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ og $G(x) = cx + d$, så vil F og G tangere hverandre.
- Finn en sammenheng mellom vendepunktet til F og x -koordinaten til ett av skjæringspunktene til F og G .

Gruble* 107 (R1V23)

Nedenfor har vi tegnet grafene til fire funksjoner f, g, h og k

- Avgjør og grunngi i hvert tilfelle om funksjonen har en omvendt funksjon.
- Bestem definisjonsmengden til den omvendte funksjonen i de tilfellene hvor den finnes.

**Gruble* 108** (R1V22)

Gitt funksjonen $f(x) = x^3 - 3x^2 - 13x + 15$ og punktene $A = (1, 0)$, $B = (s, 0)$ og $C = (s, g(s))$, hvor $s \in (1, 5)$. Finn s slik at arealet til $\triangle ABC$ blir størst mulig, og finn arealet.

Gruble 109 (R1V23)


En linje l går gjennom punktene $A = (4, -2)$ og $B = (6, 6)$.

- Bestem avstanden fra punktet $P = (2, 8)$ til linja.
- Gitt funksjonen $f(x) = x^2 + 2x$. Finn den minste avstanden mellom grafen til f og l .

Gruble* 110 (R1H25)

Under ser du et utsnitt av grafene til åtte funksjoner.

- Én av funksjonene er på formen a^x , der a er et positivt heltall.
 - Tre av funksjonene er på formen $x^b - c$, der b og c er positive heltall.
 - Fire av funksjonene er den dobbeltderiverte funksjonen til én av de andre funksjonene.
- Sorter grafene i par hvor første bokstav viser til grafen til en funksjon, og andre bokstav viser til grafen til den dobbeltderivete. Argumenter for hvorfor parene er riktige.
 - Hvilke av funksjonene har en omvendt funksjon på hele definisjonsområdet?



Gruble* 111 (R1H23)

Gitt et prisme med kvadratisk grunnflate. Overflatearealet til prismet kan ikke være mer enn 120.

- a) Hva er det største volumet prismet kan ha hvis sidelengden til grunnflaten er 5?
- b) Hva er det maksimale volumet prismet kan ha?
- c) Hva er det minste overflatearealet prismet kan ha hvis volumet er 80?


Gruble* 112

Gitt en funksjon $f(t)$ med den omvendte funksjonen $g(t)$.


- a) Gitt at $A = (a, b)$ ligger på grafen til f . Finn koordinatene til punktet B som garantert ligger på grafen til g .

Symmetrilinja for grafen til f og grafen til g står vinkelrett på $\overrightarrow{AB}$.

- b) Finn en retningsvektor $\vec{r}$ til symmetrilinja. Hvilken vinkel danner symmetrilinja med t -aksen?



Gruble* 113



Origo og B ligger på grafen til vektorfunksjonen $\vec{v}(t)$.

a) Vi har at $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$. Finn uttrykket for $\vec{v}$.

b) Vi har at $C = (4\sqrt{3} - 5, -1)$ og

$$|OC|^2 - |BO|^2 - |BC|^2 = 24(7\sqrt{3} - 13)$$

Finn en andregradsfunksjon $f(t)$ slik at $B = \vec{v}(t)$ når $f(t) = 0$.


c) Vis at ekstremalverdien til f er $t = \frac{3\sqrt{3}+1}{8}$.

d) Den éne løsningen av $f(t) = 0$ er $t = \frac{3\sqrt{3}-15}{4}$. Koordinatene til B er gitt av den andre løsningen. Finn B .

Gruble* 114

Gitt andregradsfunksjonen $f(x) = x^2$ og tredjegradsfunksjonen $g(x)$. Vi har at

1. f og g skjærer hverandre i punktet B , hvor g går fra å være konkav til å være konveks.
2. De respektive tangentene til f og g danner en vinkel lik 45° i punktet B .
3. AB danner en vinkel lik 60° med x -aksen.
4. A er skjæringspunktet mellom tangenten til f og x -aksen.



- a) Finn koordinatene til A og B .
- b) Forklar hvorfor et mulig uttrykk for g er

$$g(x) = \frac{(6\sqrt{3} + 8)}{3}x^3 - (4\sqrt{3} + 9)x^2 + \frac{(7\sqrt{3} + 8)}{2}x$$

På tangenten til g ligger et punkt C slik at $BC = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + 3\sqrt{3})$

- c) Finn arealet til $\triangle ABC$.
- d) Finn lengden til AC .

x -verdien til C er et nullpunkt for funksjonen

$$h(x) = x^3 - 4x^2 - x + 10$$

- e) Skriv h som et produkt av en lineær funksjon (med heltalls konstantledd) og en andregradsfunksjon.
- f) Finn bunnpunktet til andregradsfunksjonen.
- g) Finn nullpunktene til andregradsfunksjonen.

Gruble* 115

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$, hvor¹ $a > 0$. For å beskrive formen til grafen til f gjør vi følgende²:


- Vi lar $g(x)$ være funksjonen som beskriver differansen mellom $f(x)$ og minimumsverdien til f .
- Vi lar $h(g)$ være horisontalavstanden mellom $g(x)$ og linja $x = -\frac{b}{2a}$.

Hvis to kvadratiske funksjoner har identiske uttrykk for $h(g)$ kan vi si at funksjonene har lik form.

a) Vis at

$$h(g) = \sqrt{\frac{g}{a}}$$

- b) Se tilbake til [gruble 16](#), og lag en oppsummering av hvordan en endring av a , b eller c eventuelt vil endre
- grafens horisontale forskyvning
 - grafens vertikale forskyvning
 - grafens form



¹Tilfellet hvor $a < 0$ blir helt tilsvarende


²Tilfellet hvor f har et toppunkt i stedet for et bunnpunkt er helt identisk.

Gruble 116

Gitt funksjonen $f(x) = \frac{1}{x}$, hvor $D_f = (0, \infty)$. Vi innfører vi et koordinatsystem hvor a -aksen og b -aksen henholdsvis ligger på linjene beskrevet av $y = -x$ og $y = x$. Grafen til funksjonen $b = g(a)$ og grafen til f er identiske.

a) Vis at $g(a) = g(-b)$.

b) Finn funksjonsuttrykket til $g(a)$.



Gruble 117

Utleed følgende regel:

En funksjon $f(x)$ er konveks på intervallet $x \in (a, b)$ hvis

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Vedlegg A-F

Vedlegg A: Navn på funksjoner

7.17 Potensfunksjoner

Gitt $x, k, b \in \mathbb{R}$. En funksjon på formen

$$f(x) = kx^m$$

er da en **potensfunksjon** med **koeffisient** k og **eksponent** m .

7.18 Polynomfunksjoner

En **polynomfunksjon** er én av følgende:

- en potensfunksjon med heltalls eksponent større eller lik 0.
- summen av flere potensfunksjoner med heltalls eksponent større eller lik 0.

Polynomfunksjoner kategoriseres etter den største eksponenten i funksjonsuttrykket. For konstantene a, b, c og d , og en variabel x , har vi at

funksjonsuttrykk	funksjonsnavn
$ax + b$	1. grads funksjon/polynom (lineær)
$ax^2 + bx + c$	2. grads funksjon/polynom (kvadratisk)
$ax^3 + bx^2 + cx + d$	3. grads funksjon/polynom (kubisk)

Eksempel 1

$4x^7 - 5x^2 + 4$ er et 7. grads polynom.

$\frac{2}{7}x^5 - 3$ er et 5. grads polynom.

7.19 Eksponentialfunksjoner

Gitt $x, a, b, c, d \in \mathbb{R}$, hvor $b > 0$. En funksjon f gitt som

$$f(x) = a \cdot b^{cx+d}$$

er da en **eksponentialfunksjon**.

7.20 Logistiske funksjoner

Gitt $x, a, b, c \in \mathbb{R}$. En funksjon f gitt som

$$f(x) = \frac{a}{1 + e^{-b(x-c)}}$$

er da en **logistisk funksjon**. Alternativt kan man skrive

$$f(x) = \frac{a}{1 + Ce^{-bx}}$$

hvor $C \in \mathbb{R}$.

Vedlegg B: Å løse likninger ved bytte av variabel

La oss løse likningen

$$x - 11\sqrt{x} + 28 = 0 \quad (7.3)$$

Hvis vi ser nøye etter, innser vi at dette er en andregradslikning for $\sqrt{x}$. Enda tydeligere blir dette hvis vi definerer variabelen $u = \sqrt{x}$, da kan vi skrive (7.3) som

$$u^2 - 11u + 28 = 0$$

Siden $(-7) \cdot (-4) = 28$ og $-7 - 4 = -11$, har vi av (2.1) at

$$(u - 4)(u - 7) = 0$$

Altså er

$$u = 4 \quad \vee \quad u = 7$$

Dette betyr at

$$\sqrt{x} = 4 \quad \vee \quad \sqrt{x} = 7$$

Dermed er

$$x = 16 \quad \vee \quad x = 49$$

Vedlegg C: Eksakte verdier for utvalgte vinkler

	0	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

Tips

For å finne eksakte verdier av sinus til en vinkel, kan vi sette opp følgende tabell:

	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin x$	0	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$

For cosinus setter vi opp mønsteret andre veien:

$$\cos x \quad \left| \frac{\sqrt{4}}{2} \right| \quad \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right| \quad \left| \frac{\sqrt{2}}{2} \right| \quad \left| \frac{\sqrt{1}}{2} \right| \quad 0$$

Erstatter vi $\frac{\sqrt{1}}{2}$ med $\frac{1}{2}$ og $\frac{\sqrt{4}}{2}$ med 1, får vi dette:

	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Av tabellen over kan vi enkelt finne $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$:

	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞

Vedlegg D: Eulers tall

Den deriverte som motivasjon

Gitt funksjonen $f(x) = a^x$. Da har vi at

$$\begin{aligned}(a^x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x a^h - a^x}{h}\end{aligned}$$

Da x er uavhengig av h , får vi at

$$(a^x)' = a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h}$$

Likningen over peker mot noe fantastisk; hvis det finnes et tall a som er slik at $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = 1$, så vil funksjonen a^x være sin egen deriverte funksjon! Altså er da $(a^x)' = a^x$. Vi legger nå merke til at hvis

$$a = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}}$$

så er

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left((1 + h)^{\frac{1}{h}}\right)^h - 1}{h} \\ &= \frac{1 + h - 1}{h} \\ &= 1\end{aligned}$$

Hvis vi kan vise at grenseverdien $\lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}}$ eksisterer, har vi altså funnet akkurat det uttrykket for a som vi ønsker oss.

Undersøking av grenseverdien

Vi innfører følgende to funksjoner (motivasjonen for å innføre g vil komme fram senere):

$$f(h) = 1 + h \quad , \quad g(h) = 2 - \left(\frac{1}{4}\right)^h$$

Videre undersøker vi for hvilke verdier f er mindre enn g . Når $f = g$, har vi at

$$1 + h = 2 - \left(\frac{1}{4}\right)^h \tag{7.4}$$

Vi gjør nå følgende observasjon: Gitt to tall c og k , og funksjonen $p(h) = b^h$, hvor $k > 0$ og $0 < b < 1$. Da har vi at

$$p(c+k) - p(c) = b^{c+k} - b^c = b^c (b^k - 1)$$


Tilsvarende er

$$p(c+2k) - p(c+k) = b^{c+k} (b^k - 1)$$

Videre er $b^{c+k} < b^c$ og $b^k - 1 < 1$, som betyr at

$$\frac{p(c+k) - p(c)}{k} < \frac{p(c+2k) - p(c+k)}{k}$$

Dermed må linja mellom $(c, p(c))$ og $(c+k, p(c+k))$ være brattere enn linja mellom $(c+k, p(c+k))$ og $(c+2k, p(c+2k))$, og da må $(c+k, p(c+k))$ ligge under linja mellom $(c, p(c))$ og $(c+2k, p(c+2k))$.




Da $p(h)$ ikke er en lineær funksjon, må én av disse tre påstandene være gyldig:

- p er konveks for alle h
- p er konkav for alle h
- p er skiftvis konkav/konveks

Men hvis p er konkav, må det finnes et intervall hvor $(c+k, p(c+k))$ ligger over linja mellom $(c, p(c))$ og $(c+2k, p(c+2k))$, og dette er selvmotsigende. Altså må p nødvendigvis være konveks for alle h .

Av det vi akkurat har funnet, kan vi konkludere med at funksjonen $2 - \left(\frac{1}{4}\right)^h$ er konkav for alle h , og da $1 + h$ er et lineært uttrykk, har (7.4) maksimalt to løsninger. Det er enkelt å vise at $h = 0$ og $h = \frac{1}{2}$ er løsningene til (7.4), og dette betyr at

$$1 + h \leq 2 - \left(\frac{1}{4}\right)^h, \quad x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \quad (7.5)$$



Vi setter $z = \frac{1}{h}$ for $h \neq 0$. Da er

$$\lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^h = \lim_{z \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^{\frac{1}{z}}$$

Videre kan (7.5) omskrives til

$$1 + \frac{1}{z} \leq 2 - \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{z}}, \quad z \in [2, \infty] \quad (7.6)$$

For $z \rightarrow \infty$ kan vi derfor være sikre på at

$$1 + \frac{1}{z} < 1 + 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{z}} + \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{z}}\right)^2 + \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{z}}\right)^3 + \dots$$

Høgresiden i ulikheten over kjenner vi igjen¹ som en uendelig geometrisk rekke hvor summen er gitt som

$$\frac{1}{1 - \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{z}}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{z}}} = 4^{\frac{1}{z}}$$

Altså er

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z \leq \lim_{z \rightarrow \infty} \left(4^{\frac{1}{z}}\right)^z = 4 \quad (7.7)$$

¹Se om geometriske rekker i [TM2](#).

Videre er det enkelt å vise at likningen

$$1 + h = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^h$$

har løsningene $h = -1$ og $h = 0$, som betyr at

$$1 + h \geq 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^h, \quad h \in [0, \infty]$$

På tilsvarende måte som vi kom fram til en øvre grense, kan vi bruke dette til å slå fast at

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z \geq 2$$

Dermed vet vi at $\lim_{z \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^n$ ligger et sted mellom 2 og 4. Da uttrykket inneholder utelukkende positive ledd for $z \rightarrow \infty$, kan vi også være sikre på at grenseverdien er endelig¹. Det gir derfor mening å behandle grenseverdien som et tall, som vi kaller for e :

$$e = \lim_{z \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{\frac{1}{h}}$$

Merk

Den mest klassiske metoden for å finne en øvre og en nedre grense for $\lim_{z \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^n$ er ved å bruke [Binomialteoremet](#).

Et tilbakeblikk på den deriverte

Derivasjon av potensfunksjoner var det som motiverte oss til å undersøke tallet e . Av det vi har drøftet i de foregående avsnittene, følger det at

$$(e^x)' = e^x$$


Likningen over er rett og slett én av de viktigste likningene i matematikk.

¹I motsetning til å være ubestemt. For eksempel vil $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos x$ være ubestemt, fordi $\cos x$ svinger mellom -1 og 1 .

Vedlegg E: Rolles teorem og middelveidisetningen

7.21 Rolles teorem

Gitt en funksjon $f(x)$, deriverbar på intervallet (a, b) , og hvor $f(a) = f(b)$. Da fins et tall $c \in [a, b]$ slik at $f'(c) = 0$.



7.21 Rolles teorem (forklaring)


Hvis uttrykket til f er en konstant, er $f'(x) = 0$ på hele intervallet, og påstanden om tallet c er åpenbart sann.

Hvis uttrykket til f ikke er en konstant, impliserer dette at f har et lokalt ekstremalpunkt på intervallet (a, b) (siden $f(a) = f(b)$). La c være dette ekstremalpunktet, av [regel 7.8](#) er da $f'(c) = 0$.

7.22 Middelverdisetningen

Gitt en funksjon $f(x)$ deriverbar på intervallet (a, b) . Da fins et tall $c \in (a, b)$ slik at

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



7.22 Middelverdisetningen (forklaring)

La $g(x)$ være den lineære funksjonen som beskriver linja som går gjennom punktene $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$. Videre definerer vi

$$h(x) = f - g = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - x) + f(a)$$

Da har vi at $h(a) = h(b) = 0$. Av [Rolles teorem](#) vet vi da at det fins et tall $c \in (a, b)$ hvor $h'(c) = 0$. Dette betyr at

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

Vedlegg F: Tangeringslinja til en graf


Introduksjon

Innen geometri er en *tangeringslinje til en sirkel* definert som en linje som skjærer en sirkel i bare ett punkt (Moise, 1974). Av denne definisjonen kan det vises at

- en tangeringslinje står normalt på vektoren dannet av sentrum i sirkelen og skjæringspunktet
- enhver linje som har et skjæringspunkt med en sirkel, og hvor skjæringspunktet og sentrum i sirkelen danner en normalvektor til linja, er en tangeringslinje til sirkelen.

(Se figur 7.1a.)

Gitt en deriverbar funksjon $f(x)$. Innen reell analyse defineres *tangeringslinja til f i punktet $(a, f(a))$* som linja som går gjennom $(a, f(a))$ og har stigningstall $f'(a)$ (Spivak, 1994). (Se Figur 7.1b.)



Figur 7.1

Det er for mange ganske intuitivt at tangeringslinjer til sirkler og tangeringslinjer til grafer er nært beslektet, men formålet med denne teksten er å formalisere dette.


Senteret til krumningen

Gitt en funksjon $\vec{r}(t) = [f(t), g(t)]$ der f og g er kontinuerlige og to ganger deriverbare for alle $t \in \mathbb{R}$, og hvor $f''(t), g''(t) \neq 0$. For $a, h \in \mathbb{R}$ setter vi $b = a - h$ og $c = a + h$. Videre innfører vi punktene

$$A = \vec{r}(a) \quad , \quad B = \vec{r}(b) \quad , \quad C = \vec{r}(c)$$

I tillegg introduserer vi skrivemåten $k_d^{\hat{n}}(t)$, hvor $\hat{n}$ erstattet med n eksemplar av ' viser til den n -te deriverte av funksjonen $k(t)$ i punktet d .

La $S = (S_x, S_y)$ være sentrum i den omskrevne sirkelen til $\triangle ABC$. På samme måte som vi finner den *deriverte* i et punkt ved å la avstanden mellom to punkt på en graf gå mot 0, kan man finne **krumningen** i et punkt ved å la avstanden mellom tre punkt gå mot 0. I vårt tilfelle er krumningen beskrevet av den omskrevne sirkelen til $\triangle ABC$ når h går mot 0.



Figur 7.2

Et likningssett for S

Vi har at

$$\overrightarrow{BA} = [f_s - f_b, g_a - g_b]$$

$$\overrightarrow{AC} = [f_c - f_a, g_c - g_a]$$

La B_m og C_m være midtpunktene til henholdsvis (sekantene) AB og AC . Da er

$$B_m = \frac{1}{2}(A + B) \quad , \quad C_m = \frac{1}{2}(A + C)$$

$[g_a - g_b, f_b - f_a]$ er en normalvektor for $\overrightarrow{BA}$, dette betyr at midtnormalen l_1 til AB kan parameterisere som

$$l_1(p) = B_m + [g_a - g_b, f_b - f_a]p$$

Tilsvarende er midtnormalen $\mathbf{l}_2$ til AC parameterisert ved

$$\mathbf{l}_2(q) = C_m + [g_a - g_c, f_c - f_a]q$$

S sammenfaller med skjæringspunktet til $\mathbf{l}_1$ og $\mathbf{l}_2$. Ved å kreve at $\mathbf{l}_1 = \mathbf{l}_2$, får vi et lineært likningssett med p og q som ukjente. La $q = q_s$ være løsningen av dette likningssettet, da vet vi at

$$S = C_m + [g_a - g_c, f_c - f_a]q_s$$

Videre er

$$\lim_{h \rightarrow 0} S = \lim_{h \rightarrow 0} \left(C_m + [g_a - g_c, f_c - g_a] \frac{h}{h} q_s \right) = A + [-g'_a, f'_a] \lim_{h \rightarrow 0} h q_s$$

At grensen $\lim_{h \rightarrow 0} h q_s$ eksisterer viser vi avslutningsvis, og observerer nå dette: Når $h \rightarrow 0$, blir $\overrightarrow{AS}$ parallell med vektoren $[-g'_a, f'_a]$. Vi har at $\vec{r}'(a) = [f'_a, g'_a]$, og dermed er

$$\overrightarrow{AS} \cdot \vec{r}'(a) = 0$$

Linja som går gjennom punktet $\vec{r}(a)$, og som har $\vec{r}'(a)$ som retningsvektor er altså en tangeringslinje til sirkelen som beskriver krumningen til $\vec{r}$ i a .

Undersøkelse av grensenverdien

Ved å løse det nevnte likningssettet, finner vi at

$$q_s = \frac{1}{2} \frac{f_c(f_c - f_a) + f_b(f_a - f_c) + g_c(g_c - g_a) + g_b(g_a - g_c)}{f_b(g_c - g_a) + f_c(g_a - g_b) + f_a(g_b - g_c)}$$

Videre er

$$\lim_{h \rightarrow 0} q_s = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} q_s = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_c f'_a - f_b f'_a + g_c g'_a - g_b g'_a}{f_b g'_a + f_c g'_b - 2 f_a g'_a}$$

Ved samme prosedyre har vi at

$$\lim_{h \rightarrow 0} q_s = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f'_a)^2 + (g'_a)^2}{f'_a g'_b - f'_b g'_a}$$

Videre har vi at

$$\lim_{h \rightarrow 0} h q_s = h \frac{(f'_a)^2 + (g'_a)^2}{f'_a g'_b - f'_b g'_a - f'_b g'_b + f'_b g'_b} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f'_a)^2 + (g'_a)^2}{f'_b g'_b + f'_b g'_b} = \frac{(f'_a)^2 + (g'_a)^2}{f'_a g'_a + f'_a g'_a}$$

Indeks

andrederiverte, 135
asymptote, 173
avtagende, 164

bruddpunkt, 126
bunnpunkt, 168

$\cos$, 57
cosinus, 57

definisjonsmengde, 15
delt forskrift, 18
den deriverte, 133
deriverbarhet, 134
derivert funksjon, 135
determinant, 104
diskontinuerlig, 126

e , 36
eksponentialfunksjonen, 36
ekstremalpunkt, 168
ekstremalverdi, 168
element, 12
eulers tall, 36

fortegnsskjema, 25
fullstendig kvadrat, 22
førstederiverte, 135

grenseverdi, 122

halveringslinje, 56
horisontal asymptote, 174

identitet, 22
infleksjonspunkt, 171

injektiv, 175
innskreven sirkel, 64
intervall, 12
 halvåpent, 12
 lukket, 12
 åpent, 12

konjugatsetningen, 22
konkav, 166
kontinuerlig, 126
konveks, 166
kritisk punkt, 168
kvadratsetningene, 22

logaritme, 37
 naturlig, 38

maksimum, 167
maksimumsverdi, 167
median, 63
mengde, 12
midtnormal, 56
midtpunkt, 56
minimum, 167
minimumsverdi, 167
monotoniegenskaper, 164

omskreven sirkel, 63
omvendt funksjon, 175

parameterisering, 99
periferivinkel, 59
polynomdivisjon, 30

retningsvektor, 100

rot, 172

sentralvinkel, 59

sin, 57

sinus, 57

stasjonært punkt, 168

tan, 57

tangens, 57

tangent, 59, 134

toppunkt, 168

vektor, 86

 normalisert, 114

vendepunkt, 171

verdimengde, 15

vertikal asymptote, 173

voksende, 164

én-entydig, 175

Fasit

Kapittel 1

1.1.1 a) $D_f = \mathbb{R}, V_f \in [0, \infty)$ b) $D_f = [\sqrt{5}, \infty) \cup (-\infty, -\sqrt{5}]$, $V_f \in [0, \infty]$
c) $D_f = \mathbb{R}/\{3\}$, $V_f = \mathbb{R}/\{0\}$

1.1.2 $V_g = [1, 6]$ og $D_g = [-4, 4]$, $V_h = [-1, 2] \cup (3, 4]$ og $D_h = [-6, -3] \cup [-2, 4]$,
 $V_k = (-1, 3]$ og $D_k = [-4, 4]$

1.2.1 a) a og b er partall $\Rightarrow a + b$ er et partall. b) tallet er delelig med 2
 $\Leftarrow$ tallet er delelig med 4. c) tallet er delelig med både 2 og 3 $\iff$ tallet er delelig med 6.

Kapittel 2

2.1.1 a) $(x+3)^2$ b) $(b+7)^2$ c) $(a-1)^2$ d) $(k - \frac{1}{3})^2$ e) $(c - \frac{1}{4})^2$
f) $(y + \frac{3}{7})^2$

2.1.2 a) $(5a + 9)^2$ b) $(3b + 2)^2$ c) $(8c - 1)^2$ d) $(\frac{1}{2}d + \frac{3}{4})^2$
e) $(\frac{1}{5}e + \frac{2}{7})^2$ f) $(\frac{9}{8} - \frac{5}{3})^2$

2.1.3 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

2.1.4 $s = 5$, $r = 25$

2.1.5 $s = 2$, $r = 16$, $t = 4$

2.1.7 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

2.1.8 a) Se løsningsforslag. b) $\frac{5}{13}(4 + \sqrt{3})$ c) Se løsningsforslag.

2.1.9 a) $(x+3)^2 - 16$ b) $(x-4)^2 - 36$ c) $(x+6)^2 + 81$ d) $(2x-3)^2 + 2$
e) $(7x+9)^2 - 1$

2.1.10 Så lenge vi søker heltall, er det bare noen få heltall som vil oppfylle kravet $a_1 a_2 = c$, mens uendelig mange heltall oppfyller kravet $a_1 + a_2 = b$.

2.1.11 $(x + 3)^2 - 16 = (x + 7)(x - 1)$, $(x - 4)^2 - 36 = (x + 2)(x - 10)$

2.1.12 a) $(x - 5k)^2$ b) $(y + 4z)^2$ c) $(a - 10q)^2$

2.1.6 a) Positiv for $x \in (-1, 2) \cup (7, \infty)$, negativ for $x \in (-\infty, -1) \cup (2, 7)$

b) Positiv for $x \in (-\infty, -1) \cup (3, \infty)$, negativ for $x \in (-1, 3)$. Se løsningsforslag for fortegnsskjema.

2.1.13 $a = 2$ og $b = 6$ eller $a = -2$ og $b = -6$

2.1.14 a) $-4 < x < 2$ b) $-2 < x < 6$ c) $-6 \leq x \leq -1$

2.1.15 a) $x \in (-\infty, 3) \cup (7, \infty)$ b) Se løsningsforslag.

2.1.16 a) $\frac{2(x+1)}{x-1}$ b) $\frac{2x}{x+3}$

2.1.17 a) Man kan ikke vite om fellesnevneren er positiv eller negativ, og dermed vet man ikke om ulikhetstegnet må snus eller ikke.

b) $x \in (-\frac{11}{2}, -5) \cup (-3, \infty)$

2.2.1 Se løsningsforslag.

2.2.2 a) $x = 0 \vee x = 2$ b) $x = 0 \vee x = -9$ c) $x = 0 \vee -\frac{2}{7}$
d) $x = 0 \vee x = \frac{8}{9}$

2.2.3 $x = -2$ og $x = 4$

2.2.4 a) $x = 3 \vee x = -5$ b) $x = 7 \vee x = -10$ c) $x = \frac{-5 \pm \sqrt{53}}{2}$
d) $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ e) $x = 1 \pm \sqrt{10}$ f) $x = 2 \pm 2\sqrt{2}$ g) $x = 1 \vee x = -\frac{7}{5}$
h) $x = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$ i) $x = 2 \pm \frac{\sqrt{33}}{3}$

2.2.5 $f(x) = -2x^2 - 2x + 12$

2.2.6 $k = -1$

2.2.7 $x = -1$

2.2.8 a) $x = 2$ og $y = 0$ eller $x = -3$ og $y = -5$ Se løsningsforslag.

2.2.9 Se løsningsforslag.

2.2.10 a) 0 for begge. t og s er løsningene av likningen $f(x) = 0$. b) Se løsningsforslag.
c) $\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a}$. Dette er distansen mellom nullpunktene. d) $\frac{-b}{2a}$. Dette er x -verdien til midtpunktet mellom nullpunktene. e) $\frac{c}{a}$. $a = 5$ og $c = 15$

2.3.1 Utfør polynomdivisjon på uttrykkene

a) $x - 2$ b) $x^2 - 1$ c) $x - 3$ d) $x + 4 + \frac{9}{x-2}$

2.3.2 Se løsningsforslag.

2.3.3 $f(3) = 0$, da er f delelig med $x - 3$.

2.3.4 a) $P = (x - 3)(x - 4)(x + 7)$ b) $P = (x + 1)(x + 3)(x + 5)$
c) $P = (x + 1)(x + 6)(2x + 7)$

2.3.5 $k = -2$

2.3.6 $(-2, 4)$, $(0, 8)$ og $(3, 14)$

2.5.1 $2 \ln e < 3 \log_{10} 70 < e^{3 \ln 2}$

2.5.2 $3\sqrt{11}$ og $10 \ln 9$

2.5.3 Løs likningen.

a) $x = \frac{\ln 2}{\ln 5}$ b) $x = \frac{\ln 9}{\ln 8}$ c) $x = \frac{1}{\ln 2} \ln \frac{19}{11}$

2.5.4 Se løsningsforslag.

2.5.5 a) $x = \frac{1}{2}$ b) $x = -3, x = 1$ og $x = 0$

2.5.6 a) $x = e^2 \vee x = e^3$ b) $x = e^{-7} \vee x = e^{10}$ c) $x = \ln 3$
d) $x = \ln 2$ e) $x = \ln 2$ f) $x = \frac{1}{100} \vee x = 10000$ g) $x = \log 3$
h) $x = e^{-2} \vee e^3$

2.5.7 a) $\lg 7 < e^{3 \ln 1} < \sqrt[4]{3^3} < \log_2 8$ b) $5 \lg b + 2$ (eventuelt $\lg(100b^5)$)

2.5.8 $a = 4$

2.5.9 a) $\frac{1}{2}(6 + e^2)$ b) $x = 2$ c) $x = \frac{3}{2}$ d) $x = e^{-x}$

Gruble 1 Se løsningsforslag.


Gruble 2 $x = -3, x = -1$ og $x = 2$

Gruble 3 $x = -4 \vee x = \frac{1}{2} \vee x = 2$

Gruble 4 $a = 1, b = 4, c = 16$

Gruble 5 $f(x) = x^2 + 6 + 9$

Gruble 6 $(-1, -4)$



Gruble 7 $-2 < x < 1$ og $x < -6$

Gruble 8 $x = -4 \vee x = 1$

Gruble 9 a) $f(x) = -2(x+3)(x-4)$. b) $-2 < x < 3$.

Gruble 10 $a = 5$

Gruble 11 $c = 6$

Gruble 12 $x = -2, x = -10$ og $x = 1$

Gruble 13 a) $(x+5y)(x-4y)$ b) $(a-2b)(a-7b)$ c) $(k^2-y)(9k^5-y)$

Gruble 14 Se løsningsforslag.

Gruble 15 Se løsningsforslag.

Gruble 16 Se løsningsforslag.

Gruble 17 Se løsningsforslag.

Gruble 18 Riktig.

Gruble 19 $x = 3$ og $y = 12$

Gruble 20 a) $(\sqrt{7}-\sqrt{3})^2$ b) $(\sqrt{11}+\sqrt{2})^2$ c) $(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2$ d) $(\sqrt{35}-\sqrt{7})^2$

Gruble 21 a) $(q-p)(q^2+pq+p^2)$ b) Se løsningsforslag.

Gruble 22 $(r^2+2bd)(2bd-2dr-r^2)$

Kapittel 3

3.1.1 a) Se løsningsforslag. $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$. b) Se løsningsforslag. c) Se løsningsforslag.
d) $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ og $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ e) $\tan 45^\circ = 1$,
 $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$

3.1.2 Se løsningsforslag.

3.1.3 Se løsningsforslag.

3.1.4 Se løsningsforslag.

3.1.5 a) $\sin 180^\circ = 0$, $\cos 180^\circ = -1$, $\tan 180^\circ = 0$ b) $\sin 150^\circ = \frac{1}{2}$,
 $\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 150^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ c) $\sin 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$,
 $\tan 135^\circ = -1$ d) $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$, $\tan 120^\circ = -\sqrt{3}$

3.1.6 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag. c) Se løsningsforslag.
d) Se løsningsforslag.

3.2.1 a) $v = 60^\circ$ b) $v = 10^\circ$

3.2.2 Vinklene har samme sentralvinkel, og må dermed ha lik størrelse.

3.2.3

a) Se løsningsforslag.

b) $\angle C = 90^\circ \Leftarrow AB$ er en diameter i den omskrevne sirkelen til $\triangle ABC$

3.2.4 Se løsningsforslag.

3.2.5 Se løsningsforslag.

3.2.6 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag. c) Se løsningsforslag.

3.3.1 6

3.3.2 a) 15 b) 7

3.3.3 a) $\frac{35\sqrt{3}}{4}$ b) $\frac{3(\sqrt{5}-1)}{2}$ c) $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$

3.3.4 $4\sqrt{3}$

3.3.5 a) Se bevis gitt på side 70. b) Se bevis gitt på side 71 i.

3.3.6 $AC = 8$

3.3.7 Trekanten er rettvinklet og likebeint.

3.3.8 $BC = \sqrt{28}$

Gruble 23 Se løsningsforslag.

3.3.9 a) $10\sqrt{3}$ b) $18 + 10\sqrt{3}$

Gruble 24 $AC = 2$, $BC = 2\sqrt{21}$

Gruble 25 a) $2\sqrt{3}$ b) $6\sqrt{2}$

Gruble 26 $2\sqrt{2}$

Gruble 27 a) Den ene sidelengden er 14. Vinkelen mellom sidene med lengder x og 16 er 60° . b) 6, 14 og 16 eller 10, 14 og 16 c) $8\sqrt{3}$

Gruble 28 $\cos 15^\circ = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$, $\sin 75^\circ = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$, $\cos 75^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$ og $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$

Gruble 29 $(7 + 3\sqrt{2} + \sqrt{3})a$

Gruble 30 $\sin 160^\circ < \log 1 < \sin 60^\circ < \left(\frac{3}{4}\right)^{-1}$

Gruble 31 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

Gruble 32 a) Nei. b) Ja. c) Nei

Gruble 33 Trekanten med vinkel 32° markert.

Gruble 34 a) $2\sqrt{10}$ b) $24\sqrt{5}(\sqrt{3} - 1)$

Gruble 35 Se løsningsforslag.

Gruble 36 Se løsningsforslag.

Gruble 37 Se løsningsforslag.

Gruble 38 $r^2 \left(\frac{\sin(2v)}{2} + \frac{\pi v}{180^\circ} \right)$

Gruble 39 Se løsningsforslag.

Gruble 40 Se løsningsforslag.

Gruble 41 Se løsningsforslag.

Gruble 42 Se løsningsforslag.

Gruble 43 45°

Gruble 44 Se løsningsforslag.


Gruble 45 Se løsningsforslag.

Kapittel 4

4.1.1 $\overrightarrow{AB} = [1, 3]$, $\overrightarrow{AC} = [-3, -5]$, $\overrightarrow{BC} = [-4, -8]$ og $\overrightarrow{CD} = [9, -2]$

4.2.1 Se løsningsforslag.

4.2.2 Se løsningsforslag.



4.2.3

4.2.4 a) $4\vec{u} + \vec{v}$ b) $3\vec{v}$ c) $4\vec{u} + 3\vec{v}$ d) $3(\vec{u} + \vec{v})$ e) $\vec{u} + \frac{3}{2}(\vec{u} + \vec{v})$

4.3.1 $|\vec{a}| = 5, |\vec{b}| = \sqrt{50}, |\vec{c}| = 10, |\vec{d}| = 5$

4.4.1 $\vec{u} \cdot \vec{v} = 32$ og $\vec{u} \cdot \vec{w} = 4$

4.4.2 Se løsningsforslag.

4.4.3 Se løsningsforslag.

4.4.4 a) -4 b) 41

4.4.5 a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 10\sqrt{3}$ b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{21\sqrt{2}}{2}$ c) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\frac{5}{2}$

4.4.6 a) 30° b) 60° c) 150°

4.4.7 $\vec{u} \cdot \vec{v} \leq |\vec{u}||\vec{v}|$

4.5.1 $\vec{a}$ og $\vec{c}$ er ortogonale. $\vec{a}$ og $\vec{d}$ er ortogonale.

4.5.2 $s = 6$

4.5.3 $[a, b] \cdot [-b, a] = -ab + ab = 0$

4.5.4 Riktig.

4.6.1 Ingen er parallelle.

4.6.2 $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er parallelle.

4.6.3 $s = 4$

4.7.1

a) $\vec{l}(t) = [-2, 7] + t[5, -12], \vec{l}(t) : \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 7 - 12t \end{cases}$

b) $\vec{l}(t) = [3, 9] + t[7, -16], \vec{l}(t) : \begin{cases} x = 3 + 7t \\ y = 9 - 16t \end{cases}$

4.7.2 a) $(2, 3)$ og $[4, -5]$ b) -6 c) $(42, -47)$ ligger på linja, $(30, -31)$ ligger ikke på linja.

4.7.3 $\frac{b}{a}$

4.8.1 Se løsningsforslag.

4.8.2 a) $(3, -1)$ og 4 b) $(0, 5)$ og 9

4.9.1 17 og $\frac{17}{2}$.

4.9.2 a) $\frac{15}{\sqrt{13}}$ b) $\frac{3\sqrt{10}}{2}$

Gruble 46 a) Se løsningsforslag. b) $[6, 8]$

Gruble 47 Se løsningsforslag.

Gruble 48 a) $\angle CBA < 90^\circ$ b) $P = (-26, -24)$

Gruble 49 a) BC b) Ingen

Gruble 50 a) $|\vec{u}| = \sqrt{7}$, $\vec{v} = \sqrt{364}$ b) $-\frac{35}{\sqrt{7}\sqrt{364}}$

Gruble 51 a) $t = 8$ b) $t = \pm \frac{2\sqrt{10}}{5}$

Gruble 52 a) $t = 6$ b) $t = -\frac{1}{3}$

Gruble 53 a) Se løsningsforslag. b) $Q = (\frac{1}{5}, \frac{27}{5})$

Gruble 54 a) $\sqrt{26}$ b) $(13, 0)$ c) $t = -3$

Gruble 55 $\vec{p} = [8, 12]$ a) $\vec{u}$ og $\vec{w}$ er like lange. b) $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er ortogonale, $\vec{u}$ og $\vec{p}$ er ortogonale c) $a = \frac{5}{2}$, $b = \frac{5}{6}$

Gruble 56 a) $|\vec{p}| = 2\sqrt{13}$ b) $t = -\frac{6}{7}$

Gruble 57 a) $AB = \sqrt{5}$ b) $a = \frac{1}{2}$ c) $(-1, 3)$

Gruble 58 a) $a = -\frac{3}{4}$. b) $a = 1$ eller $a = -7$.

Gruble 59 a) $C = (7 + 2t, 5 + 5t)$, $D = (3 + 2t, 2 + 5t)$ b) $t = 3$

Gruble 60 a) $\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$, $\overrightarrow{PR} = \frac{2}{3}(\vec{b} - \vec{a})$ b) $\overrightarrow{PR} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. c) $AB = 2\sqrt{2}$

Gruble 61 $[-\sqrt{3}, 1]$

Gruble 62 a) Se løsningsforslag. b) $\frac{226}{26\sqrt{82}}$ c) Se løsningsforslag.
d) $E = (8, \frac{10}{3})$

Gruble 63 a) $(0, 4)$ og 5 $\vec{a}$ skjærer i to punkt, $\vec{b}$ tangerer, $\vec{c}$ skjærer ikke. b) Tangenteringspunkt: $(-4, 7)$, skjæringpunkt: $(0, -1)$ og $(4, 7)$

Gruble 64 Se løsningsforslag.

Kapittel 5

5.2.1 f : Ja, g : Nei, h : Ja.

5.2.2 $a = 2$

5.2.3 a) 18 b) $\frac{1}{2}$ c) 0 d) ∞ e) $\frac{1}{7}$ f) $\frac{1}{4}$ g) 0

5.2.4 8

5.2.5 a) Nevner går mot null uten at teller gjør det. b) $a = 3$, grenseverdien er $\frac{1}{6}$

Gruble 65 2

Gruble 66 Ikke rett.

Kapittel 6

6.1.1 Se løsningsforslag.

6.1.2 a) $f_1'(x) = 1$, $f_2'(x) = 2x$, $f_3'(x) = 3x^2$ b) $f_n'(x) = nx^{n-1}$

6.2.1 a) $15x^2$ b) $-48x^5$ c) $3x^6$ d) $-\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ e) $\frac{9}{7}x^{\frac{2}{7}}$

6.2.2 a) $2e^x$ b) $-30e^x$ c) $\frac{8}{x}$ d) $-\frac{4}{x}$

6.2.3 $\frac{1}{x^k} = x^{-k}$, $(x^{-k})' = -kx^{-k-1}$

6.2.4 a) $-10x^{-3}$ b) $-70x^{-11}$ c) $\frac{14}{9}x^{-8}$ d) $-\frac{24}{55}x^{-\frac{13}{5}}$

6.2.5 Deriver funksjonene

a) $g'(x) = 18x + 2x^{-3}$ b) $f'(x) = 20x^3 - x^{-2}$ c) $h(x) = -x^{-2} + 2$
d) $a(x) = e^x$ e) $p(x) = e^x - x^{-2}$ f) $b(x) = 6x - \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}$

6.2.6 a) f er kontiuerlig i $x = 0$. b) f er ikke deriverbar i $x = 0$.

6.2.7 a) $2ax + b$ b) $35x^4 - 3a$ c) $-63qx^6 + 9px^2$

6.2.8 a) $2e^{2x}$ b) $-5e^{-x}$ c) $\frac{1}{x}$ d) $2 \cdot \frac{1-3x^2}{x^3-x}$

6.2.9 Se løsningsforslag.

6.2.10 a) $1 + \ln x$ b) $-2x^2 e^x (x+3)$ c) $4x^{-4}(1-3 \ln x)$ d) $e^x (\ln x + x^{-1})$

6.2.11 Deriver uttrykkene.

a) $\frac{x-2}{x^3} e^x$ b) $(\ln x - \frac{1}{x} - 1) \frac{1}{\ln^2 x}$ c) $-\frac{5}{(x-1)^2}$ d) $\frac{e^x (x-4) - 4 \ln x + 1}{x^5}$

6.2.12 a) $\frac{1-3x}{\sqrt{1-2x}}$ b) $3e^{2x}(1+2x)$ c) $3x(2 \ln x + 1)$ d) $\frac{4x}{\sqrt{4x^2-5}}$

e) $\frac{7x^3-3x^2}{\sqrt{2x-1}}$ f) $\frac{x^4-6x^2}{(x^2-2)^2}$ g) $14x(x^2+2)^6$ h) $\frac{1-2x^2}{e^{x^2}}$ i) $\frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$

j) $4x(2 \ln(3x) + 1)$ k) $e^{2x}(1+2x)$ l) $6x - \frac{3}{(x-2)^2}$

6.2.13 Se løsningsforslag.

6.2.14 a) $g'(2) = e^{-2}$, $g'(3) = 3e^{-3}$. b) g er avtagende når $x \in [2, 3]$

Gruble 67 $y = 2x$

Gruble 68 $a = \frac{1}{64}$, $b = 0$, $c = \frac{1}{2}$

Gruble 69 a) Se løsningsforslag.. b) $b = -3 \vee b = 3$ c) $y = 3x$,
 $y = 3x + \frac{4}{27}b^3$ **Gruble 70** $f'(x) = 3x - 15$.

Gruble 71 $y = -2x + 6$

Gruble 72 a) $f'(4)$ tilsvareer stigningstallet til tangenten til f i $(4, 0)$, som er 5.
b) $f'(x) = x + 1$

Gruble 73 $f(x) = -x^3 + 6x^2 + 9x - 10$

Gruble 74 a) $t = -3$ b) f er ikke deriverbar i $x = 2$.

Gruble 75 Rett

Gruble 76 a) $x = \ln 6$ b) Se løsningsforslag. c) Toppunkt $(\ln 3, 9)$

Gruble 77 Den grønne grafen.

Gruble 78 Se løsningsforslag.

Gruble 79 Se løsningsforslag.

Gruble 80 $T = (\frac{1}{2}, e)$

Gruble 81 a) $a = -3, b = 3$ b) $\frac{1}{3}$ c) $(2, -1)$

Gruble 82 a) f er kontinuerlig under gitte vilkår. b) $a = 2, b = -2, c = -1, k = 1$

Gruble 83 $a = 1, b = -3, c = 1, d = 1$

Gruble 84 a) $B = (e, 1)$. b) $\frac{1}{4}e^2 - \frac{1}{4}$

Gruble 85

- a) Se løsningsforslag.
- b) $d = \frac{\ln C}{b}$
- c) Se løsningsforslag.
- d) Se løsningsforslag.
- e) Infleksjonspunkt. Vendepunkt.

Gruble 86 Se løsningsforslag.

Gruble 87 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

Gruble 88 a) $p = \frac{1}{4}$ b) $FC = c^2 + \frac{1}{4}$ c) Se løsningsforslag. d) $\frac{c}{2}$
e) Se løsningsforslag..

Gruble 89 Se løsningsforslag.

Kapittel 7

7.2.1 a) Bunnpunkt $(e^{-\frac{1}{2}}, -2e^{-1})$ b) Toppunkt $(\frac{1}{2}, 0)$ og bunnpunkt $(-\frac{3}{2}, 8e^{-\frac{3}{2}})$

7.2.2 $\frac{b+c}{2}$

7.2.3 $a = 20$

7.2.4 a) $f(x) = -\frac{20}{49}(x-3)(x+4)$ b) $f(x) = -\frac{400}{121}(x-10)(x+1)$
 c) $f(x) = -\frac{9}{4}(x-8)(x-12)$

7.2.5 Se løsningsforslag.

7.3.1 a) Vertikal: $x = 2$, horisontal: $y = 0$, skjæringspunkt: $(0, -2)$ b) Vertikal: $x = -3$, horisontal: $y = 0$, skjæringspunkt: $(0, \frac{3}{7})$ c) Vertikal: $x = \pm 4$, horisontal: $y = 1$, skjæringspunkt: $(0, 0)$ d) Vertikal: $x = 2$, horisontal: $y = 1$, skjæringspunkt: $(0, \frac{3}{2})$ e) Vertikal: $x = 0$, horisontal: $y = 1$, skjæringspunkt: ingen f) Vertikal: $x = -\frac{1}{2}$, horisontal: $y = 6$, skjæringspunkt: $(0, -3)$

7.3.2 $f(x) = \frac{3}{x+2} + 3$ eller $f(x) = \frac{3x+9}{x+2}$ (Obs! Flere mulige svar)

7.4.1 a) $g(y) = \frac{y}{3}$ b) $g(y) = \frac{2-y}{9}$ c) $g(y) = \frac{2y+14}{5}$ d) $g(y) = \frac{3}{y} + 5$
 e) $g(y) = y^2$ f) $g(y) = y^3$ g) $g(y) = y^4 - 9$

7.4.2 a) $g(y) = \ln(y-2)$ b) $g(y) = e^y - 5$ c) $g(y) = e^{\frac{1}{y}}$

7.4.3 $g'(1) = e$

7.4.4 Avgjør om funksjonen har en omvendt funksjon for hele definisjonsmengden. Begrunn svaret ditt.

- a) Nei. Ikke strengt voksende på hele intervallet.
- b) Ja. Strengt avtagende på hele intervallet.

7.4.5 $a = 7$

7.4.6 Den er strengt voksende eller strengt avtagende på intervallet.

Gruble 90 Endepunkt og kritiske punkt.

Gruble 91 $a = \frac{3}{20}$, $b = \frac{7}{40}$, $c = -\frac{11}{10}$, $d = \frac{63}{10}$

Gruble 92 $f(x) = \frac{3x-6}{x-1}$

Gruble 93 $f(x) = \frac{4x+12}{x-2}$ (Obs! Flere mulige svar)

Gruble 94 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

Gruble 95 a) $x \in \{-2, 1, 8\}$ b) c

Gruble 96 a) c b) f

Gruble 97 Se løsningsforslag.

Gruble 98 $I = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

Gruble 99R1V26 a) Ikke riktig (Se løsningsforslag.). b) Riktig (Se løsningsforslag.).

Gruble 100

- a) Se løsningsforslag.
- b) $k = 0$
- c) $(-2, 2)$

Gruble 101 Se løsningsforslag.

Gruble 102 $C = \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{8}{3} \right)$

Gruble 103 a) $\frac{25}{32}$. b) $a = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Gruble 104 a) f b) $f(x) = x^2 + 3, g(x) = \begin{cases} x-1 & , \quad x < 1 \\ 2x-4 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$,
 $h = (x-1)(x+1)(x+2)$ c) Se løsningsforslag.

Gruble 105 1. Usann, 2. Sann, 3. Sann.

Gruble 106 Se løsningsforslag.

Gruble 107 a) f : nei, g : ja, h : ja, k : ja. b) $D_g = [-4, 4], D_h = [-5, -2) \cup [-2, 4], D_k = [-4, 4]$.

Gruble 108 $s = 3, 16$

Gruble 109 a) $\frac{18}{\sqrt{17}}$ b) $\sqrt{17}$

Gruble 110 a) Funksjon og andrederivert: A og G, E og H, B og C, F og D,
b) A, B, C og G fordi de er injektive

Gruble 111 a) $\frac{175}{2}$ b) $40\sqrt{5}$ c) $24 \cdot 10^{\frac{2}{3}}$

Gruble 112 a) $B = (b, a)$ b) $\vec{r} = [b-a, b-a], 45^\circ$

Gruble 113 a) $\vec{v} = t[1, 2 - \sqrt{3}]$.
b) $f(t) = (8 - 4\sqrt{3})t^2 + (7 - 5\sqrt{3})t - 12(13 - 7\sqrt{3})$ (Obs! Flere uttrykk mulig)
c) Se løsningsforslag. d) $B = (4, 4(2 - \sqrt{3}))$

Gruble 114 a) $A = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}, 0 \right), B = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{4}{3} \right)$ b) Se løsningsforslag.
c) $\frac{\sqrt{3}}{8} (1 + 3\sqrt{3})$ d) $\frac{1}{2} \sqrt{10\sqrt{3} + 41}$ e) $(x-2)(x^2-2x-5)$ f) $(1, -6)$
g) $x = \sqrt{6} + 1 \vee x = 1 - \sqrt{6}$

Gruble 115 Se løsningsforslag.

Gruble 116 a) Se løsningsforslag. b) $g(a) = \sqrt{a^2 + 2}$

Gruble 117 Se løsningsforslag.

Litteratur

<https://www.wikipedia.org/> (utvalgte temaer innen matematikk)

Moise, E. E. (1974). *Elementary geometry from an advanced standpoint*. Reading, Addison-Wesley Publishing Company.

Lindstrøm, T. (2006). *Kalkulus* (2. utg). Oslo, Universitetsforlaget AS.

Spivak, M. (1994). *Calculus* (3. utg). Cambridge, Cambridge University Press

