0.0.1 (GE22D2)

Snorre skal kjøpe ny mobiltelefon. Ved betaling får han to alternativer:

> Alternativ 1: Betal 12 000 kr med en gang
>
> Alternativ 2: Betal 550 kr per måned i to år.

Snorre velger alternativ 2.

Hvor mye dyrere blir mobiltelefonen med Alternativ 2 enn med Alternativ 1?

0.0.2 (GV25D2)

Et par sokker koster 80 kroner til full pris. Tabellen viser fire forskjellige tilbud. Finn tilbudet som gir lavest pris per sokkepar.

Tilbud 1	6 par for 299,-
Tilbud 2	25 % rabatt
Tilbud 3	3 par til prisen for 2 par
Tilbud 4	50 % på par nummer tre


0.0.3 (GV22D1)

Kristian lager esker av papirkvadrater med sidelengde 10 cm.

I hvert hjørne klipper han bort et lite kvadrat med sidelengde 2,5 cm.


Deretter bretter han opp papiret langs de prikkete linjene, og fester hjørnene med tape.

Hvor stort er volumet til eska?



0.0.4 (GV22D1)

Ta utgangspunkt i grafen under. Vurder om påstandene er riktige eller ikke.



	Korrekt	Ikke korrekt
Om farten er 40 km/h, er bremselengden omtrent 8 m		
For at bremselengden skal være mindre enn 15 m, må farten være mindre enn 55 km/h		
Om farten halveres, halveres også bremselengden		
Om farten er over 70 km/h, er bremselengden over 30 m		

0.0.5 (GV26D1)

Zara skal spare penger i banken. Hun har laget programmet nedenfor for å beregne sparingen.

a) Forklar hva programmet regner ut.

b) Hvor mye regner Zara med å ha i banken etter to år med sparing?

```
sparebeløp = 6000
vekstfaktor = 1.10
år = 0

while år < 5:
    sparebeløp = sparebeløp * vekstfaktor
    år = år + 1
    print(sparebeløp)
```

0.0.6 (GV25D2)

Elevrådet skal arrangere avslutningsfest for 10.trinn og undersøker pris for mat og drikke og leie av lokale. De har funnet tre tilbud:

Tilbud 1	150 kroner per elev for mat, drikke og leie av lokale.
Tilbud 2	75 kroner per elev for mat og drikke, pluss 3000 kroner i leie av lokale.
Tilbud 3	7 000 kroner som dekker mat, drikke og lokale for inntil 70 elever.

a) Lag en grafisk fremstilling av de tre tilbudene i samme koordinatsystem.

b) Sammenlign tilbudene, og finn ut når elevrådet bør velge de ulike tilbudene.

0.0.7 (GV24D2)

Gitt funksjonene

$$f(x) = 200x + 4 \quad , \quad g(x) = \frac{1000}{x} + 80 \quad , \quad h(x) - 100x$$

a) Tegn grafene til funksjonene. Forklar hvilke typer funskoner de er og hva som kjennetegner dem.

b) Velg én av funksjonene, og gi eksempel på en praktisk situasjon som funksjonen kunne ha beskrevet.

0.0.8 (GV26D2)

Silje har fått et jobboppdrag. Silje får tre forskjellige lønnstilbud å velge mellom:

Tilbud 1	186 kroner i timen
Tilbud 2	1000 kroner ved oppmøte + 50 kroner i timen
Tilbud 3	1 krone ved oppmøte, og beløpet dobles hver time. Tilbudet er beskrevet ved funksjon $f(x) = 2^x$.

Det er usikkert hvor lenge Silje skal jobbe, men hun skal bare jobbe hele timer, og ikke mer enn 12 timer.

a) Skisser de tre tilbudene i samme koordinatsystem.

b) Lag en oversikt over hvilke tilbud som gir høyest lønn for forskjellige tidsintervall. Grunngi svaret ditt.

0.0.9 (1PV22D1)

En elev har skrevet programkoden under. Hva ønsker eleven å finne ut? Forklar hva som skjer når programmet kjøres.

```
startverdi = 2000
verdi = startverdi
vekstfaktor = 1.05
år = 0

while verdi < startverdi*2:
  verdi = verdi*vekstfaktor
  år = år + 1

print(verdi)
print(år)
```

0.0.10 (1PH22D1)


David eier en tomt. Arealet til tomten er 600 m^2. Han har muligheten til å bygge på 30 % av tomtens areal. På tomten ønsker David å bygge

- en bolig som har en grunnflate med areal 140 m^2.
- en garasje med bredde 6 m og lengde 8 m.

Undersøk om David har plass til å bygge det han ønsker.

0.0.11 (1PV22D1)

Diagrammet viser antall elever ved en videregående skole de fire siste årene. Når var det størst prosentvis økning i antall elever fra et år til det neste? Grunngi svaret ditt.



0.0.12 (1PV22D2)

Markus skal leie en bil i et døgn. Grafene nedenfor viser prisene han må betale hos firma A, firma B og firma C for hver kilometer kjørt.


a) Forklar at prisen Markus må betale hos firma A kan beskrives ved uttrykket

$$A(x) = 4x + 600$$

b) Hva blir prisen per kilometer hos firma B dersom Markus kjører 50 km?

c) Hva blir prisen per kilometer hos firma B dersom Markus kjører 400 km?

d) Markus skal kjøre fra Bodø til Sulitjelma og tilbake til Bodø igjen. På internett finner han ut at avstanden fra Bodø til Sulitjelma er 9,7 mil. Hvilket firma bør han leie bil hos? Grunngi svaret ditt.



0.0.13 (1PH24D1)

Lisa driver en butikk. Butikken skal begynne å selge et nytt produkt 1. januar 2025. Lisa håper å selge 1000 enheter av produktet i januar. Hun håper også at salget av produktet vil øke hver måned. Lisa har laget de to programmene nedenfor.

a) Gi en praktisk tolkning av koden Lisa bruker i linje 7 i hvert av programmene.

b) Gi en praktisk tolkning av tallet `t` som skrives ut. Beskriv endringen i salg Lisa har antatt i Program 1, og endringen i salg hun har antattt i Program 2.

Program 1

```
1  e = 1000
2  t = 0
3  m = 1
4
5  while m <= 12:
6      t = t + e
7      e = e * 1.04
8      m = m + 1
9
10 print(t)
```

Program 2

```
1  e = 1000
2  t = 0
3  m = 1
4
5  while m <= 12:
6      t = t + e
7      e = e + 40
8      m = m + 1
9
10 print(t)
```

0.0.14 (1PV23D1)

Tall fra FN viser at folketallet på jorda nå har passert 8 milliarder.

Forskere har kommet fram til at det er omtrent 2,5 millioner ganger så mange maur som mennesker på jorda.

Omtrent hvor mange maur er det på jorden? Skriv svaret på standardform.

0.0.15 (1PV25D2)
Elise skal selge aviser. En avis koster 49 kroner. Firmaet hun skal arbeide for beregner lønn på ulike måter. Elise kan velge mellom to tilbud:

Tilbud 1	Lønn: 35 % av beløpet hun selger aviser for
Tilbud 2	Fast lønn: 150 kroner. Tillegg: 10 kroner per avis hun selger

Avgjør hvor mange aviser Elise må selge for at det skal lønne seg for henne å velge Tilbud 1.

0.0.16 (1PH24D2)
Funksjonen P gitt ved

$$P(x) = 3600 \cdot 0{,}85^x + 600$$

er en modell som viser hvor mange personer P som abonnerte på papirutgaven av en avis x år etter 2010.

a) Finn hvor mange personer det var som abonnerte på papirutgaven i 2010.

b) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(4, P(4))$ og $(14, P(14))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

I 2019 abonnerte 1000 personer på den digitale utgaven av avisen. Antallet personer som abonnerte på den digitale utgaven økte med 5,5% hvert år fra 2019 til 2024.

c) Lag en modell som viser hvor mange personser $D(x)$ som abonnerte på den digitale utgaven x år etter 2019.

0.0.17 (1PV24D1)

Ada vil spare penger og har funnet ut at hun kan bruke funksjonen f gitt ved

$$f(x) = 20\,000 \cdot 1{,}0485^x$$

til å regne ut hvor mye penger hun vil ha i banken om x år.

a) Gi en praktisk tolkning av tallet 20 000 og tallet 1.0485.

b) Ada har laget programmet nedenfor.

```
def f(x):
    return 20000 * 1.0485 ** x

start = 0
slutt = 10
v = (f(slutt) - f(start))/(slutt - start)

print(v)
```

Hvilket tall blir skrevet ut når programmet kjøres?

0.0.18 (1PV22D1)

En flaske dusjsåpe koster det samme i fire butikker. De fire butikkene bestemmer seg for å sette ned prisen. Dette gjør de på hver sin måte:

Butikk A Ta 3 flasker, og betal for 2 av dem	**Butikk B** 30% rabatt på hver flaske.
Butikk C Betal full pris for én flaske, og få 75% rabatt på den neste	**Butikk D** Betal full pris på 3 flasker, og få 2 gratis.

Finn prisen per flaske for hver av butikkene.

0.0.19 (1PV22D2)

Ved en temperatur på 22°C veier 1 L olje 0,9124 kg.

a) Hvor mange gram veier 10 mL av oljen ved denne temperaturen?

b) Oljen i et beger veier 556,6 g ved en temperatur på 22°C. Hvor mange desiliter olje er det i begeret?

0.0.20 (1PH24D2)


Sofie skal lage kasser av metallplater. Metallplatene har form som rektangler og er 1200 mm lange og 800 mm brede. For å lage kassene skal hun skjære bort et kvadrat i hvert av hjørnene og brette opp sidekantene.



Metallplate med form som et rektangel.



Skjær bort et kvadrat i hvert hjørne.



Brett opp langs de stiplede linjene.

Kassene skal fylles med sand.

a) Vis at det vil være plass til 60 L sand i en kasse dersom Sofie skjærer bort kvadrater med sidelengde 100 mm i hvert hjørne.

b) Finn funksjonen $V(x)$ som gir volumet til kassen ved valg av x mm som sidelengde på kvadratet som skjæres bort. Skisser grafen til funksjonen.

c) Bestem modellens gyldighetsområde. Argumenter for svaret ditt.

0.0.21 (1PV25D2)

Artikkelen under er hentet fra aesby.no

> I sommerens Stikk UT! har 40 000 deltagere registrert nær 1 million turer. De har tilbakelagt 3,3 millioner km på de ulike turene, noe som tilsvarer 83 ganger rundt jorda. Og når Stikk UT!-deltakerne i tillegg har lagt bak seg 78 000 høydekilometer, tilsvarer det nesten 9 000 ganger opp Mount Everest, går det frem av ei pressemelding fra Sunnmøre friluftsråd.

a) Hvor langt har hver deltaker i sommerens Stikk UT! i gjennomsnitt gått?

b) Hvor langt har Sunnmøre friluftsråd regnet at det er rundt jorda?

0.0.22 (1PH24D2)

Oversikten nedenfor er hentet fra valgresultat.no etter kommunestyrevalget høsten 2023. "Endring" viser til endring sammenliknet med forrige kommunestyrevalg, hvor pp brukes som forkortelse for prosentpoeng.

Partinavn	Oppslutning (%)	Antall stemmer	Endring (pp)
Høyre	25,9	689 952	+5,8
Ap	21,6	576 082	−3,2
FrP	11,3	302 722	+3,1
Sp	8,2	217 608	−6,2
SV	6,9	183 573	+0,8
Venstre	5,0	134 074	+1,1
MDG	4,2	112 131	+2,6
KrF	4,0	106 266	0,0
Rødt	3,5	92 900	−0,3
Andre	9,5	253 009	+1,5

a) Antall stemmeberettigede ved dette valget var 4 341 850. Hvor mange personer brukte ikke sin stemmerett?

b) Hvilket parti hadde størst prosentvis framgang siden forrige kommunestyrevalg?

0.0.23 (1PV24D2)

Fat er en enhet for volummåling av olje. 1 fat $\approx$ 158,987 liter.

I 2023 ble det i gjennomsnitt produsert 1,794 millioner fat olje på norsk sokkel hvert døgn.

a) Omtrent hvor mange liter olje ble det produsert på norsk sokkel i 2023? Skriv svaret på standardform.

b) I 2022 ble det i gjennomsnitt produsert 1,685 millioner fat hvert døgn. Hvor mange prosent steg produksjonsmengden med fra 2022 til 2023?

0.0.24 (1PH25D1)

En støvpartikkel veier omtrent 0,000000005 gram. Hvor mange støvpartikler er det i 20 gram støv?

0.0.25 (1PH25D2)
Saken under er hentet fra nrk.no.



14. april 2025 kl. 13:48

PERSONLIG ØKONOMI

Nordmenn skylder nesten 57 milliarder i betalingsanmerkninger

Nordmenns beløp i utestående betalingsanmerkninger har økt med rett over 7 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Nå skylder 229.963 nordmenn 57 milliarder kroner i betalingsanmerkninger, skriver Experian i en pressemelding.

Antallet personer som skylder penger, er om lag det samme som i fjor, og utgjør 4,8 prosent av landets befolkning over 18 år. Men hver av disse skylder altså litt mer i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsbeløpet hver av disse har i utestående betalingsanmerkninger, er rundt 250.000 kroner.

a) Vis ved regning at gjennomsnittsbeløpet NRK informerer om (250 000 kr) er riktig.

b) Omtrent hvor mange personer i Norge er over 18 år?

0.0.26 (1PV25D2)

Tabellen nedenfor viser antall registrerte tilfeller av kikhoste i Norge noen måneder i perioden januar 2023 – oktober 2024.
La x være antall måneder etter desember 2022. Det vil si at $x = 1$ tilsvarer januar 2023, $x = 3$ tilsvarer mars 2023, og så videre.

Måned	Januar 2023	Mai 2023	Oktober 2023	Februar 2024	August 2024	Oktober 2024
Tilfeller	29	93	164	284	1035	1657

a) Bruk opplysningene ovenfor til å vise at funksjonen K gitt ved

$$K(x) = 27{,}8 \cdot 1{,}2^x$$

er en god modell for antall registrerte tilfeller av kikhoste i Norge i perioden.

b) Gi en praktisk tolkning av tallet 1,2 i modellen.

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(4, K(4))$ og $(21, K(21))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

d) Hvor mange tilfeller av kikhoste vil bli registrert i Norge i mai 2025, ifølge modellen?

0.0.27 (1PV23D2)

Tabellen nedenfor viser salg av energidrikker i Norge hvert år fra 2015 til 2021.

Årstall	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Salg (tusen liter)	18 899	21 664	25 381	31 385	41 142	55 497	67 997

a) La $E(x)$ være antall energidrikker solgt x år etter 2015. Skisser grafen til E. Forklar hvorfor

$$E(x) = 17396 \cdot 1{,}248^x$$

kan være en passende modell.

b) Hva forteller tallet 1,248 i modellen?

c) I 2022 var salget av energidrikk 73 109 tusen liter. Hvor stor var økningen i salget av energidrikk i prosent fra 2021 til 2022? Vurder hvordan dette passer med modellen i oppgave a).

0.0.28 (1PH22D2)
Sofie løper på en tredemølle. Etter tre minutter står det i displayet at hun har

- brukt 32 kilokalorier (kcal) energi
- løpt 0,38 km

Anta at Sofie holder den farten som hun hadde de første tre minuttene.

a) Hvor langt kommer hun på 12 minutter?

b) Hvor mange kilokalorier bruker hun hvis hun løper i én time?

c) Hvor mange kilokalorier bruker hun per kilometer?

Sofie ønsker å øke farten slik at hun løper 2 200 m på 12 minutter.

d) Hvilken fart må Sofie ha for å nå dette målet?

0.0.29 (1PH21D2)
Energiinnholdet i matvarer blir vanligvis oppgitt i kilojoule (kJ) eller kilokalorier (kcal). Tabellen viser energiinnholdet i noen næringsstoffer.

Næringsstoff	Kilojoule (kJ) per gram	Kilokalorier (kcal) per gram
Fett	37	9
Protein	17	4
Karbohydrater	17	4

Tobias har lest at 100 g kokt egg inneholder 10,2 g fett, 12,4 g protein og 0,3 g karbohydrater. Resten av egget er vitaminer og vann, og inneholder ikke energi.

a) Hva er energiinnholdet i 100 g kokt egg? Oppgi svaret i kcal.

Tobias har funnet ut at han har et energibehov på 3000 kcal per dag. En dag spiser han to egg. Eggene veier til sammen 125 g med skall. Den spiselige delen av egg er 88 % av totalvekten til egget.

b) Hvor mange prosent av Tobias' energibehov utgjorde eggene han spiste?

0.0.30 (1PH21D2)

En dyrebestand består i dag av 500 dyr. En forsker antar at bestanden vil doble seg i løpet av de ti neste årene.

a) Sett opp en modell $L(x)$ som viser hvor mange dyr det vil være i bestanden om x år, dersom vi antar at bestanden øker lineært.

b) Sett opp en modell $E(x)$ som viser hvor mange dyr det vil være i bestanden om x år, dersom vi antar at bestanden øker eksponentielt.

Gitt funksjonen

$$F(x) = L(x) - E(x), \quad 0 \leq x \leq 13$$

c) Grafen til F har ett toppunkt. Gi en praktisk tolkning av toppunktet (du trenger ikke finne koordinatene til punktene).

d) Linja $y = 12$ skjærer grafen til F i to punkt. Gi en praktisk tolkning av disse to punktene (du trenger ikke finne koordinatene til punktene).

e) Finn verdien til $F(12)$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

0.0.31 (1PH23D1)

Hunder utvikler seg raskere enn mennesker. Når en hund er 1 år gammel, tilsvarer det 16 menneskeår. Se tabellen nedenfor.

Hundens alder	Små hunder	Store hunder	Veldig store hunder
To måneder	2 år	2 år	2 år
Fire måneder	6 år	6 år	6 år
Seks måneder	10 år	10 år	10 år
Åtte måneder	12 år	12 år	12 år
Ti måneder	14 år	14 år	14 år
1 år	16 år	16 år	16 år
1,5 år	20 år	20 år	20 år
2 år	24 år	24 år	24 år
3 år	29 år	30 år	31 år
4 år	34 år	36 år	38 år
14 år	84 år	96 år	108 år

Sondre har en hund som er 2 år gammel. Han mener funksjonen gitt ved

$$H(x) = 6x + 12$$

kan brukes som en modell for hvor mange menneskeår H en stor hund er når den er x hundeår.

a) Forklar hvordan Sondre kan ha kommet fram til dette uttrykket, og argumenter for når modellen er gyldig.

Sondre påstår at modellen han har funnet, viser at alderen til en hund er proporsjonal med alderen til et menneske.

b) Stemmer påstanden til Sondre? Argumenter for svaret ditt.

0.0.32 (1PH25D1)

De fire situasjonene under er respektivt beskrevet av fire av de ni grafene under. Knytt hver situasjon til riktig graf. Grunngi svaret ditt.


Situasjon A
En dyrebestand minker med en fast prosent hvert år.

Situasjon B
Noen personer vil leie en badstue til en fast pris og fordele kostnadene likt. Jo flere som blir med, jo lavere blir prisen per person.

Situasjon C
En fuglebestand øker tilnærmet eksponentielt i en periode. Deretter øker bestanden lineært, før den stabiliserte seg på et nivå.

Situasjon D
Tabellen viser priser for å sende pakker i Noreg.

Vekt	Pris
0–5 kg	73 kroner
5–10 kg	135 kroner
10–25 kg	240 kroner



0.0.33 (1PH21D2)

På en nettside kan man lese dette:

> Verdifallet utgjør bilens største kostnad.
>
> Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året.
>
> For en ny bil kan du vente et verdifall på 20% det første året. Deretter 14% av bruktprisen det andre året, 13% av bruktprisen det tredje året, og så videre, synkende til 10% det sjette året.
>
> Fra og med det sjette året må du regne med et verdifall på 10% årlig.

Figuren under viser et regneark som beregner den prosentvise reduksjonen av en bils verdi, sammenliknet med prisen året før, og sammenliknet med verdien på bilen som ny.

	A	B	C
1		**Prosentvis reduksjon av verdi**	
2	År	Sammenliknet med året før	Sammenliknet med verdien som ny
3	1	20%	20%
4	2	14%	31%
5	3	13%	
6	4	12%	
7	5	11%	
8	6	10%	

a) Vis utregningen som gir 31 % i celle C4.


b) Skriv formlene som skal stå i de grønne cellene. Finn verdiene som blir regnet ut fra formlene.

c) Si at en bil koster 390 000 kr som ny. Skriv formlene som som skal stå i de grønne cellene. Finn verdiene som blir regnet ut fra formlene.

	A	B	C	D	E
1		**Prosentvis reduksjon av verdi**		**Reduksjon av verdi i kroner**	
2	År	Sammenliknet med året før	Sammenliknet med verdien som ny	Sammenliknet med året før	Sammenliknet med verdien som ny
3	1	20%	20%		
4	2	14%	31%		
5	3	13%			
6	4	12%			
7	5	11%			
8	6	10%			

0.0.34 (1PH22D1)

I USA blir gallon (US gallon) brukt som måleenhet for volum. Den grafiske fremstillingen nedanfor viser samanhengen mellom gallon og liter.



a) Bestem stigingstallet til den rette linja. Gi en praktisk tolkning av dette tallet.

b) Fat er også en måleenhet for volum. Ett fat tilsvarer 42 US gallon. I 2022 er det anslått at etterspørselen av råolje vil være 100 millioner fat per dag.

Omtrent hvor mange liter tilsvarer dette per dag? Gi svaret på standardform.

0.0.35 (1PV24D2)

For fem år siden satte Gaute inn sparepengene sine på en konto med en fast rente på 3,25% per år. I dag står det litt over 105 607 kroner på kontoen.

a) Hvor mye vil det være på kontoen om fem år?

b) Hvor mye satte Gaute inn på kontoen for fem år siden?

0.0.36 (1PV26D1)

I 2026 består en fuglebestand av 20 000 individer. Sofie er forsker. Hun antar at bestanden vil minke de kommende årene. Hun har laget to modeller og skrevet programkoden nedenfor.

```
x = 0  # x er antall år etter 2026

def f(x):
    return 20000 - 300 * x

def g(x):
    return 20000 * 0.984 ** x

while f(x) >= g(x):
    x = x + 1

print("Resultat:")
print(x)
print(f(x))
print(g(x))
```

Utdata

```
10
17000
17020.83963620087
```

a) Gi en praktisk tolkning av modellene f og g.

b) Hva forteller verdiene som skrives ut når programmet kjøres?

0.0.37 (1PV23D2)


Figuren under viser et mønster for K-er dannet av sirkler.

a) Bestem hvor mange sirkler det er i henholdsvis K4, og hvor mange sirkler det er i K5.

b) Lag et skript som finner hvor mange sirkler som kreves for å lage K nummer n.

c) Lag et skript som finner hvor mange sirkler som kreves for å lage én av hver K opp til K nummer n.

d) Si vi ønsker å lage én av hver K, men kan maksimalt bruke 2000 sirkler. Hvor mange K-er kan vi lage?



0.0.38 (1PH25D1)

Gitt en pyramide med en kvadratisk grunnflate. Høyden til pyramiden har lik lengde som sidelengden til grunnflaten. Volumet til pyramiden er $9\,\mathrm{dm}^3$.


a) Finn høyden til pyramiden.

b) Avgjør om påstanden under er riktig. Grunngi svaret ditt.

"Høyde og volum er proporsjonale størrelse for denne pyramiden."

0.0.39 (1PH25D2)

Figuren under består av et rektangel med bredde x og lengde y, og en halvsirkel.



a) Vis at omkretsen O til figuren er gitt ved

$$O = 2y + x + \frac{\pi y}{2}$$

b) Vis at hvis $x = 1$, er $y \approx 4{,}7$.

c) Hva er arealet til figuren hvis $x = 1$ og $y = 4{,}7$?

Vi setter $O = 12$.

d) Finn y uttrykt ved x.

e) Lag en tabell som viser arealet A til figuren ved forskjellige verdier for x. La x ha verdiene 1, 3 og 6.

f) Lag en funksjon $A(x)$ som gir arealet til figuren med bredde x. Finn det største mulige arealet.


0.0.40 (1PV26D1)

En stålplate har form som et rektangel. Platen er 1000 mm lang, 500 mm bred og 6 mm tykk. Stål har en massetetthet på $8\,\text{g/cm}^3$.

Hvor mye veier stålplaten?

0.0.41 (1PH25D1)

Grafen til g viser sammenhengen mellom antall x timer Nora arbeider og lønnen y kroner hun får. Grafen til f viser det samme for Nils.



a) Bestem timelønnen til Nora og timelønnen til Nils.

b) En uke arbeidet Nora og Nils like mange timer. Nora tjente 720 kroner mer enn Nils. Hvor mange timer arbeidet hver av dem denne uken?

0.0.42 (1PH25D1)

I en by koster det 1200 kroner for en 30-dagersbillett med buss. Du kan ta bussen så mange ganger du ønsker i denne perioden. Siri har kjøpt en 30-dagersbillett og lurer på hva prisen per busstur blir dersom hun bruker billetten 4, 8, 20 eller 30 ganger.

a) Skriv av tabellen nedenfor og fyll inn tallene som mangler.

Antall bussturer	4	8	20	30
Pris per busstur				

b) Skisser en graf som viser sammenhengen mellom antall bussturer og prisen per busstur.

c) En enkeltbillett med buss koster 80 kroner. Finn ved regning hvor mange ganger Siri må ta bussen for at det skal lønne seg å kjøpe en 30-dagersbillett i stedet for enkeltbilletter. Skisser en grafisk løsning.

0.0.43 (1PV25D1)

Lars har spart penger i flere år. Han har nå 120 000 kroner. Pengene står på en konto i banken. Lars vil fortsette å spare og har en plan. Han har laget programmet nedenfor.

```
konto = 120000
sparebeløp = 24000
vekstfaktor = 1.058
år = 0

while konto < 1000000:
    konto = konto + sparebeløp
    konto = konto * vekstfaktor
    år = år + 1

print(år)
print(konto)
```

a) Beskriv hvordan Lars tenker å spare. Ta spesielt med hvilken innskuddsrente han forventer.

b) Hva vil verdiene som skrives ut fortelle Lars?

0.0.44 (1PH23D2)

Opplysningene nedenfor er hentet fra nrk.no

- Vi spiser omtrent 500 millioner pølser i Norge hvert år.
- 13 millioner av disse pølsene spiser vi 17. mai.
- Om vi hadde lagt alle pølsene nordmenn spiser i løpet av ett år, etter hverandre, ville vi kommet to og en halv gang rundt jorda.

a) Hvor mange pølser spiser vi i gjennomsnitt hvert sekund i Norge?

b) Hvor mange prosent av pølsene spiser vi 17. mai?

c) Jordens radius er 6378 km ved ekvator. Omtrent hvor lang har NRK regnet at en pølse er?

0.0.45 (1PV24D2)

Tabellen nedenfor viser noen av de personlige rekordene til friidrettsutøveren Jakob Ingebrigtsen.

Personlige rekorder utendørs		
Dato	**Øvelse**	**Tid**
01.09.2017	400 m	51,03
30.06.2020	800 m	1:46,44
16.07.2023	1500 m	3:27,14
16.09.2023	1 engelsk mil	3:43,73
08.09.2023	2000 m	4:43,13
17.09.2023	3000 m	7:23,63

Tidene er gitt i minutter (før kolon) og sekunder (etter kolon). For eksempel betyr 7:23,63 en tid på 7 minutter og 23,63 sekunder.

Alle løpene i tabellen er gjennomført på en bane der en runde er 400 meter lang.

a) Bestem den gjennomsnittlige rundetiden til Jakob Ingebrigtsen da han satte personlig rekord på 1500 meter.

b) Da Jakob Ingebrigtsen satte personlig rekord på 1 engelsk mil, holdt han en gjennomsnittsfart på omtrent 25,89 km/h. Vis hvordan denne opplysningen kan brukes for å avgjøre omtrent hvor mange meter det er i 1 engelsk mil.

0.0.46 (1PH23D2)
Informasjonen under er hentet fra helsenorge.no.

- Sjokolade inneholder teobromin, som er giftig for hunder.
- I norsk melkesjokolade er det ca. 1,2 mg teobromin per gram sjokolade.
- Hunder som har spist mer enn 20 mg teobromin per kg kroppsvekt, kan få kliniske tegn på forgiftning.
- Kontakt veterinær hvis hunden din har spist en giftig mengde sjokolade.

Si at en hund har spist 200 g melkesjokolade. Hva må hunden veie for at dette kan føre til tegn på forgiftning?

0.0.47 (1PV24D2 og 1TV24D2)
En kantine selger bagetter. Det viser seg at funksjonen

$$O(x) = -0{,}09x^2 + 51{,}04x - 2776{,}98$$

er en god modell for overskuddet O ved x solgte bagetter.

a) Gi en praktisk tolkning av $O(0)$.

b) Forklar hvorfor grafen til O har ett toppunkt. Gi en praktisk tolkning av toppunktet.

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(100, O(100))$ og $(200, O(200))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

d) Bestem den momentane vekstfarten når $x = 235$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får. (1T-oppgave)

0.0.48 (1PV24D2 og 1TV24D2)

Lufttrykk måles ofte i hektopascal (hPa). Lufttrykket ved havets overflate er ca. 1000 hPa. Jo høyere over havet vi befinner oss, jo lavere er lufttrykket. Når lufttrykket er lavere enn 100 hPa, vil kokepunktet for vann være lavere enn 100 °C. Se tabellen under.

Lufttrykk (hPa)	1000	500	200	80	40
Kokepunkt for vann (°C)	100	81,4	60,1	41,5	29

a) La $K(x)$ være kokepunktet for vann (i °C) når lufttrykket er x hPa. Skisser grafen til K. Argumenter for at

$$K(x) = 7{,}56 \cdot x^{0{,}38}$$

er en passende modell.

b) Lag en modell $L_1(x)$, som viser luftrykket (målt i hPa) x km over havet, ut fra denne antakelsen:

Lufttrykket minker med 12% per km over havet.

c) Lag en modell $L_2(x)$, som viser luftrykket (målt i hPa) x km over havet, ut fra denne antakelsen:

Lufttrykket halveres for hver 5,5 km over havet.

d) Egg kan ikke bli hardkokte dersom temperaturen i vannet er under 85 °C. Flytende vann vil ikke nå høyere temperatur enn koketemperaturen. Bruk én av L_1 og L_2, og anslå hvor høyt over havet det er mulig å lage hardkokte egg.

0.0.49 (1PV25D2 og 1TV25D2)
I denne oppgaven får du bruk for disse formlene:

Gitt en sylinder med radius r og høyde h.

Volumet V til sylinderen er

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Overflatearealet A til sylinderen er

$$A = \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h.$$

Isabel er industridesigner. Hun arbeider med et design på bokser med form som sylindre. Isabel lurer på hvor stor radius hun bør velge og hvor høy boksene må være, når hver boks skal ha

- volum $V = 450$ cm^3
- minst mulig overflateareal A.

a) Bruk volumformelen for å finne et uttrykk for h.

b) Lag en oversikt som den nedenfor, og fyll inn verdiene som mangler.

Radius, r (cm)	Høyde, h (cm)	Areal, A (cm^2)	Volum, V (cm^3)
2	35,8	462,6	450
4			450
6			450
8			450

Isabel ønsker å lage en modell som viser overflatearealet av ulike bokser hun kan lage ved å endre radius.

c) La $A(r)$ være overflatearealet til til en boks med radius r. Skisser grafen til A.

d) Vi skriver uttrykket til A inn i GeoGebra, og bruker kommandoen `Ekstremalpunkt(A)`. Gi en praktisk tolkning av hva vi finner.

0.0.50 (1PV26D2 og 1TV26D2)

Vipa er en kritisk truet fugleart i Norge.
I 2013 ble bestanden av viper anslått til å være omtrent 9000 par.
I 2022 var bestanden omtrent 2500 par.

År	2013	2022
Vipebestand (par)	9000	2500


Tor antar at bestanden av viper har avtatt lineært og vil fortsette å avta lineært i årene framover. Egil antar at nedgangen har vært, og fortsatt vil være, eksponentiell.
La x være antall år etter 2013.

a) Lag en modell f som viser utviklingen av vipebestanden ut fra Tors antakelser. Forklar hva modellen forteller om utviklingen.

b) Lag en modell g som viser utviklingen av vipebestanden ut fra Egils antakelser. Forklar hva modellen forteller om utviklingen.

Myndigheter og interesseorganisasjoner arbeider med å verne hekkeområdene til vipa. De håper at dette skal bidra til å stoppe nedgangen, slik at bestanden vil stabilisere seg.


Egil ønsker å lage en ny modell som tar hensyn til dette. Han lager først den eksponentielle funksjonen $p(x)$. Så lager han funksjonen $q(x)$. Uttrykket til q består av to ledd. Det éne leddet tilsvarer p og det andre er en konstant. Nedenfor ser du grafene til de to funksjonene.



c) Det er q som modellerer fuglebestanden. Hvilket antall er det Egil antar at fuglebestanden vil stabilisere seg på? Bestem de respektive uttrykkene til p og q.

0.0.51 (1PV22D2 og 1TV22D2)

Figurene under består av små klosser som settes sammen i et bestemt mønster.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Hvor mange klosser trengs for å lage figur 5?

b) Hvor mange klosser trengs til sammen for å lage én av hver av de 10 første figurene?

c) Gi en praktisk tolkning av de to tallene skriptet under printer ved kjøring.

```
totalt = 0
n = 0
klosser_i_figur_n = 0

while totalt < 10000:
    print(n)
    print(totalt)

    n = n+1
    klosser_i_figur_n = klosser_i_figur_n + n**2
    totalt = totalt + klosser_i_figur_n
```

0.0.52 (1PV22D2 og 1TV22D2)
En fabrikk har en vanntank. Vannet i tanken tømmes ut. Funksjonen $V(x)$ er gitt ved

$$V(x) = 2000 - 2000\left(1 - \frac{x}{40}\right)^2, \qquad 0 \leq x \leq 40,$$

og er en modell for mengden vann V i liter som er tømt ut av tanken x minutter etter at tømmingen startet.

a) Regn ut $V(0)$, og gi en praktisk tolkning av resultatet.

b) Regn ut vekstfarten til V.

c) Hvor lang tid vil det gå før halvparten av vannet er tømt ut av tanken?

d) Regn ut stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(0, V(0))$ og $(30, V(30))$, og gi en praktisk tolkning av resultatet.

e) Hastigheten på tømmingen, målt i antall liter per minutt, er gitt ved funksjonen

$$k(x) = -\frac{5}{2}x + 100$$

Forklar hvorfor det aldri vil tømmes over 100 liter i løpet av et minutt.

f) Vis hvordan man kan finne uttrykket til k. (1T-oppgave)

0.0.53 (1PH22D2 og 1TH22D2)
Strømmen som holder vannet i et hagebasseng varmt, blir slått av. Anta at funksjonen T gitt ved

$$T(x) = 3{,}5 + 34{,}5 \cdot 0{,}87^x \quad , \quad x \geq 0$$

kan brukes som en modell for temperaturen $T\,^\circ\text{C}$ i vannet x timer etter at strømmen blir slått av.

a) Hva er temperaturen i vannet når strømmen blir slått av?

b) Hvor lang tid vil det ta før temperaturen i vannet er under $20\,^\circ\text{C}$?

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(0, T(0))$ og $(4, T(4))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

d) Hastigheten h temperaturen synker med (målt i °C per time) er gitt ved

$$h(x) = 4{,}8 \cdot 0{,}8694^x$$

Avgjør om temperaturen i vannet noen gang vil synke med mer enn $5\,^\circ\text{C}$ i løpet av en time.

e) Gi en praktisk tolkning av tallet 3,5 i modellen.

0.0.54 (1PH22D2 og 1TH22D2)
Et gjerde som er 64 m skal bygges slik at området det inngjerder blir rektangulært. Det er også ønsket at dette området skal ha størst mulig areal.

a) Lag en funksjon $A(x)$ som beskriver arealet til området som en funksjon av rektangelets lengde x.

b) Finn nullpunktene til A.

c) Finn lengden til rektangelet som gir det største arealet.

0.0.55 (1PH23D2 og 1TH23D2)
Tabellen nedenfor viser antall personer i Norge som hadde fiske som hovedyrke noen år i perioden 1952–2022.

År	1952	1982	1992	2002	2012	2022
Antall fiskere	65 956	25 289	19 780	13 841	9 825	9 591

a) Bruk tallene fra tabellen til å skissere grafen til funksjonen $F(x)$, som gir antall fiskere x år etter 1950. Argumenter for at

$$F(x) = 66\,360 \cdot 0{,}9714^x$$

er en passende modell.

b) Hvor mange personer i Norge vil ha fiske som hovedyrke i 2050 ifølge modellen fra oppgave a)? Vurder modellens gyldighetsområde.

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(30, F(30))$ og $(70, F(70))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

0.0.56 (1PV26D2 og 1TV26D2)

Fru Hansen eier en gammel bil. Når hun kjører med en fart på x km/h, slipper bilen ut $U(x)$ gram CO_2 per kilometer, der $U(x)$ er gitt ved

$$U(x) = \frac{5400}{x} + 0{,}0074x^2 + 50 \quad , \quad 30 < x < 110$$

a) Regn ut hvor mange gram CO_2 slipper bilen ut per kilometer dersom fru Hansen kjører med en fart på 50 km/h.

b) Lag en tabell som viser bilens utslipp ved hastighetene (i km/h) 40, 65 og 90.

c) Fru Hansen kjører med en fart på 90 km/h i 20 minutter. Hvor mange gram CO_2 slipper bilen ut i løpet av disse 20 minuttene?

d) Ved å holde en viss fart, oppnår bilen sitt laveste utslipp per kilometer. Fru Hansen ønsker å finne en tilnærmet verdi for denne farten, og har skrevet programkoden under. Forklar hvordan programmet virker.

```
1 def U(x):
2     return 5400/x + 0.0074 * x ** 2 + 50
3
4 x = 30
5 while x <= 120:
6     print(x, U(x))
7     x = x + 10
```

e) Farten Fru Hansen ønsker å finne med sin kode kan finnes eksakt ved å løse likningen

$$0{,}0148x - \frac{5400}{x^2} = 0$$

Løs likningen. Hva er utslippet til bilen når den holder denne farten?


0.0.57 (1PV23D2 og 1TV23D2)
De siste årene har Lars bodd på Svalbard fra 1. februar til 1. oktober. Hvert år har han målt temperaturen utenfor huset sitt på ulike tidspunkt noen dager hver uke. Han har funnet at funksjonen T gitt ved

$$T(x) = 0{,}048x^4 - 1{,}4x^3 + 13{,}36x^2 - 45{,}8x + 35{,}2 \quad , \quad 2 \leq x \leq 10$$

er en rimelig bra modell for gjennomsnittstemperaturen $T\,^\circ\text{C}$ hvert døgn de månedene han bor på Svalbard, når han lar $x = 2$ svare til 1. februar, $x = 3$ til 1. mars, $x = 4$ til 1. april og så videre.

a) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(3, T(3))$ og $(7, T(7))$. Gi en praktisk tolkning av dette stigningstallet.

b) Lars ønsker å bruke modellen til å finne ut hvor mange døgn gjennomsnittstemperaturen er over $0\,^\circ\text{C}$. Figuren under viser hvordan han har brukt GeoGebra for å finne et svar. Forklar framgangsmåten til Lars, og gjengi svaret Lars har funnet.



c) I den samme GeoGebra-filen skriver Lars kommandoen `Ekstremalpunkt(f)`. Bruk figuren fra oppgave b) til å finne tilnærmede koordinater for to punkt som denne kommandoen gir. Gi en praktisk tolkning av punktene.

0.0.58 (1PV23D2 og 1TV23D2)

Et gjerde på 80 m skal brukes til å stenge av et rektangulært område, men på den éne siden av rektangelets bredde trengs det ikke noe gjerde. Se skisse nederst.

a) Hvor stort blir arealet hvis rektangelets lengde er 60 m?


b) Fyll inn formlene (venstre figur) og tallene (høyre figur) som mangler i de grønne rutene.

	A	B	C
1	Lengde	Bredde	Areal
2	25		=A2*F8
3	35		=A3*F9
4	45		=A4*F10
5	55		=A5*F11

	A	B	C
1	Lengde	Bredde	Areal
2	25		687.5
3	35		787.5
4	45		787.5
5	55		687.5


c) Sett opp et funksjonsuttrykk $A(x)$ som gir arealet A til området når rektangelet har bredde x meter.

d) Hvilken lengde gir størst areal?



0.0.59 (1PH23D2 og 1TH23D2)

Vi plasserer linjestykker etter hverandre, hvor neste linjestykke har 10% kortere lengde enn det forrige. Det første linjestykket har lengde 100.



a) Finn summen av lengdene til de åtte første linjestykkene i dette mønsteret.

b) Lag et program som finner summen av lengdene til de n første linjstykkene i mønsteret.

c) Hvor mange linjestykker må med i mønsteret for at summen av lengdene skal bli minst 900?

d) Hvor mange prosent øker summen av lengdene med dersom vi øker antall linjestykker i figuren fra 50 til 100?

0.0.60 (1PH22D2 og 1TH22D2)
Et klassisk eksperiment i naturfag er å måle svingetiden til en pendel. En kule festes da i en snor, trekkes litt til siden, og slippes. Kulen vil da svinge over til den andre siden, og så svinge tilbake til utgangspunktet. Tiden kulen bruker på dette kalles *svingetiden* til pendelen. Så lenge kulen trekkes bare litt til siden, kan svingetiden tilnærmet beskrives som en funksjon av snorlengden.

En klasse utførte et forsøk med pendler med forskjellige snorlengder, og fikk disse målingene:

Snorlengde (meter)	0,1	0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6
Svingetid (sekund)	0,69	1,17	1,44	1,82	2,08	2,27	2,53

a) Bruk tallene fra tabellen til å skissere grafen til $S(x)$, som gir svingetiden (i sekunder) ved snorlengde x. Argumenter for at

$$S(x) = 2{,}03x^{0{,}47}$$

kan være en passende modell.

Formelen


$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

kan brukes for å regne ut svingetiden T sekunder til en pendel, når vi ser bort fra friksjon og luftmotstand, og når vi antar små utslag. L er snorlengden gitt i meter, og $g \approx 9{,}81\,\text{m/s}^2$ er tyngdeakselerasjonen på jorden.


b) Vis at $T \approx 2\sqrt{L}$.

c) Sammenlign modellen fra oppgave a) med modellen fra oppgave b).

0.0.61 (1TV23D2 og 1TH23D2)
Finn arealet til firkanten.



(a)




(b)

0.0.62 (1TH24D2)

a) Finn arealet til firkanten når du i tillegg til målene på figuren får vite at $AD = 6$, $BC = 10$ og $AC = 16{,}4$.

b) Finn arealet til firkanten når du i tillegg til målene på figuren får vite at at $\angle A = 62{,}5°$, $\angle C = 38{,}3°$, $\angle ABD = 45{,}5°$ og $\angle CBD = 85{,}5°$.



0.0.63 (1TV24D2)


Når en lysstråle går fra luft til vann, skifter den retning. Sammen med linja som står vinkelrett på vannoverflaten, danner lysstrålen vinkelen u i lufta og vinkelen v i vannet. Sammenhengen mellom u og v er tilnærmet gitt ved

$$\sin u = 1{,}33 \sin v$$

a) Finn u når $v = 39°$.

b) Hvilket vinkelmål vil v nærme seg hvis u nærmer seg $90°$?


c) Kan u og v være like store? Grunngi svaret ditt.



0.0.64 (1TV26D2)


a) Finn de respektive lengdene til AB, DC og AC.

b) Finn arealet til $\triangle ABD$.



0.0.65 (1TV25D2)

Under ser du tre figurer. Figurene er satt sammen av små grønne kvadrater. Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Finn et uttrykk $F(x)$ for antall kvadrater i Figur n.

b) Lag et program som beregner og skriver ut hvor mange kvadrater det vil være i hver av de 20 første figurene.

Tenk deg at du har 1 000 000 små kvadrater. Du starter med å lage figur 1 og fortsetter så med å lage figur 2, figur 3 osv.

c) Lag et program som du kan bruke for å finne ut hvor mange figurer du kan lage, og hvor mange små kvadrater du har igjen når du har laget alle figurene.

0.0.66 (2PV22D1)

Ada har skrevet programkoden nedenfor.

Hva finner Ada ved å kjøre dette programmet?

```
beløp = 2000
vekstfaktor = 1.02
innskudd = 20000
år = 0

while beløp < 500000:
  beløp = beløp + innskudd
  beløp = beløp * vekstfaktor
  år = år + 1

print(år)
print(beløp)
```

0.0.67 (2PV22D2)

I en bydel er det i dag 30 000 innbyggere. Anta at innbyggertallet vil øke med en fast prosent hvert år, og at det i løpet av 10 år vil være doblet.

a) Finn uttrykket til en modell f som beskriver situasjonen.

b) Skisser grafen til f, og marker punktet $(5, f(5))$. Forklar hva koordinatene til dette punktet forteller om situasjonen.

0.0.68 (2PH22D1)

I programmet under kan `a`, `b` og `c` endres for å undersøke om en trekant har en spesifikk egenskap. Fullfør setningen som printes.

```
# Velger verdier for a, b og c

a = 4
b = 5
c = 3

if a ** 2 + b ** 2 == c ** 2 or a ** 2 + c ** 2 == b
    ** 2 or b ** 2 + c ** 2 == a ** 2:
    print("Trekanten er ...")
```

0.0.69 (2PV23D2)

Sofie har tatt opp et forbrukslån på 100 000 kroner. Hun skal betale ned på lånet hver måned, og terminbeløpet skal være 6378 kroner. Hver måned skal hun betale 2 % av resterende gjeld i renter. Sofie vil ha en nedbetalingsplan for lånet og har laget programmet nedenfor.

```
1  # Definerer variabler
2  restlån = 100000
3  terminbeløp = 6378
4  rentefot = 2
5
6  # Overskrifter
7  print("Måned            Terminbeløp     Renter
       Avdrag           Restlån")
8
9  for måned in range(1, 5):
10
11     renter = 0
12     avdrag = 0
13     restlån = 0
14
15 # Skriver ut i fem kolonner ved å bruke tabulatorer
       sep = "\t\t"
16 # Runder av beløpene til to desimaler ved å bruke
       round
17     print(måned,
18     round(terminbeløp, 2),
19     round(renter, 2),
20     round(avdrag, 2),
21     round(restlån, 2), sep = "\t\t")
```

Dette er resultatet når programmet kjøres:

Måned	Terminbeløp	Renter	Avdrag	Restlån
1	6378	0	0	0
2	6378	0	0	0
3	6378	0	0	0
4	6378	0	0	0

a) Skriv de respektive formlene som må settes inn i stedet for `0` i linje 11, 12 og 13, slik at riktige verdier for renter, avdrag og gjeld printes.

b) Finn renter, avdrag og restlån den første måneden.

0.0.70 (2PH23D1)

Selma er på ferie og vil bruke buss for å komme seg rundt i området. Hun vurderer om hun skal kjøpe en enkeltbillett for hver reise eller et fleksikort med 20 reiser.

- Hver enkeltbillett koster 25 kroner.
- Et fleksikort med 20 reiser koster 415 kroner.

a) Hvor mange reiser må hun ta med bussen for at det skal lønne seg å kjøpe et fleksikort med 20 reiser?

b) Tenk deg at Selma kjøper et fleksikort med 20 reiser og bruker alle reisene. Hvor mange prosent sparer hun sammenliknet med å kjøpe 20 enkeltbilletter?

0.0.71 (2PH23D2)

Adam har tatt opp et lån på 2 500 000 kroner for å kjøpe bolig. Han skal betale tilbake lånet i månedlige terminer. Renten er 0,33 % per måned. I tillegg må han betale et gebyr på 50 kroner per termin. Terminbeløpet skal være 13 385 kroner. Lag en oversikt som viser hvor stort lånet hans vil være måned for måned de to første årene.

0.0.72 (2PH25D2)

I februar 2025 åpnet Alex en liten nettbutikk. Tabellen nedenfor viser omsetningen de første fem månedene etter at nettbutikken åpnet.

Måned	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Omsetning (kroner)	1267	1431	1619	1788	2032

a) La $f(x)$ være antall kroner i omsetning x måneder etter februar. Skisser grafen til f, og argumenter for at

$$f(x) = 1271{,}1 \cdot 1{,}124^x$$

er en passende modell.

b) Omtrent hvor mange prosent øker omsetningen med per måned, ifølge modellen?

Alex har som mål å omsette for 20 000 kroner i løpet av en måned.

c) Når kommer Alex til å nå målet, ifølge modellen?

0.0.73 (2PH25D2)
Tabellen nedenfor viser innbyggertallet i de ti største tettstedene i Norge i 2024.

Nr.	Tettsted	Innbyggertall
1	Oslo	1 098 061
2	Bergen	272 125
3	Stavanger/Sandnes	239 055
4	Trondheim	198 777
5	Drammen	124 540
6	Fredrikstad/Sarpsborg	121 679
7	Porsgrunn/Skien	96 695
8	Kristiansand	67 372
9	Tønsberg	55 939
10	Ålesund	55 684

a) Bestem medianen, gjennomsnittet, standardavviket og variasjonsbredden for innbyggertallet i de ti største tettstedene i Norge.

b) Forklar hvorfor det er en forholdsvis stor differanse mellom gjennomsnittet og medianen.

Standardavviket for de ti største tettstedene i Norge er 297 326. Gjennomsnittet, medianen og standardavviket for de ti største tettstedene i Danmark er gitt i tabellen nedenfor.

Gjennomsnitt	Median	Standardavvik
235 549	67 832	388 000

c) Hva kan du si om folketallet i de danske tettstedene sammenliknet med de norske ut fra tallene i tabellen og resultatene fra oppgave a)?

0.0.74 (2PH25D2)

Tabellen nedenfor viser hvor mange minutter nordmenn i to ulike aldersgrupper brukte på internett en gjennomsnittsdag i årene 2021 til 2024.

Aldersgruppe	2021	2022	2023	2024
9 – 15 år	198	256	273	245
65 – 79 år	77	111	109	127

a) Skisser et linjediagram som presenterer tabellen.

b) For hver aldersgruppe, lag en oversikt over den årvise prosentvise endringen i tid brukt på internett. Hvilken aldersgruppe hadde den største årvise økningen? Er det noen av aldersgruppene som har hatt en årvis nedgang? Grunngi svarene.

0.0.75 (2PH25D2)

Tabellen nedenfor viser aldersfordelingen i Åseral kommune i 2024.

Alder (år)	Antall personer
$[0, 18\rangle$	188
$[18, 50\rangle$	347
$[50, 67\rangle$	237
$[67, 80\rangle$	103
$[80, 90\rangle$	33
$[90, 100]$	15

a) Hvilke antagelser må du gjøre for å kunne bruke tabellen til å bestemme ulike sentralmål for innbyggerne i Åseral kommune i 2024?

b) Bestem gjennomsnittalderen for innbyggerne i Åseral kommune i 2024.

c) Hvor mange prosent av befolkningen i Åseral kommune var eldre enn gjennomsnittalderen i kommunen i 2024?

0.0.76 (2PH24D2)
En bedrift produserer iste. Funksjonen F gitt ved

$$F(x) = 620 \cdot 1{,}045^x$$

er en modell som viser hvor mange flasker av isteen bedriften regner med å selge x måneder etter desember 2024.

a) Hvor mange flasker iste regner bedriften med å selge i desember 2025 ifølge modellen?

b) Likningen $F(x) = 2000$ har én løsning. Gi en praktisk tolkning av denne løsningen.

c) Hvor mange prosent vil salget øke med fra desember 2024 til desember 2026 ifølge modellen?

0.0.77 (2PH24D2)
Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig månedslønn for arbeidstakere i Norge i perioden 2015–2019. Tabellen viser også konsumprisindeksen (KPI) de samme årene.

År	2015	2017	2019
Lønn (kr)	42 580	44 660	47 720
KPI	100	105,5	110,8

Lag en oversikt som viser reallønnen for hvert år, og som viser endringen i reallønn sammenlignet med reallønnen i 2015.

0.0.78 (2PV25D1)

Et av FNs bærekraftsmål er å redusere matsvinn. Sofie har lest at en familie på fire kaster ca. 160 kg mat hvert år. Hun har laget programmet nedenfor.

```
matsvinn = 160
mål = matsvinn / 2
vf = 0.87
år = 2025

while matsvinn > mål:
    matsvinn = matsvinn * vf
    år = år + 1

print(år)
print(matsvinn)
```

Utdata

```
2030
79.74734731199999
```

Forklar hva Sofie har funnet ut, og hvilke antakelser hun har tatt.

0.0.79 (2PV25D2)

Ledelsen ved en bedrift ønsker å redusere utslippet av miljøskadelige stoffer de neste årene. I dag har bedriften to produksjonsprosesser. Utslippet fra disse er følgende:

- Den første prosessen slipper ut 5000 tonn årlig.
- Den andre prosessen slipper ut 1000 tonn årlig.

Bedriften mener at funksjonen

$$U(x) = 5000 \cdot 0{,}95^x + 1000$$

er en god modell for det årlige utslippet U (i tonn), x år fra i dag.

a) Forklar hva modellen sier om bedriftens plan for å redusere utslippene.

b) Hvor stort er det årlige utslippet etter 10 år ifølge modellen?

c) Med hvor mange prosent er det årlige utslippet redusert etter 10 år, ifølge modellen?

d) Bestem den gjennomsnittlige vekstfarten til U på intervallet $0 \leq x \leq 30$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

e) Ifølge modellen, hva er det laveste årlige utslippet bedriften kan ha?

f) En ansatt i bedriften har skrevet koden under. Hva ønsker den ansatte å finne ut?

```
def U(x):
    return 5000 * 0.95 ** x + 1000

print("x", "U(x)")
x = 0

while U(x) > 3000:
    print(x, U(x))
    x = x + 1
```

0.0.80 (2PV25D2)
En fuglebestand i et område er blitt halvert i løpet av de fem siste årene. I dag er det 12 000 fugler i bestanden. Forskere mener bestanden vil fortsette å bli halvert hvert femte år framover.

a) Vis at funksjonen F gitt ved

$$F(x) = 12\,000 \cdot 0{,}87^x$$

er en god modell for antallet fugler i bestanden etter x år.

b) Skisser grafen til F for $0 \leq x \leq 20$.

c) Hvor stor vil bestanden være etter 7 år ifølge modellen?

d) Hvor mange år vil det gå før bestanden er redusert med 35 % ifølge modellen?

0.0.81 (2PH25D2)
Eva og Per Ivar skal legge grus på en sti fra parkeringsplassen og opp til hytta. Stien er 25 m lang og 60 cm bred. De vil legge et 75 mm tykt lag med grus på stien.

a) Hvor mange kubikkmeter grus må de bestille?

b) Når de kommer til hytta, ligger grusen de har bestilt i en kjegleformet haug på parkeringsplassen. Kjeglen har en diameter på 2,5 m og er 1,0 m høy.

Avgjør om de har fått levert nok grus.

0.0.82 (2PV26D1)

Hva forteller verdien som skrives ut når programmet under kjøres?

```
L = [2, 4, 8, 16, 20]  # L er en liste med tall
a = len(L)             # Antall tall i listen L
s = sum(L)             # Summen av tallene i listen L
g = s / a

print("Resultat:")
print(g)
```

Utdata

```
Resultat:
10.0
```

0.0.83 (2PV25D2)

Tabellen under viser konsumprisindeksen for oktober måned i perioden 2021 – 2024.

ÅR	2021	2022	2023	2024
KPI for oktober	117,2	126,0	131,1	134,5

Felix leier en leilighet. I oktober 2023 gikk husleien opp og ble satt til 8500 kroner per måned.

Husleieloven sier at ny leie kan fastsettes én gang i året, tidligst ett år etter forrige leiefastsetting. Endringen kan ikke overstige endringen i konsumprisindeksen (KPI).

I oktober 2024 fikk Felix varsel fra huseieren om at leien igjen skulle settes opp, og at ny pris ville bli 9000 kroner per måned.

a) Avgjør om huseieren hadde lov til å sette opp leien til 9000 kroner per måned på dette tidspunktet.

b) Lag en oversikt som viser hvor mange prosent konsumprisen økte med per år fra oktober 2021 til oktober 2024.

c) For år etter 2024, anta at den årlige prosentvise økningen i KPI vil være den samme som den du fant fra 2023 til 2024 i oppgave b). Ta utgangspunkt i at Felix betalte den høyeste leien loven tillater i oktober 2024. Finn hva Felix betaler i husleie i oktober 2026 hvis leien følger konsumprisindeksen.

0.0.84 (2PH23D2)

Nedenfor ser du en tabell som viser antall helsefagarbeidere i Norge i perioden 2015–2022, fordelt på kjønn

År	**Menn**	**Kvinner**
2015	2 232	17 493
2018	3 957	27 327
2021	6 447	37 357

a) Skisser et linjediagram som presenterer datasettet.

b) Lag et linjediagram som viser hvor stor prosentdel menn utgjorde av antall helsefagarbeidere for hvert år i perioden.

c) Kan man si at linjediagrammet fra b) også viser hvor stor prosentandel kvinner utgjorde av antall helsefagarbeidere? Grunngi svaret ditt.

0.0.85 (2PV24D2)

Tuva har en profil på et sosialt medium. Tabellen nedenfor viser hvor mange følgere hun har hatt de siste seks månedene.

Måned	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April
Følgere	5335	7035	9467	12 780	17 208	24 008

a) Tuva har laget en modell som viser at antallet følgere har økt med ca. 35 % hver måned i perioden november 2023–april 2024. La F være antall følgere x måneder etter november 2023. Foreslå et funksjonsuttrykk for $F(x)$.

Tuva har som mål at økningen i antall følgere ikke skal fortsette å være på 35 % etter april 2024, men øke med 5 prosentpoeng hver måned.

b) Vis at antall følgere vil være 33 611 i mai og 48 736 i juni dersom Tuva klarer å nå målet sitt for disse månedene.

c) Hvor mange prosent flere følgere vil Tuva ha i august 2024 dersom hun klarer å nå det nye målet sitt for hver måned, sammenliknet med om økningen fortsetter å være på 35 % hver måned?

0.0.86 (2PH23D2)

I 1990 var Norges klimagassutslipp på 51,3 millioner tonn CO_2-ekvivalenter. I 2022 var Norges klimagassutslipp på 48,9 millioner tonn CO_2-ekvivalenter. Norske myndigheter har satt som mål at klimagassutslippet skal reduseres med 55 % innen 2030, sammenliknet med hva utslippet var i 1990.

Anta at utslippet reduseres med en fast prosent hvert år etter 2022. Lag en modell som viser hvor mange prosent den årlige reduksjonen må være for å nå målet i 2030.


a) Lag en modell $U(x)$ som gir antall CO_2-ekvivalenter x år etter 2022, og som når utslipssmålet for 2030. Hva er den årlige, prosentvise reduksjonen i utslipp?

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Da må klimagassutslippet reduseres med $90-95$ % sammenliknet med utslippet i 1990.

b) Bruk modellen du fant i oppgave a), og vurder den opp mot opplysningene om målet for klimagassutslipp i 2050.

0.0.87 (2PV24D2)

Histogrammet nedenfor viser hvor mange minutter elevene ved en skole brukte på lekser i løpet av en dag.



Under antakelsen om lik fordeling, argumenter for at hver av de fire utsagnene nedenfor er riktig.

1. 80 elever brukte mindre enn 40 minutter på lekser denne ettermiddagen.
2. Den relative frekvensen for 100–150 minutter brukt på lekser er $\frac{1}{5}$.
3. Elevene som brukte mindre enn 60 minutter på leksene, brukte i gjennomsnitt 38 minutter.
4. For elevene som brukte mindre enn 60 minutter på leksene, er medianen for antall minutter høyere enn gjennomsnittet for antall minutter.

0.0.88 (2PH24D2)

Tabellen nedenfor viser hvor mange timer menn og kvinner brukte på ulike aktiviteter en gjennomsnittsdag i 1970, i 1990 og i 2010.

	Menn			Kvinner		
År	1970	1990	2010	1970	1990	2010
Inntektsgivende arbeid	5,48	4,50	4,17	1,93	2,80	3,02
Husholdsarbeid	2,22	2,60	3,00	5,92	4,37	3,83
Utdanning	0,38	0,48	0,45	0,28	0,55	0,47

a) Skisser et linjediagram som viser utviklingen i antall timer menn og kvinner (hver for seg) har brukt på inntektsgivende arbeid.

b) La oss kalle summen av tid brukt på de tre aktivitetene for totaltiden. Lag et linjediagram som viser utviklingen av hvor stor prosentdel av sin totaltid menn og kvinner (hver for seg) har brukt på husholdsarbeid.

c) For menn og kvinner hver for seg, finn den prosentvise endringen i tid brukt på utdanning fra 1970 til 1990, og fra 1990 til 2010.

0.0.89 (2PV26D2)

Tabelle A nedenfor viser resultater fra en undersøkelse utført både i 2019 og i 2025. Tabell B viser resultater fra en undersøkelse utført i 2025. (*Merk*: Oppgaven fortsetter på neste side).


Tabell A: "Hva er din kilde til dagens første nyheter?"


Kilde	2019	2025
Smarttelefon	32%	50%
Radio	19%	14%
PC	15%	12%
TV	13%	11%
Nettbrett	6%	5%
Papiravis	7%	2%
Ingen av disse	4%	4%
Vet ikke	4%	2%


Tabell B: "Hvor ofte unngår du å se på nyheter?"

Svar	2025
Aldri	37%
En gang iblant	29%
Noen ganger	23%
Ofte	7%
Vet ikke	4%

a) Foreslå passende titler og (eventuelt) aksetitler på de tre følgende diagrammene. Bestem også hva som bør stå i stedet for 'Serie A' og 'Serie B' i det øverste diagrammet.







b) Av Tabell A, hvilken kilde til nyheter har hatt størst prosentvis nedgang fra 2019 til 2025. Grunngi svaret ditt.

0.0.90 (2PV26D2)

Jens tar opp et forbrukslån på 75 000 kroner.
Han skal betale tilbake lånet med månedlige terminer.
Rentesats: 0,975 % per måned.
Terminbeløp: 3520 kroner per måned.

Jens har skrevet regnearket under. Han ønsker å utnytte bruk av formler for å lage en oversikt over hver termin. Skriv formlene som skal stå i de grønne cellene.

	A	B	C	D	E
1	Gjeld	75000			
2					
3	Termin	Terminbeløp	Avdrag	Renter	Gjeld
4	1	3520			
5	2	3520			

0.0.91 (2PV26D1)

Johan har laget en plan for uttak av penger fra en konto. Han har laget programmet under som viser planen.

```
konto = 1500000
uttak = 120000
vf = 1.056
år = 0

while konto >= 120000:
    konto = konto * vf - uttak
    år = år + 1

print("Resultat:")
print(år)
print(konto)
```

Utdata

```
Resultat:
22
11183.702579092205
```

a) Hva forteller programmet om planen til Johan?

b) Hva forteller verdiene som skrives ut når programmet kjøres?

0.0.92 (R1V22D1)

En elev har skrevet følgende kode:

```
def f(x):
    return x / (1 + x**2)  # Definerer funksjonen f(x) = x/(1+x^2)

x = 0
h = 0.001

while f(x) <= f(x + h):
    x = x + h

print(x)
```

a) Forklar hva som skjer når koden kjøres. Hva ønsker eleven å finne en tilnærming av?

b) Finn ved regning verdien som eleven ønsker å finne.

0.0.93 (R1V23D1)


En elev har fått følgende oppgave:

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = (x^2 - 9)^4 \qquad , \qquad x \in (0, 3)$$

Et rektangel R har hjørne i $(0, 0)$, $(t, 0)$, $(t, f(t))$ og $(0, f(t))$.

Bestem den verdien av t som gjør at R har størst areal.



For å løse oppgaven har eleven lagd følgende program:

```
def A(x):
  return x*(x**2-9)**4

t = 0
d = 0.01

while A(t) < A(t+d):
  t = t + d

print(t)
```

a) Forklar strategien eleven har brukt.

b) Løs oppgaven eleven har fått.

0.0.94 (R1V22D2)
Ifølge Newtons avkjølingslov vil temperaturen T til et objekt etter t minutter være gitt ved

$$\ln(T - T_0) = -k \cdot t + r$$

hvor T_0 er romtemperaturen, og der k og r er konstanter.
I et rom med temperatur 22°C setter vi en kopp med kaffe. Ved tidspunktet $t = 0$ er temperaturen i kaffen 82°C. Etter 2 minutter er temperaturen 66°C.

Hvor lang tid tar det før temperaturen i kaffen er mindre enn 40°C?

0.0.95 (R1V22D2)
Båten til en pirat kjører med konstant fart. Posisjonen $\vec{r}_1$ til båten etter t timer er

$$\vec{r}_1(t) = [2 + 24t, 4 + 20t]$$

Enhetene langs aksene er kilometer.

a) Hvor stor er banefarten til båten?

Politiet ønsker å stoppe piraten. Samtidig som piraten er i punktet $(2, 4)$, starter en politibåt sin jakt. Politibåten starter i punktet $(0, 10)$ og holder konstant fart langs en rett linje. Posisjonen $\vec{r}_2$ til politibåten er

$$\vec{r}_2(t) = [26t, 10 - 22t]$$

b) Undersøk om politiet vil møte piraten.

En annen politibåt starter også i $(0, 10)$. Denne båten holder også konstant fart.

c) Hvor stor må banefarten til denne båten være dersom de skal treffe piraten i punktet $(8, 9)$?

0.0.96 (R1H22D1)

En elev har skrevet følgende kode:

```
def f(x):
    return (6*x - 3)/(x - 1)     # Definerer funksjonen
    f(x) = (6x-3)/(x-1)

h = 0.00001

def Df(x):
    return (f(x + h) - f(x))/h

a = 1.5                          # En startverdi
while Df(a) < -3:
    a = a + 0.001

b = f(a) - Df(a)*a       # Regner ut konstantleddet

print("y = -3x +", b)
```

a) Forklar hva uttrykket som printes beskriver.

b) Eleven finner en tilnærming til b. Finn den eksakte verdien til b.

0.0.97 (R1H22D2)

Tabellen under viser antall gigawattimer (GWH) produsert i Norge noen utvalgte år.

År	1950	1960	1970	1981	1990	2000	2012	2020
GWh	16924	31121	57606	93397	121848	142816	147716	154197

a) La $P(t)$ være antall gigawatttimer produsert t år etter 1950. Skisser grafen til P, og argumenter for at

$$P(t) = f(t) = \frac{157303}{1 + 9{,}61\, e^{-0{,}09t}}$$

er en passende modell.

b) Bruk tallene fra tabellen til å lage en logistisk modell g som viser oss Norges energiproduksjon x år etter 1950

c) I hvilket år økte produksjonen raskest ifølge modellen?

0.0.98 (R1H22D2)

Når du bruker blitsen på et fotokamera, vil batteriet lade den opp igjen. Ladningen Q i blitsen t sekunder etter at den går av, er gitt ved

$$Q(t) = Q_0\left(1 - e^{-2.3t}\right) \quad , \quad t \geq 0$$

der Q_0 er den maksimale ladningen.

a) Bestem den omvendte funksjonen til Q.

b) Beregn hvor lang tid det tar før blitsen har nådd 90 % av den maksimale ladningen.

0.0.99 (R1V23D2)

Tabellen nedenfor viser timelønnen til en yrkesgruppe i 2008 og i 2022. 2008 – 2022.

Årstall	2008	2022
Timelønn	272,55	340,10

a) Anta at timelønnen har økt med en fast prosentdel hvert år fra 2008 og frem til 2022. Bestem denne prosentvise økningen.

b) La $T(x)$ være timelønnen x år etter 2008. Anta det samme som i oppgave a), og finn et passende funksjonsuttrykk for T.

Per og Amalie hadde begge en timelønn på 272,55 kroner i 2008. Per har hatt en lønnsutvikling i samsvar med modellen fra oppgave b), mens Amalies lønn har steget med 2,3 prosent per år. De har begge jobbet 1700 timer per år.

c) Bestem den samlede lønnen til Amalie i årene 2008 til 2022. Bestem også den samlede lønnen til Per i disse årene.

d) Fagforeningen til Per krever at han i 2025 skal ha samme timelønn som Amalie. Hvor mange prosent må lønnen til Per gå opp hvert år dersom dette kravet skal innfris? (Med lønnen i 2022 som utgangspunkt.)

0.0.100 (R1V23D2)

Sammenhengen mellom lydstyrken L (målt i dB) og lydintensiteten I (målt i $\mathrm{W/m^2}$) er gitt ved

$$L = 120 + 10 \cdot \lg I$$

Menneskets øre har en smertegrense for lydstyrke som ligger omkring 130 dB.

a) Bestem lydintensiteten når lydstyrken er 130 dB.

b) Hvor mange prosent øker lydintensiteten med dersom lydstyrken øker med 2 dB?

Dersom effekten til lyden som sendes ut fra en lydkilde er E, vil lydintensiteten I på en avstand r (målt i m) fra denne lydkilden være

$$I = \frac{E}{4\pi r^2}$$

Lydstyrken fra et fly er 140 dB dersom du er 50 m fra flyet.

c) Bestem den minste avstanden til dette flyet der lydstyrken er lavere enn 130 dB.

0.0.101 (R1H23D2)

Tabellen nedenfor viser konsentrasjonen K (i millimol per liter (mmol/L)) av et stoff t sekunder etter at en kjemisk reaksjon startet. Når det har gått lang tid, vil konsentrasjonen av stoffet stabilisere seg på 2,5 mmol/L. Tabellen viser derfor også konsentrasjonen fratrukket 2,5 mmol/L.

t (s)	0	10	20	30	40	50	60
K (mmol/L)	0	0,28	0,53	0,76	0,95	1,13	1,28
$K - 2{,}5$ (mmol/L)	−2,5	−2,22	−1,97	−1,74	−1,55	−1,37	−1,22

a) Skisser grafen til K. Argumenter for at

$$K(t) = 2{,}5 - 2{,}5 \cdot 0{,}99^t$$

er en passende modell.

b) Uttrykket til K er funnet ved å utføre regresjon med en potensfunksjon på tallene fra tabellen. Forklar hvorfor det da er brukt $K - 2{,}5$ som y-verdier.

c) Ifølge modellen, hvor lang tid vil det ta før konsentrasjonen er 2,0 mmol/L?

d) Ifølge modellen, hvor lang tid vil det ta før konsentrasjonen øker med mindre enn 0,001 mmol/L per sekund?

0.0.102 (R1D2H23)

Du skal lage en kasse uten lokk. Den skal ha form som et rett prisme. Grunnflaten i kassen skal være kvadratisk. For at vekten ikke skal bli for stor, kan ikke det samlede arealet av platene som brukes til å lage kassen, være mer enn 120 dm^2.

a) Hva er det største volumet kassen kan få dersom sidene i bunnen skal være 5 dm?

b) Hva er det maksimale volumet kassen kan få?

c) Du skal lage en slik kasse som rommer 80 dm^3. Hva er det minste samlede arealet platene kan ha?

0.0.103 (R1H25D2)
En ishockeybane er 60 m lang og 30 m bred. Vi plasserer et koordinatsystem slik at origo er midt på banen. En hockeyspiller sender av gårde en puck. Vektorfunksjonen

$$\vec{r}(t) = \left[8(e^{-t} - t), 5(e^{-t} - t)\right]$$

gir puckens posisjon t sekunder etter at den ble sendt av gårde. Denne vektorfunksjonen gir puckens posisjon helt til den treffer vantet (vegg på banen).

a) Hvilken fart hadde pucken idet den ble sendt av gårde?

b) Hvor lang tid gikk det før pucken traff vantet?

En annen hockeyspiller var i posisjonen $P(-18, 11)$ da pucken ble sendt av gårde. Spilleren hadde konstant fart $\vec{v} = [3, -7]$.

c) Begrunn at denne spilleren ikke ble truffet av pucken.

0.0.104 (R1V24D2)
En influensaepidemi bryter ut på en videregående skole med 1 000 elever. I starten er det få smittede, men antallet øker raskt. Antallet smittede elever $S(t)$ etter t dager er tilnærmet gitt ved

$$S(t) = \frac{300}{1 + 28e^{-0,3t}}$$

a) Hvor lang tid tar det før 100 elever er smittet?

b) På hvilket tidspunkt blir flest elever smittet, og hvor raskt sprer smitten seg da?

c) Undersøk om S har asymptoter, og forklar hvilken praktisk tolkning asymptotene eventuelt har.

0.0.105 (R1V24D2)

To biler A og B kjører på hver sin vei. Posisjonen til bil A er gitt ved $\vec{r}_A$, og posisjonen til bil B er gitt ved $\vec{r}_B$. Videre er

$$\vec{r}_A(t) = \left[\tfrac{1}{2}(t-4),\, t\right], \qquad \vec{r}_B(t) = \left[\tfrac{1}{2}t,\, \tfrac{3}{2}\left(t - \tfrac{1}{5}\right)\right]$$

der t er tiden målt i minutter, og avstander er målt i kilometer.

a) Bestem avstanden i luftlinje mellom bilene etter 1 minutt.

b) Én av veiene er en motorvei, og den andre er en vei med lavere fartsgrense. Argumenter for hvilken av bilene som kjører på motorveien.

c) Veiene krysser hverandre i et veikryss. Avgjør hvilken av bilene som kommer til veikrysset først.

0.0.106 (R1H24D1)

En elev har skrevet koden.

```
def O(x):
    return -0.1*x**2 + 2000*x - 50000

x = 0

while O(x + 1) > O(x):
    x = x + 1

print(x)
```

a) Beskriv hvilken x-verdi eleven ønsker å finne.

b) Finn denne x-verdien ved regning.

0.0.107 (R1H24D2)

Et gammelt vannreservoar lekker vann. Mengden vann V (målt i liter) i reservoaret er gitt ved

$$V(t) = 10000 \cdot e^{-0{,}07t} + 500$$

der t er antall timer etter at lekkasjen startet.

a) Hvor lang tid vil det gå før vannmengden er halvert.

b) Bestem $V'(12)$ og $V''(12)$, og gi en praktisk tolkning av svarene.

c) Undersøk om V har asymptoter, og gi i så fall en praktisk tolkning av disse.

0.0.108 (R1H24D2)

Forskere har registrert en ny fiskeart i en innsjø. I tabellen nedenfor ser du hvor mange fisk av arten det var i innsjøen noen måneder etter at arten først ble registrert.

Mnd. etter første registrering	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Antall tusen fisk	1	2,5	5,5	9	14	22	32	45	60

Forskerene ønsker å lage funksjon $A(x)$ som gir antall tusen fisk x måneder etter første registrering. Ved bruk av regresjon har de funnet at både en potensfunksjon og en logisitisk funksjon modellerer tallene fra tabellen godt.

Argumenter for om forskerene bør bruke potensfunksjonen eller den logistiske funksjonen som modell for hvordan fiskebestanden vil utvikle seg mange måneder frem i tid.

0.0.109 (R1H24D2)
To småfugler er ute og flyr. Posisjonen til de to fuglene er respektivt gitt ved

$$\vec{r}_1(t) = [-10 + 6t, 35 - 3t\,] \quad , \quad \vec{r}_2(t) = [2 + 5t, 4t\,].$$

Tiden t er målt i sekunder, og enhetene langs aksene er målt i meter.

a) Hvor fort flyr hver av de to småfuglene?

b) Hvor stor er avstanden mellom småfuglene når $t = 0$?

c) På hvilket tidspunkt er småfuglene nærmest hverandre, og hvor langt unna hverandre er de da?

En rovfugl starter å jage småfuglene ved tidspunktet $t = 0$. Posisjonen til rovfuglen de neste 6 sekundene er gitt ved

$$\vec{r}_A(t) = [7t - 10, 2t^2 - 6t + 5].$$

d) Avgjør om rovfuglen greier å fange noen av småfuglene (vi anser en småfugl som fanget hvis den har hatt samme posisjon som rovfuglen til samme tid).

0.0.110 (R1V25D2)

Teknologiselskapet PowBat skal lansere en ny batteriteknologi i en by med 3 millioner husstander. PowBat regner med at antallet husstander som har batteriet t uker etter lanseringen, vil følge modellen S gitt ved

$$S(t) = \frac{2\,500\,000}{1 + 2500e^{-0{,}08t}}$$

a) Hvor lang tid vil det ta før halvparten av husstandene i byen har batteriet, ifølge modellen?

b) Bestem $S'(52)$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

Det viser seg at konkurrenten BA3 planlegger å lansere et batteri med tilsvarende teknologi samtidig. Dette vil påvirke salget til PowBat. Etter å ha hørt om planene til BA3 antar PowBat at

- de totalt vil få solgt batteriet sitt til 1,5 millioner husstander.
- 500 husstander har batteriet når det lanseres.
- flest nye husstander kjøper batteriet i uke 60.

c) Bruk antakelsene ovenfor til å finne en ny logistisk modell F for antallet husstander som har batteriet etter t uker.

0.0.111 (R1V25D2)

Posisjonen $\vec{r}$ til en fiskebåt t timer etter at den drar fra land, er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [1 + 5t, 4 + 8t].$$

Enhetene langs aksene er kilometer. Farten til en båt måles vanligvis i knop, der 1 knop er 1852 meter per time.

a) Bestem farten til fiskerbåten i knop.

b) Et fyr står i posisjonen $(4, 7)$. Bestem den minste avstanden mellom fiskebåten og fyret.

c) En fiskestim er i punktet $(1, -3)$ ved tiden $t = 0$, og stimen svømmer med hastigheten $\vec{v}(t) = [4, 11]$. Vil fiskebåten treffe fiskestimen?

d) En annen fiskebåt er i punktet $(-2, 0)$ ved tiden $t = 0$, og holder konstant fart i retning langs $\vec{u} = [6, 4]$. Bestem farten denne fiskebåten må holde for å treffe fiskestimen.

0.0.112 (R1H25D1)

Gitt funksjonen

$$f(x) = 4x^2 \cdot \ln x$$

a) Bestem koordinatene til eventuelle topp- og bunnpunkt på grafen til f.

En elev har skrevet kode under.

```
1  from math import log  # log(x) er kode for ln(x)
2
3  a = 0.1
4  b = 3
5  maks_avvik = 0.0001
6
7  def f(x):  # definerer funksjonen
8      return 4*x**2*log(x)
9
10 m = (a + b)/2
11
12 # abs() finner absoluttverdien
13 while abs(f(m)) >= maks_avvik:
14
15     if f(a)*f(m) < 0:
16         b = m
17     else:
18         a = m
19
20     m = (a + b)/2
21
22 print(m)
```

b) Hva ønsker eleven å finne ut?

c) Forklar hva programmet gjør i linje 10 - 20

d) Finn den eksakte verdien som eleven finner en tilnærming til.

0.0.113 (R1H25D2)

Tabellen nedenfor viser folketallet til et lite tettsted, noen år i perioden 1960 – 1980.

År	1960	1961	1963	1965	1967	1971	1975	1977	1980
Folketall	500	604	852	1043	1510	2163	2544	2639	2715

a) La F være folketallet til tettstedet x år etter 1960. Skisser grafen til F, og argumenter for at

$$F(x) = \frac{2827}{1 + 4{,}85\, e^{-0{,}244\, x}}$$

er en passende modell.

b) Bestem $F'(12)$ og $F''(12)$. Gi en praktisk tolkning av svarene.

c) Argumenter for om likningen $F'(x) = 150$ har to løsninger eller én løsning. Gi en praktisk tolkning av løsningen(e).

0.0.114 (R1H25D2)

Et selskap foretar analyser hvor de måler nivået av lukt fra luftprøver. Prøvene analyseres, og hver prøve gis en luktverdi C. Denne luktverdien gir antall odour units per kubikkmeter (OU/m^3). Selskapet har utviklet en modell som kobler luktverdien til opplevd luktintensitet I. Modellen er gitt ved

$$I = 1{,}4 \cdot \lg(C) - 0{,}3$$

Luktintensiteten vurderes etter følgende tabell:

Luktintensitet (I)	**Vurdering**
< 1	uproblematisk
1 - 2	akseptabelt
2 - 3	kan aksepteres kortvarig
3 - 4	plagsomt, bør begrenses
> 4	plagsomt, tiltak kreves

1. I prøver fra et område varierte verdiene til C mellom 500 - 1400.

b) Hvilken luktverdi må prøver vise for at luktintensiteten skal være akseptabel?

0.0.115 (R1H25D2)

Ina følger en sti fra ei hytte til et utsiktspunkt. I et koordinatsystem der enheten langs aksene er meter, ligger hytta i punktet $H = (0, 300)$ og utsiktspunktet i $U = (1200, 400)$. Stien mellom hytta og utsiktspunktet er en rett linje. Ina går med konstant fart.

a) Forklar at parameterframstillingen

$$i: \quad \begin{cases} x = 1200s \\ y = 300 + 100s \end{cases} \qquad s \in [0, 1]$$

gir den rette linja mellom hytta og utsiktspunktet.

Hele turen tar 20 minutter.

b) Bestem posisjonen til Ina etter 5 minutter.

c) Regn ut farten til Ina. Gi svaret i m/s.

Jonas er ute på tur i samme område som Ina. De to vennene møter hverandre. Jonas sin posisjon t minutter etter at han startet sin tur, er gitt ved

$$j: \quad \begin{cases} x = 520 - 20t \\ y = 310 + 5t \end{cases}$$

d) Hvor langt har Ina gått når hun møter Jonas?

0.0.116 (R1V26D1)

Gitt følgende kode.

```
1  def f(x):
2      return 1/3*x**3 + 5/3*x**2 + 25/9*x
3
4  def g(x):
5      h = 0.000001
6      return (f(x + h) - f(x))/h
7
8  x = -4
9  slutt = 4
10 dx = 0.002
11 maks_avvik = 0.00001
12
13 while x < slutt:
14     x = x + dx
15     # sjekker om g(x) er nær 0
16     if abs(g(x)) < maks_avvik:
17         if g(x - dx) * g(x + dx) > 0:
18             print("f har et A for x =", x)
19         elif g(x - dx) < 0 < g(x + dx):
20             print("f har et B for x =", x)
21         elif g(x - dx) > 0 > g(x + dx):
22             print("f har et C for x =", x)
```

a) Forklar sammenhengen mellom f og g.

b) Erstatt henholdsvis A, B og C med riktige begreper.

c) Hvilken av linje 18, linje 20 og linje 22 vil skrives når programmet kjøres? Grunngi svaret ditt.

0.0.117 (R1V26D2)

Tabellen nedenfor viser farten til en rakett noen sekunder etter at raketten har forlatt utskytingsrampen.

Tid (sekunder)	1	5	10	20	50	100	150
Fart (meter per sekund)	7,3	9,2	10,7	25,6	61,3	183,0	218,2

La V være farten (i m/s) til raketten t sekunder etter at den har forlatt utskytingsrampen.

a) Avgjør hvilket av følgende uttrykk som best modellerer tallene fra tabellen:

$$V(t) = V_1(t) = \frac{224}{1 + 27 \cdot e^{-0{,}048t}}$$

$$V(t) = V_2(t) = 8{,}1 \cdot e^{0{,}023t}$$

$$V(t) = V_3(t) = \frac{182}{1 + 24 \cdot e^{-0{,}05t}}$$

Gi minst to argumenter for valg av uttrykk.


Videre i denne oppgaven tar vi utgangspunkt i den beste modellen.

b) Hvor lang tid tar det før raketten oppnår en fart på 100 m/s?

c) Når er fartsøkningen (akselerasjonen) til raketten størst? Hvor stor er denne fartsøkningen?

d) Avgjør om grafen til V har asymptoter. Gi en praktisk tolkning av eventuelle asymptoter.

Figuren under viser grafen til V'.



e) Gi en praktisk tolkning av skjæringspunktene.

f) Finn en tilnærmet løsning av ulikheten $V'(t) > 2$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

0.0.118 (R1V26D2)
I et koordinatsystem der enhetene langs aksene er meter, er posisjonen til partikkel A gitt ved

$$l: \quad \begin{cases} x = 6t + 120 \\ y = \frac{5}{3}t + 50 \end{cases} \qquad t \in [0, 200]$$

a) Bestem banefarten og posisjonen til partikkelen etter et halvt minutt.

I samme koordinatsystem er posisjonen til partikkel B gitt ved

$$m: \quad \begin{cases} x = \frac{13}{2}t + 250 \\ y = -\frac{9}{5}t + 520 \end{cases} \qquad t \in [0, 200]$$

b) Vis at partikkel A og B ikke vil møte hverandre.

For å få A og B til å møtes, kan vi etter 1 minutt gi partikkel A en ny konstant banefart, i samme retning som før. Finn denne banefarten.

0.0.119 (R1V26D2)
Gitt funksjon $f(x) = 100 \cdot 0{,}8^x$, tallet $a \in [0{,}5)$, og punktene $A = (a, f(a))$, $B = (5, f(a))$, $C = (5, 200)$ og $D = (a, 200)$.

a) Lag en skisse av grafen til f og rektangelet $\square ABCD$.

b) Finn det største arealet $\square ABCD$ kan ha.

0.0.120 (R2V23D2)

En fabrikk lager kroker ved hjelp av en 3D-printer. Posisjonen til dysen i 3D-printeren etter t sekunder er gitt ved

$$\vec{r}(t) = \left[1 + e^{\frac{t}{20}}, 1 - \sin t, \frac{1}{10}e^{-2t+2} + \cos t\right] \quad , \quad t \in [0, 5]$$

Her er cm enheten langs aksene.

a) Bestem banefarten til dysen etter 1 sekund.

b) Dysen har sin laveste banefart i løpet av $t \in (0, 5)$. Hvilken verdi har $\vec{r}''(t)$ når banefarten er på sitt laveste?

c) Avgjør om fartsretningen noen gang er parallell med xz-planet eller parallell med yz-planet.

0.0.121 (R2V23D1)

En elev har skrevet følgende kode:


```
1  a=3
2  d=4
3
4  N = 10
5  S = 0
6
7  for i in range(N):
8    S = S + a
9    a = a + d
10
11 print(S)
```

a) Forklar hva eleven vil regne ut.

b) Hva blir resultatet når man kjører programmet, hvis N settes til 100 i linje 4?

0.0.122 (R2H23D2)

En tønne er 75 cm høy. Diameteren i bunnen og toppen er 45 cm. Den største diameteren er 52 cm. Siden i tønnen fra toppen til bunnen er formet som en parabel. Se skisse under. Finn volumet til tønnen.



0.0.123 (R2H23D2)

I et veikryss varierer en type luftforurensning periodisk hvert døgn. Luftforurensningen øker ut over formiddagen og minker igjen mot kvelden. Mengden luftforurensning M kan beskrives med funksjonen

$$M(t) = A\sin(ct + k) + d$$

der t er antall timer etter midnatt.

Den største mengden luftforurensning i løpet av døgnet er 31,2 $\mu g/m^3$, og den minste mengden er 18,2 $\mu g/m^3$.

a) Bestem A, c og d.

b) Ved to tidspunkter i løpet av døgnet er mengden luftforurensning 27 $\mu g/m^3$. Den første gangen er klokken 13:00. Når er det andre tidspunktet?

0.0.124 (R2V24D1)

En elev har skrevet koden under.

```
n = 0
S = 0

while S <= 200:
    n = n + 1
    S = S + 4 * n - 2

print(n)
```

a) Forklar hva eleven prøver å finne ut.

b) Finn verdien eleven får skrevet ut når programmet kjøres.

0.0.125 (R2V24D2)

En fotballspiller skal ta en corner på en fotballbane. Posisjonen r til ballen etter t sekunder er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [30t, 5t, 7t - 4.9t^2]$$

Her er posisjonen gitt i meter, og koordinatsystemet er lagt slik at origo er i ett av hjørnene til fotballbanen (der corneren tas fra). x-aksen går langs kortsiden og y-aksen går langs langsiden.

a) Hvor stor er farten til ballen idet den blir skutt?

b) Hvor langt fra hjørnemerket er ballen når den treffer bakken igjen?

0.0.126 (R2V24D2)

En sensor skal slå på utelyset foran ytterdøra til et hus. Lyset blir slått på T timer etter midnatt. T er gitt ved

$$T(x) = 4\sin(0.0055\pi x - 0.5\pi) + 19$$

x er antall dager etter 31. desember 2023, slik at $x = 1$ svarer til 1. januar 2024. Tidspunktet sensoren slår på utelyset, varierer fra kl. 15:00 til kl. 23:00, og det varierer periodisk i løpet av et år. Den 1. april slår lyset seg på kl. 19:00.

a) Forklar hvordan de ulike verdiene i uttrykket til T passer med opplysningene gitt ovenfor.

To ganger i 2024 vil tidspunktet da lyset slår seg på forlenges med momentan hastighet på 3 minutter per dag.

b) Sett opp en likning som kan løses for å finne dette tidspunktet.

c) Lag et skript som finner en tilnærming til minst én av løsningene av likningen fra oppgave b).

Én gang i 2024 vil tidspunktet da lyset slår seg på forlenges med høyest mulig momentan hastighet.

d) Når er dette, og hva er da den momentane hastigheten?

0.0.127 (R2H24D2)

En ball kastes fra en høyde over bakkenivå. Posisjonen $\vec{r}$ til ballen t sekunder etter at den ble kastet er gitt ved

$$\vec{r}(t) = \left[2t, 4t, 6 - 0.7t - 4.9t^2\right]$$

i et koordinatsystem hvor xy-planet ligger langs bakken. Måleenheten på aksene er meter.

a) Hvor høyt over bakken ble ballen kastet fra?

b) Hva er posisjonen til ballen etter 0,5 s?

c) Bestem farten til ballen når den treffer bakken.

d) Ved hvilket tidspunkt er farten til ballen 10 m/s?

0.0.128 (R2H24D2)

Anders og Ivana har kjøpt seg russebil. De skal kjøre bilen til en garasje, men på turen begynner motoren å fuske. Farten v kan tilnærmes ved

$$v(t) = -6\sin\left(360t - \frac{\pi}{2}\right) + 54$$

Her er v gitt i km/t, og t er antall timer etter at motoren har begynt å fuske.

a) Bestem det første tidspunktet gjennomsnittsfarten blir 54 km/t.

b) På hvilke tidspunkt har bilen størst akselerasjon når den kjører med farten v? Hvor stor er denne akselerasjonen?

Når bilen begynner å fuske, er det 2 km til garasjen som bilen skal parkeres i.

c) Sett opp en likning for tiden T Anders og Ivana vil bruke på å komme til garasjen.

d) Lag et skript som finner en tilnærmet verdi for T.

0.0.129 (R2H24D2)

a) Bestem en rekursiv formel for tallfølgen 1, 2, 6, 15, 31, 56, ...

b) Bruk den rekursive formelen du fant i oppgave a), og lag et program som regner ut summen av de 30 første leddene i tallfølgen.

0.0.130 (R2V25D1)

En elev har skrevet koden under, som skriver ut en tilnærmet verdi av en størrelse. Finn den eksakte verdien til denne størrelsen.

```python
def f(x):
    return x**3

def g(x):
    return -2*x**2

dx = 0.0001
s = 0
x = 0
while x <= 2:
    s = s + f(x)*dx + g(x)*dx
    x = x + dx
print(s)
```

0.0.131 (R2V25D2)

En bil kjører opp en spiralformet vei inne i et parkeringshus. Posisjonen $\vec{r}$ til bilen etter t sekunder er gitt ved

$$\vec{r}(t) = \left[4\cos\left(\frac{\pi}{5}t\right),\, 4\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) + 2,\, 5 + \frac{1}{3}t\right], \quad t \in [0, 20]$$

der bakkenivået er xy-planet i et koordinatsystem med meter som enhet langs aksene.

a) Hvor høyt over bakkenivået er bilen etter 5 sekunder?

b) Finn farten til bilen etter 10 sekunder.

c) Gjør nødvendige antakelser og bestem en mulig avstand mellom etasjene i parkeringshuset.

0.0.132 (R2V25D2)

Nora vil begynne å spare til egen pensjon på følgende vis:

- Hun vil sette et fast beløp inn på en konto i banken 1. januar hvert år.
- Hun vil begynne sparingen 1. januar 2026, og holde på til og med januar 2055.
- Målet hennes er å ha 3 750 000 kroner i banken etter at rentene for 2055 er lagt til.
- Nora venter at den årlige rentesatsen på kontoen vil være 2,5 %.

a) Hvor stort beløp må Nora sette i banken hvert år for å nå målet?

1. januar 2026 tar Nora også opp et huslån på 3 000 000 kroner. Lånet skal ha årlige terminer, og Nora betaler terminbeløpet i januar hvert år. Første terminbeløp skal betales 1. januar 2027. Nora har regnet seg fram til at hun må betale 150 000 kroner hver termin fra og med januar 2027 til og med januar 2058 før lånet er nedbetalt.

b) La p være den årlige rentesatsen på lånet Nora har regnet med. (Eksempel: Hvis rentesatsen var 10 %, ville vi hatt at $p = 0{,}1$). Bruk informasjonen om lånet til å sette opp en likning med p som eneste ukjent.

c) Skriv et program som finner en tilnærmet løsning av likningen i oppgave b).

0.0.133 (R2V25D2)
Farten v til en hare er gitt ved

$$v(t) = 8{,}3 - 17{,}4 \cdot e^{-5t} + 9{,}1 \cdot e^{-0{,}08t}$$

hvor v gir farten målt i meter per sekund, t sekunder etter at haren startet å løpe.

a) Hvor lang tid vil det gå før akselerasjonen til haren er null?

b) Hvor langt løper haren i løpet av de første 7 sekundene?

c) Etter t_1 sekunder har haren løpt 200 meter. Bruk et integral til å sette opp en likning med t_1 som eneste ukjent.

d) Skriv integralet som gir gjennomsnittsfarten til haren de første 200 meterne, uttrykt ved t_1.

0.0.134 (R2H25D2)
En miniubåt passerer 250 meter under en bøye som ligger på havoverflaten. I et koordinatsystem der xy-planet ligger langs havoverflaten, er posisjonen $\vec{r}$ til miniubåten t sekunder etter passeringen gitt ved

$$\vec{r}(t) = [6t, 7t, -250 - 5t + 0.1t^2] \quad , \quad t \in [0, 60]$$

a) Bestem farten til miniubåten etter 2 sekunder.

b) Hvor langt under havoverflaten er miniubåten på det dypeste?

Posisjonen til fiskestim i området er gitt ved vektorfunksjonen $\vec{s}(t)$. Fiskestimen har en tilnærmet kuleform med radius på 15 meter. Miniubåten er 4 meter bred, 5 meter høy og 8 meter lang. Både posisjonen til fiskestimen og til utbåten har utgangspunkt i sentrum av objektet.

c) Sett opp en ulikhet som må være oppfylt for at ubåten og fiskestimen garantert skal treffe hverandre.

0.0.135 (R2V25D2)

Karbontetraklorid CCl_4 er et stoff som blir tatt opp i blodet, og skilt ut av leveren. Hvis totalmengden CCl_4 i blodet overstiger 10 enheter, begynner ammoniakk å samles i kroppen, og dette er potensielt farlig.

Etter å ha flyttet til en ny plass utsettes Sofie for 2 enheter CCl_4 hver dag. For å regne mengden CCl_4 har i blodet etter flyttingen gjør Sofie følgende antakelser/forenklinger:

- Før flyttingen hadde ikke Sofie CCl_4 i blodet.
- De 2 enhetene CCl_4 hun utsettes for hver dag tas opp i blodet umiddelbart og ved et fast tidspunkt.
- Leveren klarer å skille ut 18% av total mengde CCl_4 i blodet i løpet av en dag. Dette skjer også til ett og samme tid. Første utskilling skjer dag 1 etter flytting.

a) Regn ut hvor mange dager Sofie kan bo på sin nye plass før mengden CCl_4 i blodet når et potensielt farlig nivå.

Sofie leser en artikkel om CCl_4 der det blir påstått at en voksen person aldri vil ha mer enn 10 enheter av stoffet i kroppen dersom personen utsettes for 2 enheter CCl_4 per dag. Artikkelen har gjort tilsvarende antakelser/forenklinger som Sofie, bortsett fra at de antar at kroppen kan skille ut en litt større mengde CCl_4 hver dag.

b) Regn ut hvor mange prosent av mengden CCl_4 artikkelen antar at en voksen person skiller ut fra kroppen hver dag.

0.0.136 (R2V25D2)

Gitt funksjonen $f(x) = 3^{2x}$. Programmet nedenfor beregner arealet til området avgrenset av grafen til f, x-aksen og linjene $x = 0$ og $x = 2$.

```
start = 0
slutt = 2
n = 100
dx = (slutt - start) / n

def f(x):
    return 3**(2*x)

def areal_til_venstre():
    areal = 0
    for i in range(n):
        x = start + i*dx
        areal = areal + f(x)*dx
    return areal

def areal_til_hoyre():
    areal = 0
    for i in range(1, n+1):
        x = start + i*dx
        areal = areal + f(x)*dx
    return areal

print(areal_til_venstre())
print(areal_til_hoyre())
```

a) Forklar hvorfor den ene metoden vil gi en litt for høy verdi for arealet, og den andre metoden en litt for lav verdi.

b) Lag et program som beregner arealet mer nøyaktig uten å dele det opp i flere deler (behold `n=100`).

0.0.137 (R2V26D2)

Selskapet IntCom er en internettleverandør. Selskapet sørger for overføring av data mellom kundene og internett. Datatrafikken varierer gjennom døgnet. Tabellen nedenfor viser datatrafikken D (målt i gigabit per time) for utvalgte klokkeslett T et døgn i mai.

T	00:00	02:00	06:00	08:00	12:00	16:00	20:00	22:00
D	58 280	39 400	22 550	32 200	67 450	86 110	102 007	87 810

a) Framstill dataverdiene i tabellen ovenfor som punkter i et koordinatsystem med timer etter midnatt langs x-aksen og gigabit per time lags y-aksen. Skisser en graf som passer med punktene.

b) Gjør nødvendige forenklinger og antakelser, og argumenter for at

$$D(t) = 63000 + 37000 \cdot \sin(0.24t - 3.0)$$

er en god modell for datatrafikken D, t timer etter midnatt.

c) Når var datatrafikken mer enn 90 000 gigabit per time ifølge modellen?

d) Når økte datatrafikken raskest, og hvor stor var denne økningen ifølge modellen?

e) Hvor stor datamengde ble overført mellom klokken 8 og klokken 16 ifølge modellen?

0.0.138 (R2V26D2)

Et lite propellfly må nødlande på en motorvei. Posisjonen $\vec{r}$ til flyet t sekunder etter at nødlandingen har startet, er gitt ved

$$\vec{r}(t) = \left[30t - t^2,\ 8\sin\left(\frac{\pi}{10}t\right),\ 50\left(1 - \frac{t}{10}\right)^2\right]$$

Motorveien ligger i xy-planet. Enhetene langs aksene er meter.

a) Hvor høyt over motorveien er flyet 4 sekunder etter at nødlandingen har startet?

b) Bestem banefarten idet flyet lander på motorveien.

c) Ved tidspunktet $t = t_1$ er banefarten 14,3 m/s. Sett opp en likning med t_1 som eneste ukjent.

d) Lag et program som løser likningen fra oppgave c).

En fugl er i posisjonen $(131, 67, 23)$ idet flyet starter nødlandingen. Fuglen flyr i en rett linje og krysser banen til flyet i punktet $\left(125, 8, \frac{25}{2}\right)$. Fuglen holder en jevn banefart på 12 m/s.


e) Vil fuglen treffe flyet?

0.0.139 (R2V26D2)

Figuren under skisserer grafen til en trigonometrisk funksjon $f(x)$.

a) Finn et uttrykk for f.

b) Et omdreiningslegeme dannes vet å rotere f om x-aksen. Finn den minste omkretsen til dette legemet der hvor det er på sitt smaleste.



0.1 Teoretiske utvidelser

0.1.1

#følger og rekker #annuitetslån

Gitt et annuitetslån med lånebeløp L_0, årlig rente $r\%$, og nedbetalingstid t år. Lånet skal nedbetales med et årlig terminbeløp T, hvor første nedbetaling utføres når $t = 1$.

a) La L_n være resterende lånebeløp etter n-te nedbetaling. Forklar hvorfor

$$L_n = (1 + p)L_{n-1} - T$$

hvor $p = \frac{r}{100}$.

b) Vis at

$$T = \frac{p}{1 - (1 + p)^{-t}} L_0$$

Obs! Hvis første nedbetaling utføres når $t = 0$, har vi at

$$T = \frac{p}{(1 + p)\left(1 - (1 + p)^{-t}\right)} L_0$$

Annuitetslån blir ofte forklart med utgangspunnkt i det vi her skal kalle *spareperspektivet* og *realverdiperspektivet*:

Spareperspektivet
Vi tenker oss at utlåner oppretter en sparekonto med $r\%$ årlig rente. I t år tilføres sparekontoen et årlig innskudd T. Dette skal gi samme resultat som hvis L_0 hadde blitt satt på sparekonto umiddelbart og forrentet i t år.

Nåverdiperspektivet
Året før nedbetalingen starter setter vi som basisår, og vi tenker at kroneverdien har økt, og vil øke, med $r\%$ hvert år etter basisåret. Summen av realverdiene til alle terminbeløp skal da tilsvare L_0.

c) Ta utgangspunkt i likningen merket med (*) i løsningsforslaget, og forklar hva de to sidene i likningen beskriver ut ifra spareperspektivet.


d) Ta utgangspunkt i likningen merket med (*) i løsningsforslaget, og lag en likning som beskriver nåverdiperspektivet.

0.2 Teoretiske utvidelser

0.2.1

I MB har vi vist at punktet (x, y) på en ellipse oppfyller likningen

$$\sqrt{(x-c)^2+y^2}+\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a$$



0.2.2

#vektorer i planet #derivasjon

Posisjonen $\vec{s}$ til et objekt som beveger seg i en sirkelbane kan uttrykkes ved

$$\vec{s}=r[\cos(2\pi ft),\sin(2\pi ft)]$$

hvor r er radien til sirkelbanen, t er tiden og f er frekvensen.

a) f beskriver antall runder objektet fullfører per tidsenhet[1]. Forklar hvorfor $2\pi f$ kalles **vinkelfarten** til objektet.

b) Finn $\vec{s}\,'(t)$.

c) Hva er vinkelen mellom $\vec{s}(t)$ og $\vec{s}\,'(t)$?

d) Bestem lengden til $\vec{s}\,'(t)$

e) Finn $\vec{s}\,''(t)$.


f) Bestem lengden til $\vec{s}\,''(t)$

g) Hva er vinkelen mellom $\vec{s}(t)$ og $\vec{s}\,''(t)$? Peker $\vec{s}\,''(t)$ innover i sirkelbanen eller ut fra sirkelbanen?

h) Bruk en fysikkbok eller internett til å undersøke begrepet **sentripetalakselerasjon**. Sammenlign funnene dine i denne oppgaven med informasjonen du finner.

[1] Hvis tidsenheten er 'sekund', har f benevningen '1/sekund'.

0.2.3 (R1EV26D2)



0.2.4 (1PEH26D2)

Under vises en figur med areal A.

a) Vis at A er gitt ved $A(s) = 30s - 2s^2$

b) Finn A når $s = 5$.

c) Faktoriser uttrykket til A.

d) Finn den største verdien A kan ha.

e) For hvilke verdier av s er $A = 112$?

f) For hvilke verdier av s er $A > 72$?

