

Gruble ??

a) Av (??) har vi at

$$f'(a) = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

For at denne grensen skal eksistere, må vi ha at $\lim_{b \rightarrow a} (f(b) - f(a)) = 0$ (hvis ikke går grensen mot $\pm\infty$, og da er ikke den deriverte definert), og følgelig er $\lim_{a \rightarrow b} f(b) = f(a)$. Dermed er f kontinuert for alle x .

b) Gitt funksjonen $f(x) = 0$, da er $f'(x) = 0$ for alle x . Av resultatet fra a) er dermed $f(x) = 0$ kontinuert.

Gitt funksjonen $g(x) = a$, hvor a er en konstant. Da er $f'(x) = 0$, og dermed er $g(x)$ kontinuert.

Gitt funksjonene $h(x) = ax + b$ hvor a og b er konstanter. Da er $h'(x) = g(x)$, og dermed er $h(x)$ kontinuert.


Med samme resonnering kan vi stegvis øke graden av polynomet så høyt vi måtte ønske det, og dermed er alle polynomfunksjoner kontinuerte.

Gruble ??

a) Vi har at

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x) + f(x) - f(x-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} [f'(x) + f'(x-h)] \\ &= 2f'(x) \end{aligned}$$

Gruble ??



a) Vi har at

$$A = (p, ap^2 + bp + c) \quad , \quad B = (q, aq^2 + bq + c)$$

Vi lar $g(x)$ være funksjonen som beskriver linja gjennom AB . Da er

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{f(q) - f(p)}{q - p} \\ &= \frac{aq^2 + bq + c - (ap^2 + bp + c)}{q - p} \\ &= \frac{a(q^2 - p^2) + b(q - p)}{q - p} \\ &= \frac{a(q + p)(q - p) + b(q - p)}{q - p} \\ &= a(q + p) + b \end{aligned}$$

Vi setter $C = (t, f(t))$. Da har vi at

$$\begin{aligned} f'(t) &= a(q + p) + b \\ 2at + b &= a(q + p) + b \\ t &= \frac{1}{2}(q + p) \end{aligned}$$

b) Vi lar D være midtpunktet til AB . Da er $D = \left(t, \frac{1}{2}(f(q) + f(p))\right)$

(se [oppgave ??](#)). Videre er

$$\begin{aligned} DC &= \frac{1}{2} (f(q) + f(p)) - f(t) \\ &= \frac{1}{2} \left(a(p^2 + q^2) + b(p + q) + 2c \right) - a \left(\frac{1}{2}(p + q) \right)^2 + b \left(\frac{1}{2}(p + q) \right) + c \\ &= \frac{a}{2} (p^2 + q^2) - \frac{a}{4} (p + q)^2 \\ &= \frac{a}{4} (2p^2 + 2q^2 - p^2 - q^2 - 2pq) \\ &= \frac{a}{4} (q - p)^2 \end{aligned}$$

Vi plasserer E og F slik at $\square AEFB$ er et parallelogram. Med AE som grunnlinje, har $\square AEFB$ høyde $q - p$. Da $AE = DC$, er

$$A_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} A_{\square AEFB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{4} (q - p)^2 (q - p) = \frac{a}{8} (q - p)^3$$