

0.1 Begreper


Punkt

En bestemt plassering kalles et¹ **punkt**. Et punkt markerer vi ved å tegne en prikk, som vi gjerne setter navn på med en bokstav. Under har vi tegnet punktene A og B .




Linje og linjestykke

En rett strek som er uendelig lang (!) kaller vi en **linje**. At linja er uendelig lang, gjør at vi aldri kan *tegne* en linje, vi kan bare *tenke* oss en linje. Å tenke seg en linje kan man gjøre ved å lage en rett strek, og så forestille seg at endene til streken vandrer ut i hver sin retning.




En rett strek som går mellom to punkt kaller vi et **linjestykke**.



Linjestykket mellom punktene A og B skriver vi som AB . **Lengden** til AB er lengden vi må vandre langs linjestykket for å gå fra A til B .

I en figur viser vi gjerne lengden til et linjestykke med et tall midt på linjestykket. I figuren under vises det at lengden til AB er 3.




¹Se også [seksjon ??](#).

Merk

Et linjestykke er et utklipp (et stykke) av en linje, derfor har en linje og et linjestykke mange felles egenskaper. Når vi skriver om linjer, vil det bli opp til leseren å avgjøre om det samme gjelder for linjestykker, slik sparer vi oss for hele tiden å skrive ”linjer/linjestykker”.

Linjestykke eller lengde?




Linjestykkene AB og CD har lik lengde, men de er ikke det samme linjestykket. Likevel kommer vi til å skrive $AB = CD$ for å vise til at linjestykkene har lik lengde. Da bruker vi altså de samme navnene på linjestykkene som på lengdene deres¹. Dette gjør vi av følgende grunner:

- Til hvilken tid vi snakkar om et linjestykke og hvilken tid vi snakker om en lengde vil komme tydelig fram av sammenhengen begrepet blir brukt i.
- Å hele tiden måtte ha skrevet ”lengden til AB ” og lignende ville gitt mindre leservennlige setninger.

¹Det samme gjelder for vinkler og vinkelverdier, se side 4 - 6.


Avstand

Det er uendelig med veier man kan gå fra ett punkt til et annet, og noen veier vil være lengre enn andre. Når vi snakkar om avstand i geometri, mener vi helst den *korteste* avstanden. For geometrier vi skal ha om i denne boka, vil den korteste avstanden mellom to punkt alltid være lengden til linjestykket (blått i figuren under) som går mellom punktene.




Sirkel; sentrum, radius og diameter

Om vi lager en lukket bue der alle punktene på buen har samme avstand til ett punkt, har vi en **sirkel**. Punktet som alle punktene på buen har lik avstand til er **sentrum** i sirkelen. Et linjestykke mellom sentrum og et punkt på buen kaller vi en **radius**. Et linjestykke mellom to punkt på buen, og som går via sentrum, kaller vi en **diameter**¹.



Sektor


En bit som består av en sirkelbue og to tilhørende radier kalles en **sektor**. Bildet under viser tre forskjellige sektorer.



¹Som nevnt på side 2 kan *radius* og *diameter* like gjerne bli brukt om lengden til linjestykkene.


Parallelle linjer

Når linjer går i samme retning, er de **parallelle**. I figuren under vises to par med parallelle linjer.




Vi bruker symbolet $\parallel$ for å vise til at to linjer er parallelle.

$$AB \parallel CD$$




Vinkler

To linjer som ikke er parallelle, vil før eller siden krysse hverandre. Gapet to linjer danner seg imellom kalles en **vinkel**. Vinkler tegner vi som små sirkelbuer:





Linjene som danner en vinkel kalles **vinkelbein**. Punktet der linjene møtes kalles **toppunktet** til vinkelen. Ofte bruker vi punktnavn og vinkelsymbolet $\angle$ for å tydeliggjøre hvilken vinkel vi mener. I figuren under er det slik at

- vinkelen $\angle BOA$ har vinkelbein OB og OA , og toppunkt O .
- vinkelen $\angle AOD$ har vinkelbein OA og OD , og toppunkt O .




Mål av vinkler i grader


Når vi skal måle en vinkel i grader, tenker vi oss at en sirkelbue er delt inn i 360 like lange biter. Én slik bit kaller vi én **grad**, som vi skriver som tegnet $^\circ$.



Legg merke til at en 90° vinkel markeres med symbolet $\square$. En vinkel som måler 90° kalles en **rett vinkel**. Linjer som danner rette vinkler sier vi står **vinkelrette** på hverandre. Dette viser vi med symbolet $\perp$.




En vinkel som er større enn 90° kalles en **butt/stump vinkel**, og en vinkel som er mindre enn 90° kalles en **spiss vinkel**.




Hvilken vinkel?

Når to linjestykker møtes i et felles punkt, danner de strengt tatt to vinkler; den ene større eller lik 180° , den andre mindre eller lik 180° . I de aller fleste sammenhenger er det den minste vinkelen vi ønsker å studere, og derfor er det vanlig å definere $\angle AOB$ som den *minste* vinkelen dannet av linjestykkene OA og OB .




Så lenge det bare er to linjestykker/linjer tilstede, er det også vanlig å bruke bare én bokstav for å vise til vinkelen:




0.1 Toppvinkler

To motstående vinkler med felles toppunkt kalles **toppvinkler**. Toppvinkler er like store.



0.1 Toppvinkler (forklaring)



Vi har at

$$\angle BOC + \angle DOB = 180^\circ$$

$$\angle AOD + \angle DOB = 180^\circ$$

Dette må bety at $\angle BOC = \angle AOD$. Tilsvarende er $\angle COA = \angle DOB$.


0.2 Samsvarende vinkler

Vinkler med forskjellige toppunkt og et høyre vinkelbein felles eller et venstre vinkelbein felles, kalles **samsvarende vinkler**.

Samsvarende vinkler med parallelle vinkelbein er like store.


Eksempel 1

I figuren under er $\angle BGC$, $\angle AGD$ og $\angle FHC$ samsvarende vinkler fordi alle har DC som venstre vinkelbein. I tillegg er $\angle BGC = \angle AGD$.




Eksempel 2

I figuren under er $\angle BGC = \angle AGD = \angle FHC$ fordi de er samsvarende vinkler med parvis parallelle vinkelbein.



(0.2) Samsvarende vinkler (forklaring)

Gitt tre samsvarende vinkler $\angle BGC$, $\angle AGD$ og $\angle FHC$ med parvis parallelle vinkelbein, som vist i figuren under.




At $\angle FHC = \angle BGC$ godtar vi som sant uten noen videre forklaring. $\angle BGC = \angle AGD$ fordi de er toppvinkler, og dermed er


$$\angle BGC = \angle AGD = \angle FHC$$

Kanter og hjørner

Når linjestykker danner en lukket form, har vi en **mangekant**. Under ser du (fra venstre mot høyre) en **trekant**, en **firkant** og en **femkant**.



Linjestykkene en mangekant består av kalles **kanter** eller **sider**. Punktene der kantene møtes kaller vi **hjørner**. Trekanten under har altså hjørnene A , B og C , og sidene (kantene) AB , BC og AC .




En **regulær mangekant** er en mangekant hvor alle sidene er like lange.



Merk


Ofte kommer vi til å skrive bare en bokstav for å markere et hjørne i en mangekant.



Diagonaler


Et linjestykke som går mellom to hjørner som ikke hører til samme side av en mangekant kalles en **diagonal**. I figuren under ser vi

diagonalene AC og BD .




Høyde og grunnlinje

Når vi i [seksjon 0.4](#) skal finne areal, vil begrepene *grunnlinje* og *høyde* være viktige. For å finne en høyde i en trekant, tar vi utgangspunkt i én av sidene. Siden vi velger kaller vi **grunnlinja**. La oss starte med AB i figuren under som grunnlinje. Da er **høyden** linjestykket som går fra AB (eventuelt, som her, forlengelsen av AB) til C , og som står vinkelrett på AB .



Da det er tre sider vi kan velge som grunnlinje, har en trekant tre høyder.



Merk


Høyde og grunnlinje kan også på lignende vis bli brukt i forbindelse med andre mangekanter.

0.2 Egenskaper for trekanter og firkanter

I tillegg til å ha et bestemt antall sider og hjørner, kan mangekanter også ha andre egenskaper, som for eksempel sider eller vinkler av lik størrelse, eller sider som er parallelle. Vi har egne navn på mangekanter med spesielle egenskaper, og disse kan vi sette opp i en oversikt der noen "arver"¹ egenskaper fra andre.


0.3 Trekanter

Trekant $\begin{cases} \rightarrow \text{Rettvinklet trekant} \\ \rightarrow \text{Likebeint trekant} \rightarrow \text{Likesidet trekant} \end{cases}$



Trekant

Har tre sider og tre hjørner.



Rettvinklet trekant

Har en vinkel som er 90° .



Likebeint trekant

Minst to sider er like lange.

Minst to vinkler er like store.



Likesidet trekant

Sidene er like lange.

Alle vinklene er 60° .

Eksempel


Da en likesidet trekant har tre sider som er like lange og tre vinkler som er 60° , er den også en likebeint trekant.

¹I regel 0.3 og regel 0.6 er dette indikert med piler.


0.4 Vinkelsummen i en trekant

I en trekant er summen av vinkelverdiene 180° .

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$



0.4 Vinkelsummen i en trekant (forklaring)



Vi tegner et linjestykke FG som går gjennom C og som er parallell med AB . Videre setter vi punktet E og D på forlengelsen av henholdsvis AC og BC . Da er $\angle BAC = \angle GCE$ og $\angle CBA = \angle DCF$. $\angle ACB = \angle ECD$ fordi de er toppvinkler. Vi har at

$$\angle DCF + \angle ECD = \angle GCE = 180^\circ$$


Altså er

$$\angle CBA + \angle ACB + \angle BAC = 180^\circ$$

0.5 Størst side, størst vinkel (og omvendt)

Hvis $AC > BC$, er $\angle B > \angle A$.

Hvis $\angle B > \angle A$, er $AC > BC$.



(0.5) Størst side, størst vinkel (og omvendt) (forklaring)

Forklaringen for denne regelen finder du i løsningsforslaget til Gruble ??.

Språkboksen


Den længste siden i en rettvinklet trekant kalles **hypotenus**. De korteste sidene kalles **kateter**.

0.6 Firkanter



Firkant

Har fire sider og fire hjørner.




Trapez

Har minst to sider som er parallelle.



Parallelogram

Har to par med parallelle sider.
Har to par med like vinkler.



Rombe

Sidene er like lange.



Rektangel

Alle vinklene er 90° .



Kvadrat

Eksempel


Kvadratet er både en rombe og et rektangel, og "arver" derfor egenskapene til disse. Dette betyr at i et kvadratet er

- alle sidene like lange.
- alle vinklene 90° .

0.7 Vinkelsummen i en firkant


I en firkant er summen av vinkelverdiene 360° .

$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$$



0.7 Vinkelsummen i en firkant (forklaring)

Den samlede vinkelsummen i $\triangle ABD$ og $\triangle BCD$ utgjør vinkelsummen i $\square ABCD$. Av [regel 0.4](#) vet vi at vinkelsummen i alle trekanter er 180° , altså er vinkelsummen i $\square ABCD$ lik $2 \cdot 180^\circ = 360^\circ$.



0.3 Omkrets


Når vi måler hvor langt det er rundt en lukket form, finner vi **omkretsen** til formen. La oss finne omkretsen til dette rektangelet:



Det første vi må gjøre er å definere et linjestykke med lengde 1:



Rektangelet har to sider med lengde 4 og to sider med lengde 5:





Dette betyr at

$$\text{Omkretsen til rektangelet} = 4 + 4 + 5 + 5 = 18$$

0.8 Omkrets

Omkretsen er lengden rundt en lukket figur.

Eksempel



I figur (a) er omkretsen $5 + 2 + 4 = 11$.

I figur (b) er omkretsen $4 + 5 + 3 + 1 + 6 + 5 = 24$.

0.4 Areal

Når vi ønsker å si noe om hvor store overflaten til en form er, finner vi **arealet** til formen. Grunnlaget for å bestemme arealet til en form er dette:


Vi tenker oss et kvadrat med sidelengder 1. Dette kaller vi 'enerkvadratet'.



Så finner vi ut hvor mange 'enerkvadrat' det er plass til på overflaten til formen.

Arealet til et rektangel

La oss finne arealet til et rektangel med grunnlinje 3 og høyde 2.



Vi kan da telle oss fram til at rektangelet har plass til 6 enerkvadrat:


$$\text{Arealet til rektangelet} = 6$$

Ser vi tilbake til [seksjon ??](#), legger vi merke til at

$$\text{Arealet til rektangelet} = 3 \cdot 2 = 6$$

0.9 Arealet til et rektangel

$$\text{areal} = \text{grunnlinje} \cdot \text{høyde}$$



Bredde og lengde

Ofte blir ordene **bredde** og **lengde** brukt om grunnlinja og høyden i et rektangel.

Eksempel 1

Finn arealet til rektangelet¹.




Svar

$$\text{Arealet til rektangelet} = 4 \cdot 2 = 8$$

Eksempel 2

Finn arealet til kvadratet.



Svar

$$\text{Arealet til kvadratet} = 3 \cdot 3 = 9$$


¹Merk: Lengdene vi bruker som eksempel i en figur vil ikke nødvendigvis samsvare med lengdene i en annen figur. En sidelengde lik 1 i én figur kan altså være kortere enn en sidelengde lik 1 i en annen figur.

Arealet til en trekant


For trekanter er det tre forskjellige tilfeller vi må se på:

1) *Tilfellet der grunnlinja og høyden har et felles endepunkt*

La oss finne arealet til en rettvinklet trekant med grunnlinje 5 og høyde 3.



Vi kan nå lage et rektangel ved å ta en kopi av trekanten vår, og så legge langsidenes til de to trekantene sammen:



Av [regel 0.9](#) vet vi at arealet til rektangelet er $5 \cdot 3$. Arealet til én av trekantene må utgjøre halvparten av arealet til rektangelet, altså er

$$\text{Arealet til den blå trekanten} = \frac{5 \cdot 3}{2}$$


For den blå trekanten¹ er

$$\frac{5 \cdot 3}{2} = \frac{\text{grunnlinje} \cdot \text{høyde}}{2}$$


¹Og selvsagt også den grønne.

2) Tilfellet der høyden ligger inni trekanten, men ikke har felles endepunkt med grunnlinja

Trekanten under har grunnlinje 5 og høyde 4.



Med denne trekanten (og høyden) som utgangspunkt, danner vi denne figuren:



Vi legger nå merke til at


- arealet til den røde trekanten utgjør halve arealet til rektangelet som består av den røde og den gule trekanten.
- arealet til den gule trekanten utgjør halve arealet til rektangelet som består av den gule og den grønne trekanten.

Summen av arealene til den gule og den røde trekanten utgjør altså halvparten av arealet til rektangelet som består av alle de fire fargede trekantene. Arealet til dette rektangelet er $5 \cdot 4$, og da vår opprinnelige trekant (den blå) består av den røde og den oransje trekanten, har vi at


$$\text{Arealet til den blå trekanten} = \frac{5 \cdot 4}{2} = \frac{\text{grunnlinje} \cdot \text{høyde}}{2}$$

3) Tilfellet der høyden ligg utenfor trekanten

Trekanten under har grunnlinje 4 og høyde 3.



Med denne trekanten som utgangspunkt, danner vi et rektangel:



Vi gir nå arealene følgende navn:

Arealet til rektangelet = R

Arealet til den blå trekanten = B

Arealet til den oransje trekanten = O

Arealet til den grønne trekanten = G

Da har vi at

$$R = 3 \cdot 10 = 30$$

$$O = \frac{3 \cdot 10}{2} = 15$$

$$G = \frac{3 \cdot 6}{2} = 9$$

Videre er

$$\begin{aligned} B &= R - O - G \\ &= 30 - 15 - 9 \\ &= 6 \end{aligned}$$

Legg nå merke til at vi kan skrive

$$6 = \frac{4 \cdot 3}{2}$$

I den blå trekanten gjenkjenner vi dette som


$$\frac{4 \cdot 3}{2} = \frac{\text{grunnlinje} \cdot \text{høyde}}{2}$$

Alle tilfellene oppsummert

Ett av de tre tilfellene vi har studert vil alltid gjelde for en valgt grunnlinje i en trekant, og alle tilfellene resulterer i det samme uttrykket.


0.10 Arealet til en trekant

$$\text{Areal} = \frac{\text{grunnlinje} \cdot \text{høyde}}{2}$$



Eksempel 1

Finn arealet til trekanten.




Svar

$$\text{Arealet til trekanten} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$$

Eksempel 2

Finn arealet til trekanten.




Svar

$$\text{Arealet til trekanten} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$$

Eksempel 3

Finn arealet til trekanten.




Svar


$$\text{Arealet til trekanten} = \frac{7 \cdot 3}{2} = \frac{21}{2}$$

0.5 Tredimensjonal geometri

Så langt har vi sett på **todimensjonale** figurer som trekanter, firkanter, sirkler og lignende. Alle todimensjonale figurer kan tegnes inn i et koordinatsystem med to akser.




For å tegne **tredimensjonale** figurer trengs derimot tre akser:



Mens et rektangel sies å ha en bredde og en høyde, kan vi si at boksen over har en bredde, en høyde og en lengde (dybde).


Området som "ligger utenpå" en tredimensjonal figur kaller vi **overflaten**. Overflaten til boksen over består av 6 rektangler. Mangekanter som er deler av en overflate kalles **sideflater**.

0.11 Tredimensjonale figurer




Firkantet prisme

Har to like og fire like rektangler som sideflater. Alle sideflatene som er i kontakt, står vinkelrette på hverandre.




Kube

Firkantet prisme med kvadrater som sideflater.




Trekantet prisme

To av sideflatene er like trekanter som er parallelle. Har tre sideflater som er trekanter.




Firkantet pyramide

Har ett rektangel og fire trekanter som sideflater.




Trekantet pyramide

Har fire trekanter som sideflater.



Kjegle

En del av overflaten er en sirkel, den resterende delen er en sammenføydd sektor.



Kule

Alle punkt på overflaten har lik avstand til sentrum.


Tips

Det er ikke så lett å se for seg hva en *sammenføyd sektor* er, men prøv dette:


Tegn en sektor på et ark. Klipp ut sektoren, og føy sammen de to kantene på sektoren. Da har du en kjegle uten bunn.

0.6 Volum


Når vi ønsker å si noe om hvor mye det er plass til inni en gjenstand, snakker vi om **volumet** til den. Som et mål på volum tenker vi oss en kube med sidelengde 1.



Ei slik kube kan vi kalle "enerkuben". Si vi har en firkantet prisme med bredde 3, lengde 4 og høyde 2.




I denne er det plass til akkurat 24 enerkuber.



Dette kunne vi ha regnet slik:

$$3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$$


0.12 Volumet til en firkantet prisme I



$$\text{volum} = \text{bredde} \cdot \text{lengde} \cdot \text{høyde}$$

Grunnflate


For å regne ut volumet til de mest elementære formene vi har, er det lurt å bruke begrepet **grunnflate**. Slik som for en grunnlinje¹, er det vårt valg av grunnflate som avgjør hva som er høyden. For prismet fra forrige side er det naturlig å velge den flaten som ligger horisontalt til å være grunnflata. Arealet til grunnflaten skriver man gjerne som G :



Grunnflaten har areal $3 \cdot 4 = 12$, mens høyden er 2. Volumet til hele prismet er grunnflaten sitt areal ganget med høyden:

$$\begin{aligned}\text{volum} &= 3 \cdot 4 \cdot 2 \\ &= G \cdot 2 \\ &= 24\end{aligned}$$

0.13 Volumet til en firkantet prisme II



$$\text{volum} = G \cdot \text{høyde}$$

¹Se side 11.

0.7 Symmetri

Mange figurer kan deles inn i minst to deler hvor den éne delen bare er en forskjøvet, speilvendt eller rotert utgave av den andre. Dette kalles **symmetri**. De tre kommende regelboksene definerer de tre variantene for symmetri, men merk dette: Symmetri blir som regel intuitivt forstått ved å studere figurer, men er omstendelig å beskrive med ord. Her vil det derfor, for mange, være en fordel å hoppe rett til eksemplene.

Språkboksen

En form som er en forskjøvet, speilvendt eller rotert utgave av en annen form, kalles en **kongruensavbilding**.

0.14 Translasjonssymmetri (parallellforskyvning)


En symmetri hvor minst to deler er forskjøyne utgaver av hverandre kalles en **translasjonssymmetri**.

Når en form forskyves, blir hvert punkt på formen flyttet langs den samme vektoren¹.


¹En vektor er et linjestykke med retning.

Eksempel

Figuren under viser $\triangle ABC$ og en blå vektor.



Figuren under viser $\triangle ABC$ forskjøvet med den blå vektoren.




0.15 Speiling

En symmetri hvor minst to deler er vendte utgaver av hverandre kalles en **speilingssymmetri** og har minst én **symmetrilinje** (**symmetriakse**).

Når et punkt speiles, blir det forskjøvet vinkelrett på symmetrilinja, fram til det nye og det opprinnelige punktet har samme avstand til symmetrilinja.


Eksempel 1

A , B , C og D er midtpunktene til sidene. Den røde linja og den blå linja er begge symmetrilinjer til det grønne rektangelet.



Eksempel 2

Under vises en form laget av punktene A, B, C, D, E og F , og denne formen speilet om den blå linja.



0.16 Rotasjonssymmetri

En symmetri hvor minst to deler er en rotert utgave av hverandre kalles en **rotasjonssymmetri** og har alltid et tilhørende **rotasjonspunkt** og en **rotasjonsvinkel**.


Når et punkt roteres vil det nye og det opprinnelige punktet

- ligge langs den samme sirkelbuen, som har sentrum i rotasjonspunktet.
- med rotasjonspunktet som toppunkt danne rotasjonsvinkelen.

Hvis rotasjonsvinkelen er et positivt tall, vil det nye punktet forflyttes langs sirkelbuen *mot* klokka. Hvis rotasjonsvinkelen er et negativt tall, vil det nye punktet forflyttes langs sirkelbuen *med* klokka.

Eksempel

Figuren under viser $\triangle ABC$ rotert 80° om rotasjonspunktet P .



Da er

$$PA = PA' \quad , \quad PB = PB' \quad , \quad PC = PC'$$

og

$$\angle APA' = \angle BPB' = \angle CPC' = 80^\circ$$