

0.1 Vektorfunksjoner (Parameteriseringer)

Vektorfunksjoner i rommet

I [TM1](#) så vi på todimensjonale vektorfunksjoner. Ved å legge til en z -komponent, får vi tredimensjonale vektorfunksjoner. I denne boka skal vi i tillegg se på vektorfunksjoner som kan ha flere enn én variabel.

0.1 Vektorfunksjoner i rommet

Gitt tre funksjoner $f(s, t)$, $g(s, t)$, og $h(s, t)$. En vektor $\vec{v}$ på formen

$$\vec{v} = [f(s, t), g(s, t), h(s, t)]$$

er da en vektorfunksjon i rommet.

Alternativt kan $\vec{v}$ skrives som


$$\vec{v}(s, t) : \begin{cases} x = f(s, t) \\ y = g(s, t) \\ z = h(s, t) \end{cases}$$

0.1.1 Linje i rommet

0.2 Linje i rommet

En linje $\vec{l}$ som går gjennom punktet $A = (x_0, y_0, z_0)$ og har retningsvektor $\vec{r} = [a, b, c]$ er gitt ved

$$\vec{l}(t) = A + t\vec{r} = [x_0 + at, y_0 + bt, z_0 + ct]$$



Eksempel

En linje går gjennom punktene $A = (-2, 2, 1)$ og $B = (2, 4, -5)$.

a) Finn en parameterisering for linja $\vec{l}$ som går gjennom A og

B .

b) Sjekk om punktet $C = (-5, 3, 6)$ ligger på linja.

Svar

a) $\overrightarrow{AB}$ er en retningsvektor for linja:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= [2 - (-2), 4 - 2, -5 - 1] \\ &= [4, 2, -6] \\ &= 2[2, 1, -3]\end{aligned}$$

Dette betyr at $\vec{r} = [2, 1, -3]$ også er en retningsvektor for linja. Følgelig er

$$\vec{l}(t) = A + t\vec{r} = [-2 + 2t, 2 + t, 1 - 3t]$$

Alternativt kan vi skrive

$$\vec{l}(t) : \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$$

b) Skal C ligge på l , må parameteriseringen gi oss koordinaten til C for rett valg av t . Skal for eksempel y -koordinaten bli riktig, må vi ha at

$$\begin{aligned}2 + t &= 3 \\ t &= 1\end{aligned}$$

For $t = 1$ blir $x = 0$, men x -koordinaten til C er -5 , altså ligger ikke C på linja.

0.2 Linje i rommet (forklaring)

Det todimensjonale tilfellet som er vist i [TM1](#) kan enkelt utvides til det tredimensjonale tilfellet. Dette er overlatt til leseren å vise.

0.1.2 Plan i rommet

Tenk at vi velger ut to ikke-parallelle vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ som de eneste vektorene vi tillater oss å følge i rommet. De uendelig mange punktene vi kan nå ved å følge $\vec{u}$ og $\vec{v}$ fra et startpunkt, utgjør da et **plan i rommet**. Vi sier at planet er *utspekt* av $\vec{u}$ og $\vec{v}$, som dermed er retningsvektorer for planet.

Gitt et plan $\alpha(s, t)$ utspekt av $\vec{u} = [a_1, b_1, c_1]$ og $\vec{v} = [a_2, b_2, c_2]$, der punktet $A = (x_0, y_0, z_0)$ ligger i planet.




Figure 1: Utklipp av planet α utspekt av vektorene $\vec{v}$ og $\vec{u}$.

Hvis vi ønsker å komme oss til et vilkårlig punkt $\alpha(s, t) = B = (x, y, z)$ i planet, kan vi starte i A og først vandre s lengder av $\vec{u}$, og deretter t lengder av $\vec{v}$. Altså er

$$\alpha(s, t) = B = A + s\vec{u} + t\vec{v}$$

0.3 Plan i rommet

Et plan α som inneholder punktet $A = [x_0, y_0]$, og som er utspekt av vektorene $\vec{u} = [a_1, b_1, c_1]$ og $\vec{v} = [a_2, b_2, c_2]$, er gitt ved

$$\alpha(s, t) = A + s\vec{u} + t\vec{v}$$

Eksempel 1

Et plan α inneholder punktene $A = (-2, 3, 5)$, $B = (-10, 1, 9)$ og $C = (0, 5, -4)$.

- Finn en parameterisering til planet.
- Sjekk om punktet $(4, 6, -6)$ ligger i planet.

Svar

- En vektor mellom to av punktene A , B og C er en retningsvektor for planet. Vi starter derfor med å finne to slike:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= [-10 - (-2), 1 - 3, 9 - 5] \\ &= 2[-4, -1, 2]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= [0 - (-2), 5 - 3, -4 - 5] \\ &= [2, 2, -9]\end{aligned}$$

Disse to vektorene er ikke parallelle, og dermed har vi at

$$\begin{aligned}\alpha(s, t) &= A + s \cdot \overrightarrow{AB} + t \cdot \overrightarrow{AC} \\ &= [-2 - 4s + 2t, 3 - s + 2t, 5 + 2s - 9t]\end{aligned}$$

Alternativt kan vi skrive

$$\alpha(s, t) : \begin{cases} x = -2 - 4s + 2t \\ y = 3 - s + 2t \\ z = 5 + 2s - 9t \end{cases}$$

- b) Vi starter med å finne en s og en t som oppfyller kravet for x og y -komponentene, og får da ligningssystemet

$$-2 - 4s + 2t = 4 \quad (\text{I})$$

$$3 - s + 2t = 6 \quad (\text{II})$$

Av (II) er $s = 2t - 3$. Dette uttrykket for s setter vi inn i (I), og får at

$$\begin{aligned}-2 - 4(2t - 3) + 2t &= 4 \\ -6t &= -6 \\ t &= 1\end{aligned}$$

Altså er $s = -1$ og $t = 1$. z -komponenten er da

$$5 + 2 \cdot (-1) - 9 \cdot 1 = -6$$

Kravet for z -komponenten er altså oppfylt, og punktet $(4, 6, -6)$ ligger derfor i planet.

Eksempel 2

Et plan α inneholder ei linje l og punktet $A = (-3, -2, 6)$. A ligger ikke på l . Finn en parameterisering til planet når l er gitt

som

$$l : \begin{cases} x = t \\ y = 5 + t \\ z = 6 + 4 \end{cases}$$

Svar

Siden l ligger i planet, må en retningsvektor til l også være en retningsvektor for planet. Av parameteriseringen ser vi at en retningsvektor er $[1, 1, 4]$. Vi ser også at $(0, 5, 6)$ er et punkt som ligger på linja, og derfor også i planet. Vektoren mellom A og dette punktet må også være en retningsvektor (og er ikke parallell med $[1, 1, 4]$):

$$[-3 - 0, -2 - 5, 6 - 6] = -[3, 7, 0]$$

Parameteriseringen til planet blir altså

$$\alpha : \begin{cases} x = s + 3q \\ y = 5 + s + 7q \\ z = 6 + 4s \end{cases}$$

Merk: Vi har her introdusert variabelen q for å tydeliggjøre at variabelen for l og variablene for α er uavhengige av hverandre.

0.2 Ligninger til geometrier

0.2.1 Ligningen til et plan

En mer kompakt metode enn parameterisering er å beskrive et plan ved en ligning.




Figure 2: Punktene $A = (x_0, y_0, z_0)$ og $B = (x, y, z)$ i planet α med normalvektor $\vec{n} = [a, b, c]$.

Tenk at vi vet om et punkt $A = (x_0, y_0, z_0)$ som ligger i et plan α . Vi velger oss et vilkårlig punkt $B = (x, y, z)$ i planet. Vektoren $\vec{u}$ fra A til B blir da

$$\vec{u} = [x - x_0, y - y_0, z - z_0]$$

En vektor som står normalt på alle vektorer i planet kalles en **normalvektor**. Hvis $\vec{n} = [a, b, c]$ er en normalvektor for α , må vi ha at

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$$

$$[x - x_0, y - y_0, z - z_0] \cdot [a, b, c] = 0$$

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Om vi slår sammen alle konstantene til én konstant $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$, kan vi videre skrive

$$ax + bx + cz + d = 0$$

0.4 Ligningen til et plan i rommet

Et plan med normalvektor $\vec{n} = [a, b, c]$ kan uttrykkes ved ligningen

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \quad (1)$$

hvor $A = (x_0, y_0, z_0)$ er et vilkårlig punkt i planet.

Eventuelt kan man skrive

$$ax + by + cz + d = 0 \quad (2)$$

hvor $-(ax_0 + by_0 + cz_0) = d$.

Eksempel 1

Et plan er utspent av vektorene $\vec{u} = [1, -2, 2]$ og $\vec{v} = [-3, 3, 1]$ og inneholder punktet $A = (-3, 3, 4)$. Finn en ligning for planet.

Svar

En normalvektor til planet kan vi finne ved

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & -2 & 2 \\ -3 & 3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-2 \cdot 1 - 3 \cdot 2)\vec{e}_1 - (1 \cdot 1 - (-3) \cdot 2)\vec{e}_2 + (1 \cdot 3 - (-2) \cdot (-3))\vec{e}_3 \\ &= [-8, -7, -3] \\ &= -[8, 7, 3]\end{aligned}$$

Vi har nå en normalvektor og et punkt i planet, og får dermed ligningen

$$\begin{aligned}8(x + 3) + 7(y - 3) + 3(z - 4) &= 0 \\ 8x + 24 + 7y - 21 + 3z - 12 &= 0 \\ 8x + 7y + 3z - 9 &= 0\end{aligned}$$

Eksempel 2

Et plan α er gitt ved ligningen

$$3x - y - 2z + 6 = 0$$

- a) Finn en parameterisering til planet.
- b) Finn et punkt som ligger i planet.

Svar

- a) For å finne en parameterisering til et plan gitt av en ligning, står vi fritt til selv å velge to av x, y og z som lik hver av parameteriseringsvariablene. Vi velger her $x = s$ og $z = t$, og får at

$$\begin{aligned} 3s - y - 2t + 6 &= 0 \\ y &= 3s + 2t - 6 \end{aligned}$$

Parameteriseringen blir da

$$\alpha : \begin{cases} x = s \\ y = -6 + 3s + 2t \\ z = t \end{cases}$$

- b) Ut ifra parameteriseringen ser vi at et punkt i planet må være $(0, -6, 0)$

Eksempel 3

Et plan α gitt ved ligningen $2x - 3y - 3z - 11 = 0$ møter en linje $\vec{l}$ i et punkt A . Finn koordinatene til A når $\vec{l}$ er gitt ved

$$\vec{l}(t) : \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = -1 + t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$$

Svar

I punktet A må parameteriseringen til linja oppfylle ligningen til

planet. Vi må altså ha at

$$\begin{aligned} 2(-1 - 2t) - 3(-1 + t) - 3(1 + 2t) - 11 &= 0 \\ -2 - 4t + 3 - 3t - 3 - 6t - 11 &= 0 \\ -13t - 13 &= 0 \\ t &= -1 \end{aligned}$$

Koordinatene til A blir da

$$\begin{aligned} A &= (-1 - 2(-1), -1 + (-1), 1 + 2(-1)) \\ &= (1, -2, -1) \end{aligned}$$

0.2.2 Linja mellom to plan

Gitt to ikke-parallelle plan, det ene med normalvektor $\vec{n}_1$ og det andre med normalvektor $\vec{n}_2$. Planene vil skjære hverandre langs ei linje med en retningsvektor som må ligge i begge planene. Dette innebærer at retningsvektoren står normalt på både $\vec{n}_1$ og $\vec{n}_2$, med andre ord må¹ $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ være en retningsvektor for linja.




Figure 3: Skjæringslinje mellom to plan.

0.5 Linja mellom to plan

Gitt to ikke-parallelle plan, det ene med normalvektor $\vec{n}_1$ og det andre med normalvektor $\vec{n}_2$. Planene skjærer da hverandre langs ei linje med retningsvektor $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

¹Alle vektorer som står normalt på både $\vec{n}_1$ og $\vec{n}_2$ er parallelle med vektoren $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ (se s. ??).

Eksempel

To plan α og β er gitt ved

$$\alpha : \quad -2x + y + z - 2 = 0$$

$$\beta : \quad x - y - z = 0$$

Planene skjærer hverandre langs ei linje l , finn en parameterisering for linja.

Svar

Vi starter med å finne en retningsvektor for linja. Av ligningene til planene ser vi at α har normalvektor $[-2, 1, 1]$, mens β har normalvektor $[1, -1, -1]$. En retningsvektor for linja er derfor gitt ved

$$[-2, 1, 1] \times [1, -1, -1] = [0, -1, 1]$$

Nå gjenstår å finne et punkt som ligger i begge planene. Vi bestemmer da én av koordinatene og løser det resulterende ligningssystemet. For enkelhetsskyld er det naturlig å velge at én av koordinatene er 0, men vi må da være litt varsomme. Av ligningene til α og β ser vi for eksempel at hvis vi setter $x = 0$, får vi et uløselig ligningssystem, mens $y = 0$ gir et løselig et. For $y = 0$ får vi at

$$-2x + z - 2 = 0 \tag{I}$$

$$x - z = 0 \tag{II}$$

Ved å løse dette ligningssystemet finner vi at $x = -2$ og $z = -2$, altså ligger punktet $(-2, 0, -2)$ i begge planene. En parameterframstilling av l blir derfor

$$l : \begin{cases} x = -2 \\ y = -t \\ z = -2 + t \end{cases}$$

0.2.3 Kuleligningen

Gitt en kule med sentrum $S = (x_0, y_0, z_0)$ og et vilkårlig punkt $A = (x, y, z)$, som ligger på kula.




Figure 4: Kule med sentrum $S = (x_0, y_0, z_0)$. Punktet $A = (x, y, z)$ ligger på kula.

Lengden til $\overrightarrow{SA}$ er da lik radien r til kula, og dermed har vi at

$$\begin{aligned} r &= |\overrightarrow{SA}| \\ r &= \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} \\ r^2 &= (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \end{aligned}$$

0.6 Kuleligningen

Ligningen for en kule med radius r og sentrum $S = (x_0, y_0, z_0)$ er gitt ved

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2 \quad (3)$$

Språkboksen

Overflaten som dannes av alle punktene som oppfyller kuleligningen kalles **kuleflaten**.

Eksempel 1

En kule er beskrevet ved ligningen

$$x^2 - 6x + y^2 + 4y + z^2 - 4z - 19 = 0$$

- Finn sentrum S og radiusen til kula.
- Vis at punktet $A = (7, -6, 4)$ ligger på kuleflaten.

c) Finn tangentplanet til kuleflaten i punktet A .

Svar

a) For å løse denne oppgaven må vi finne de fullstendige kvadratene:

$$x^2 - 6x = (x - 3)^2 - (-3)^2$$

$$y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 2^2$$

$$z^2 - 4z = (z - 2)^2 - (-2)^2$$

Dermed får vi at

$$x^2 - 6x + y^2 + 4y + z^2 - 4z - 19 = 0$$

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 2)^2 - 3^2 - 2^2 - 2^2 - 19 = 0$$

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 2)^2 = 36 \\ = 6^2$$

Kula har altså sentrum i $(3, -2, 2)$ og radius lik 6.

b) Skal A ligge på kula, må koordinatene til A oppfylle kuleligningen:

$$(7 - 3)^2 + (-6 + 2)^2 + (4 - 2)^2 = 36$$

$$4^2 + (-4)^2 + 2^2 = 36$$

$$36 = 36$$

Dermed har vi vist det vi skulle.

c) Tangentplanet står normalt på kuleflaten i A , og har derfor $\overrightarrow{SA}$ som normalvektor:

$$\overrightarrow{SA} = [7 - 3, -6 - (-2), 4 - 2]$$

$$= [4, -4, 2]$$

$$= 2[2, -2, 1]$$

Altså er $[2, -2, 1]$ en normalvektor for tangentplanet. Av (1) kan dette planet uttrykkes ved ligningen

$$2(x - 7) - 2(y - (-6)) + 1(z - 4) = 0$$

$$2(x - 7) - 2(y + 6) + 1(z - 4) = 0$$

$$2x - 14 - 2y - 12 + z - 4 = 0$$

$$2x - 2y - z - 30 = 0$$

Eksempel 2

En kuleflate er gitt ved ligningen

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 2)^2 = 3^2$$

I to punkt skjærer kuleflaten ei linje l parameterisert ved

$$l : \begin{cases} x = -4 - 2t \\ y = 5 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

Finn skjæringspunktene mellom kuleflaten og l .

Svar

Metode 1

Der hvor kuleflaten skjærer linja, må parameteriseringen til linja oppfylle kuleligningen:

$$\begin{aligned} ((-4 - 2t) + 2)^2 + ((5 + 2t) - 3)^2 + ((3 + t) - 2)^2 &= 9^2 \\ (-2(t + 1))^2 + (2(t + 1))^2 + (t + 1)^2 &= 9^2 \\ 9(t + 1)^2 &= 9^2 \\ t + 1 &= \pm 3 \\ t &= \pm 3 - 1 \end{aligned}$$

Altså er $t \in \{-4, 2\}$. For $t = -4$ får vi punktet $(4, -3, -1)$ og for $t = 2$ får vi punktet $(-8, 9, 5)$.

Metode 2

$[-2, 2, 1]$ er en retningsvektor for linja og har lengde 3. Vektoren $\frac{1}{3}[-2, 2, 1]$ er derfor også en retningsvektor, men har lengde 1. Siden skjæringspunktene ligger på kula, må avstanden mellom disse og S tilsvare radien (altså 9). De to punktene må da være gitt av uttrykket

$$S \pm 9 \cdot \frac{1}{3}[-2, 2, 1] = (-2, 3, 2) \pm 3[-2, 2, 1]$$

Dette uttrykket gir de samme punktene som ved *Metode 1*.

0.3 Avstander mellom geometrier

0.3.1 Avstand mellom punkt og linje

Gitt en linje $\vec{l}$ i rommet, beskrevet av punktet A og en retningsvektor $\vec{r}$. I tillegg ligger et punkt B utenfor linja.




Figure 5: Punkt B en avstand h fra linja l .

Vi ønsker nå å finne den korteste avstanden fra B til linja. Denne avstanden identifiserer vi som høyden h i trekanten utspent av $\vec{r}$ og $\vec{AB}$. Av (??) har vi at arealet til trekanten er gitt ved uttrykket

$$\frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{r}|$$

Av den klassiske arealformelen for en trekant (se [MB](#)) er

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} |\vec{r}| h &= \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{r}| \\ h &= \frac{|\vec{AB} \times \vec{r}|}{|\vec{r}|} \end{aligned}$$

0.7 Avstand mellom punkt og linje

Avstanden h mellom et punkt B og en linje gitt av punktet A og retningsvektoren $\vec{r}$ er gitt som

$$h = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \vec{r}|}{|\vec{r}|} \quad (4)$$

Eksempel

Ei linje l går gjennom punktene $A = (-2, 4, 1)$ og $B = (-5, 7, -2)$. Finn avstanden mellom l og punktet $C = (1, 3, -2)$.

Svar

Vektoren mellom de to punktene er en retningsvektor for linja:

$$[-5 - (-2), 7 - 4, -2 - 1] = [-3, 3, -3] = 3[-1, 1, -1]$$

Altså er $\vec{r} = [-1, 1, -1]$ også en retningsvektor for linja. Vi har at

$$|\vec{r}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{3}$$

Videre har vi at

$$\overrightarrow{AC} = [1 - (-2), 3 - 4, -2 - 1] = [3, -1, -3]$$

Vi finner kryssproduktet av $\overrightarrow{AC}$ og $\vec{r}$:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 3 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} &= \vec{e}_x \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - \vec{e}_y \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + \vec{e}_z \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \vec{e}_x(1 - (-3)) - \vec{e}_y(-3 - 3) + \vec{e}_z(3 - 1) \\ &= [4, 6, 2] \end{aligned}$$

Da $[4, 6, 2] = 2[2, 3, 1]$, er

$$|\overrightarrow{AC} \times \vec{r}| = 2\sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2} = 2\sqrt{14}$$

Dermed er

$$h = \frac{2\sqrt{14}}{\sqrt{3}}$$

0.3.2 Avstand mellom punkt og plan

Når et punkt ligger over et plan, kan man trekke et linjestykke som står normalt på planet, og som har et endepunkt i A og et endepunkt i planet. Lengden til dette linjestykket er den korteste avstanden mellom punktet og planet.




Figure 6: Den korteste avstanden h mellom punktet A og planet (i blått).

0.8 Avstand mellom punkt og plan

Avstanden h mellom et punkt $A = (x_0, y_0, z_0)$ og et plan gitt av ligningen $ax + by + cz + d = 0$ er gitt ved

$$h = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \quad (5)$$

Eksempel

Finn avstanden mellom punktet $(-1, 4, 5)$ og planet gitt ved ligningen

$$2x - y + 3z - 21 = 0$$

Svar

Avstanden h er

$$\begin{aligned} h &= \frac{|2(-1) - 4 + 3 \cdot 5 - 21|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2}} \\ &= \frac{|-12|}{\sqrt{14}} \\ &= \frac{12}{\sqrt{14}} \end{aligned}$$

0.8 Avstand mellom punkt og plan (forklaring)




Figure 7: a) Vektoren mellom P_0 og P_1 har samme retning som $\vec{n}$. b) Vektoren mellom P_0 og P_1 har motsatt retning som $\vec{n}$.

Vi ønsker å finne avstanden mellom et punkt $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ og et plan α gitt ved ligningen

$$ax + by + cz + d = 0$$

I planet velger vi oss punktet $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ slik at $\overrightarrow{P_0P_1}$ er en normalvektor til planet (se figur 7). Siden P_0 ligger i planet, følger det at

$$\begin{aligned} ax_0 + by_0 + cz_0 + d &= 0 \\ d &= -(ax_0 + by_0 + cz_0) \end{aligned} \quad (6)$$

Normalvektoren gitt av ligningen til planet er $\vec{n} = [a, b, c]$.

Dermed er

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P_1} &= [a, b, c] \cdot [x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0] \\ &= a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) + c(z_1 - z_0) \\ &= ax_1 + by_1 + cz_1 + d \end{aligned} \quad (7)$$

Vi setter vinkelen mellom $\vec{n}$ og $\overrightarrow{P_0P_1}$ lik v . Fra definisjonen av skalarproduktet har vi at

$$|\vec{n}| |\overrightarrow{P_0P_1}| \cos v = \vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P_1}$$

Siden både $\vec{n}$ og $\overrightarrow{P_0P_1}$ er normalvektorer til planet, må vi ha at $v = \{0^\circ, 180^\circ\}$. Altså er $\cos v = \pm 1$. Følgelig har vi at

$$\begin{aligned} |\vec{n}| |\overrightarrow{P_0P_1}| \cos v &= |\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P_1}| \\ |\overrightarrow{P_0P_1}| &= \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P_1}|}{|\vec{n}|} \end{aligned}$$

Av (7) og regel ??

$$\left| \overrightarrow{P_0 P_1} \right| = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

0.4 Vinkler mellom geometrier

Når geometrier i rommet skjærer hverandre, danner de forskjellige vinkler mellom seg. Så lenge ikke annet er nevnt, vil det vi omtaler som *vinkelen mellom geometrier* være den minste vinkelen geometriene danner.

0.4.1 Vinkelen mellom to linjer




Figure 8: a) $\vec{r}_1$ og $\vec{r}_2$ utspenner vinkelen v . b) $\vec{r}_1$ og $\vec{r}_2$ utspenner vinkelen u .

Gitt to linjer m og l med hver sine retningsvektorer $\vec{r}_1$ og $\vec{r}_2$. Vi ønsker å finne den minste vinkelen mellom disse linjene. Vi lar u betegne den største vinkelen og v den minste vinkelen mellom linjene. Linjene danner et par av vinkelen u og et par av vinkelen v , mens retningsvektorene r_1 og r_2 vil utspenne enten u eller v (se figur 8).

Av (??) har vi at

$$\cos \angle(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2}{|\vec{r}_1| |\vec{r}_2|}$$

Vi vet at uttrykket over representerer cosinusverdien til u eller v , men ikke hvilken av dem. Siden $v = 180^\circ - u$, er $|\cos u| = |\cos v|$. Videre er $180^\circ \geq u \geq 90^\circ$ og $90^\circ \geq v \geq 0^\circ$. Altså er $\cos u \leq 0$ og $\cos v \geq 0$. Dette betyr at

$$\begin{aligned} \cos v &= |\cos \angle(\vec{r}_1, \vec{r}_2)| \\ &= \left| \frac{\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2}{|\vec{r}_1| |\vec{r}_2|} \right| \\ &= \frac{|\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2|}{|\vec{r}_1| |\vec{r}_2|} \end{aligned}$$

0.9 Vinkelen mellom to linjer

Vinkelen v mellom ei linje med retningsvektoren $\vec{r}_1$ og ei linje med retningsvektoren $\vec{r}_2$ er gitt ved ligningen

$$\cos v = \frac{|\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2|}{|\vec{r}_1||\vec{r}_2|} \quad (8)$$

Eksempel

Finn vinkelen mellom ei linje med retningsvektor $\vec{r}_1 = [4, 1, 1]$ og ei linje med retningsvektor $\vec{r}_2 = [-1, 0, 1]$.

Svar

Vi har at

$$|\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2| = [4, 1, 1] \cdot [-1, 0, 1] = -3$$

$$|\vec{r}_1| = \sqrt{4^2 + 1^2 + 1^2} = 3\sqrt{2}$$

$$|\vec{r}_2| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

For vinkelen v mellom linjene har vi at

$$\cos v = \frac{3}{3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

Altså er $v = 60^\circ$.

0.4.2 Vinkelen mellom to plan

Som vi har sett, vil skjæringspunktene mellom to plan danne ei linje (se figur 3). Om vi betrakter geometriene langsmed denne linja, vil planene selv framstå som to linjer som, analogt til forrige delseksjon, danner et par av to vinkler.




Figure 9: a) $\vec{n}_1$ og $\vec{n}_2$ utspenner vinkelen v . b) $\vec{n}_1$ og $\vec{n}_2$ utspenner vinkelen u .

Gitt to plan α og β med hver sine normalvektorer $\vec{n}_1$ og $\vec{n}_2$. De to linjene som går gjennom normalvektorene utspenner de to samme vinkelparene som de skjærende planene¹. Resonnementet for å finne den minste vinkelen blir derfor helt likt det vi brukte da vi kom fram til ligning (8).

0.10 Vinkelen mellom to plan

Vinkelen v mellom et plan med normalvektoren $\vec{n}_1$ og et plan med normalvektoren $\vec{n}_2$ er gitt ved ligningen

$$\cos v = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} \quad (9)$$

0.4.3 Vinkelen mellom plan og linje




Figure 10: a) $\vec{n}$ og $\vec{r}$ utspenner vinkelen $w < 90^\circ$. b) $\vec{n}$ og $\vec{r}$ utspenner vinkelen $m > 90^\circ$.

Når ei linje med retningsvektor $\vec{r}$ og et plan med normalvektor $\vec{n}$ skjærer hverandre, vil de respektive linjene gjennom retningsvektoren og normalvektoren danne to vinkler w og m (se figur 10).

Vi lar w være den minste av disse to vinklene, da tilsvarende $|\cos \angle(\vec{n}, \vec{r})|$ cosinusverdien til w . Hvis vi setter den minste vinkelen dannet av planet og linja lik v , har vi at

$$v = 90^\circ - w$$

¹Hvis vi roterer begge planene 90° til høyre, må vinklene de utspenner forbli de samme. Og ved dette tilfellet ligger planene på linje med sine opprinnelige normalvektorer, som derfor utspenner de samme vinkelparene.

0.11 Vinkel mellom plan og linje

Vinkelen v mellom et plan med normalvektor $\vec{n}$ og ei linje med retningsvektor $\vec{r}$ er gitt som

$$v = 90^\circ - w \quad (10)$$

hvor w er gitt ved ligningen

$$\cos w = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{r}|}{|\vec{n}| |\vec{r}|} \quad (11)$$