

Oppgaver for kapittel 0

0.2.1

Finn lengden til vektorene:

a) $[-2, 1, 5]$ b) $[\sqrt{3}, 2, \sqrt{2}]$

0.2.2

Hvilket av punktene $B = (3, -2, 1)$ og $C = (0, 5, 6)$ ligger nærmest punktet $A = (1, -1, -2)$?

0.2.3

Gitt vektoren

$$\vec{u} = [ad, bd, cd]$$

Vis at

$$|\vec{u}| = |d|\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

0.3.1

Gitt vektorene

$$\vec{u} = [ad, bd, cd] \text{ og } \vec{v} = [eh, fh, gh]$$

Vis at

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = dh[a, b, c] \cdot [e, f, g]$$

0.3.2

Finn skalarproduktet av vektorene:

a) $\vec{a} = [2, 4, 6]$ og $\vec{b} = [-5, 0, -1]$

b) $\vec{a} = [-9, 1, 5]$ og $\vec{b} = [-2, 1, -2]$

c) $\vec{a} = \left[\frac{1}{5}, \frac{3}{5}, -\frac{1}{5}\right]$ og $\vec{b} = [512, -128, 64]$.

Tips: Bruk resultatet fra [oppgave 0.3.1](#).

0.3.3

$\vec{a}$ og $\vec{b}$ danner vinkelen θ . Finn verdien til $\vec{a} \cdot \vec{b}$ når

- a) $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 2$ og $\theta = 60^\circ$
- b) $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 2$ og $\theta = 150^\circ$

0.3.4

Finn vinkelen $\vec{a}$ og $\vec{b}$ danner når

- a) $\vec{a} = [5, -5, 2]$ og $\vec{b} = [3, -4, 5]$
- b) $\vec{a} = [2, -1, -3]$ og $\vec{b} = [-1, -3, -2]$
- c) $\vec{a} = [-1, -2, 2]$ og $\vec{b} = [-3, 5, -4]$

0.3.5

Forkort uttrykkene når du vet at $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$, $|\vec{c}| = 5$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ og $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$.

- a) $\vec{b} \cdot (\vec{a} + \vec{c}) + 3(\vec{a} + \vec{b})^2$
- b) $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2$

0.4.1

Avgjør om $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er ortogonale når

- a) $\vec{a} = [2, 4, -2]$ og $\vec{b} = [3, 1, 1]$
- b) $\vec{a} = [-18, 12, 9]$ og $\vec{b} = [1, -2, 1]$
- c) $\vec{a} = [5, 5, -1]$ og $\vec{b} = [5, -4, 5]$

0.4.2

Gitt vektoren $\vec{u} = [-5, -1, 6]$. Finn t slik at $\vec{u} \perp \vec{v}$ når

- a) $\vec{v} = [t, 3t, 2]$
- b) $\vec{v} = [t, t^2, 1]$

0.4.3

Vis at $(\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{u} - |\vec{u}|^2\vec{v}$ står normalt på $\vec{u}$.

0.4.4

Sjekk om $\vec{a} \parallel \vec{b}$ når

a) $\vec{a} = [8, 4, -2]$ og $\vec{b} = [4, 2, 4]$

b) $\vec{a} = [-3, 5, 2]$ og $\vec{b} = \left[-\frac{9}{7}, \frac{15}{7}, \frac{6}{7}\right]$

0.4.5

Gitt vektoren

$$\vec{a} = [-3, 1, 8]$$

Om mulig, finn t slik at $\vec{a} \parallel \vec{b}$ når

a) $\vec{b} = [t + 3, 1 - t, -16]$ b) $\vec{b} = [t^2 + 2, t, -(5t^2 + 3)]$

0.4.6

Finn s og t slik at $\vec{u} = [4, 6 + s, -(s + t)]$ og $\vec{v} = \left[\frac{12}{7}, \frac{2t-9s}{7}, \frac{3s-t}{7}\right]$ er parallelle.

0.5.1

Vis at hvis $\vec{u} \parallel \vec{v}$, så er $\vec{u} \times \vec{v} = 0$

0.5.2

For to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er *Lagranges identitet* gitt som

$$|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$$

Bruk identiteten og definisjonen av skalarproduktet til å vise at

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \angle(\vec{u}, \vec{v})$$

0.5.3

Et tetraeted er dannet av vektorene $\vec{a} = [2, -2, 1]$, $\vec{b} = [3, -3, 1]$ og $\vec{c} = [2, -3, 2]$, hvor $\vec{a}$ og $\vec{b}$ danner grunnflaten.

- a) Vis at arealet av grunnflaten er $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
b) Vis at volumet av tetraetedet er $\frac{1}{6}$.

0.5.4

Et parallelepipedet er utspent av vektorene $\vec{a}$, $\vec{b}$ og $\vec{c}$. Vi har at $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, og at grunnflaten er utspent av $\vec{a}$ og $\vec{b}$.

a) Finn lengden av diagonalen til grunnflaten.

La θ være vinkelen mellom $\vec{a} \times \vec{b}$ og $\vec{c}$ og la $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$.

b) Lag en tegning og forklar hvorfor høyden h i parallelepipedet er gitt som

$$h = |\vec{c}| \cos \theta$$

c) Forklar hvorfor volumet V av parallelepipedet kan skrives som


$$V = |\vec{a} \times \vec{b}| |\vec{c}| \cos \theta$$

Gruble* 1 (R2H23)

Regn ut arealet til $\square ABCD$ når $A = (4, 4, 0)$, $B = (0, 4, 0)$, $C = (1, 3, 3)$ og $D = (3, 3, 3)$.

Gruble* 2 (R2V23)

Punktene $A = (0, 0, 0)$, $B = (0, 5, 0)$, $C = (4, 2, 0)$ og $T = (0, 0, 5)$ danner en pyramide, slik figuren viser.



a) Regn ut volumet til pyramiden.

b) Regn ut arealet til $\triangle BCT$.

c) Bestem avstanden fra punktet A til planet som går gjennom B , C og T .

Gruble 3

Gitt en trekant i rommet formet av vektorene $\vec{u}$ og $\vec{v}$. Vis at radien r til den omskrevne sirkelen til trekanten er gitt ved

$$r = \frac{|\vec{u}||\vec{v}||\vec{u} - \vec{v}|}{2|\vec{u} \times \vec{v}|}$$