

Judgement

(1 second, 64 megabytes)



“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร์”
พระคัมภีร์ไบเบิล – ยอห์น 3:16

TTG คือพระเจ้าผู้ทรงเมตตา เขาดูแลทุกสรรพสิ่งด้วยความรัก และพิพากษาการกระทำของทุกคนด้วยความเที่ยงธรรม โดยการที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับพระเจ้า TTG นั้น คุณจำเป็นต้องผ่านบททดสอบของเขาเพื่อเข้าไปยังแดนสวรรค์ โดยบททดสอบนั้นจะเป็นเอาค่าบุญ (Merit), บาป (Sin) และความรัก (Love) มาไว้บนตราซึ่งพิเศษที่มีสามแขน

การที่จะผ่านบททดสอบนี้ได้ ผู้ที่เข้าการทดสอบต้องมีค่าบุญ m , ค่าบาป s และค่าความรัก l เท่ากัน ด้วยความที่พระเจ้า TTG คือพระเจ้าผู้ทรงเมตตา เขาจึงอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการทดสอบสามารถลดค่าทั้งสามให้เท่ากันเพื่อผ่านการทดสอบได้ โดยหลักการดูลคือ ให้เลือกตราซึ่งสองแขนจากสามแขนมาเพื่อลดค่าไปอย่างละ 1 และเพิ่มค่าอีกแขนที่ไม่ได้เลือกตามจำนวนค่าที่ลดไป ตัวอย่างเช่น มีค่า (m, s, l) คือ $(1, 7, 4)$ วิธีการลดค่าทั้งสามคือ

- $(1, 7, 4) \rightarrow (1-1, 7-1, 4+2) \rightarrow (0, 6, 6)$ ลดค่า m, s อย่างละ 1 และเพิ่ม 2 ให้ค่า l
- $(0, 6, 6) \rightarrow (0+2, 6-1, 6-1) \rightarrow (2, 5, 5)$ ลดค่า s, l อย่างละ 1 และเพิ่ม 2 ให้ค่า m
- $(2, 5, 5) \rightarrow (2+2, 5-1, 5-1) \rightarrow (4, 4, 4)$ ลดค่า s, l อย่างละ 1 และเพิ่ม 2 ให้ค่า m

คุณคือผู้ช่วยของพระเจ้า TTG ในการพิพากษาผู้คนที่เข้ามาอยู่ในแดนสวรรค์ของเขาหน้าที่ของคุณคือช่วยตัดสินผู้เข้ารับการทดสอบว่าสามารถผ่านการทดสอบได้หรือไม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการทดสอบอยู่ทั้งหมด t คน ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถผ่านการทดสอบได้ให้ส่งออก “YES” ถ้าไม่ให้ส่งออก “NO”

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน t ($1 \leq t \leq 10^2$) — แทนจำนวนผู้คนที่เข้ารับการทดสอบ

บรรทัดแรกของแต่ละผู้เข้ารับการทดสอบ ระบุจำนวนเต็ม m, s, l ($1 \leq m, s, l \leq 10^9$) — แทนค่าบุญ ค่าบาป และค่าความรักตามลำดับ

ข้อมูลส่งออก

ส่งออกข้อความ t บรรทัดสำหรับแต่ละสถานการณ์ ให้ส่งออกข้อความ “YES” ถ้าหากว่าผ่านบททดสอบ หรือข้อความ “NO” ถ้าหากไม่ผ่านบททดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (100 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 14 11 14 10 19 7 5 6 10	YES YES NO
4 4 4 4 2 3 4 71 811 700 7 10 64	YES NO NO YES

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 3 คน

ผู้เข้ารับการทดสอบที่ 1 มีค่า (m, s, l) คือ $(14, 11, 14)$ ซึ่งสามารถผ่านการทดสอบได้โดยการ

- $(14, 11, 14) \rightarrow (14-1, 11+2, 14-1) \rightarrow (13, 13, 13)$ ลดค่า m, l อย่างละ 1 และเพิ่ม 2 ให้ค่า s ทั้งสามค่าเท่ากัน ผ่านการทดสอบจึงส่งออก “YES”

ผู้เข้ารับการทดสอบที่ 2 มีค่า (m, s, l) คือ (10, 19, 7) ซึ่งสามารถผ่านการทดสอบได้โดยการ

- (10, 19, 7) $\rightarrow$ (10-1, 19-1, 7+2) $\rightarrow$ (9, 18, 9)
- (9, 18, 9) $\rightarrow$ (9+2, 18-1, 9-1) $\rightarrow$ (11, 17, 8)
- (11, 17, 8) $\rightarrow$ (11-1, 17-1, 8+2) $\rightarrow$ (10, 16, 10)
- (10, 16, 10) $\rightarrow$ (10-1, 16-1, 10+2) $\rightarrow$ (9, 15, 12)
- (9, 15, 12) $\rightarrow$ (9+2, 15-1, 12-1) $\rightarrow$ (11, 14, 11)
- (11, 14, 11) $\rightarrow$ (11-1, 14-1, 11+2) $\rightarrow$ (10, 13, 13)
- (10, 13, 13) $\rightarrow$ (10+2, 13-1, 13-1) $\rightarrow$ (12, 12, 12)

ทั้งสามค่าเท่ากัน ผ่านการทดสอบจึงส่งออก “YES”

ผู้เข้ารับการทดสอบที่ 3 มีค่า (m, s, l) คือ (5, 6, 10) ไม่สามารถทำให้ทั้งสามค่าเท่ากันได้ ไม่ผ่านการทดสอบ จึงส่งออก “NO”

src : <https://thefour.com/th-th/>