

Projekt C

Sebastian O. Jensen, GJX 653

7. januar 2015

1 Opgave

- (a) Det karakteristiske polynomie $p(\lambda)$ for A er givet ved

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 0 \\ -6 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix}$$
$$\begin{aligned} p(\lambda) &= (\lambda - 3)(\lambda - 2)(\lambda + 1) + (1 \cdot 0 \cdot 0) + (0 \cdot (-6) \cdot 0) - \\ & (0 \cdot (\lambda - 2) \cdot 0) - (0 \cdot 0 \cdot (\lambda - 3)) - ((\lambda + 1)(-6)(-1)) = \\ & (\lambda - 3)(\lambda - 2)(\lambda + 1) - ((\lambda + 1) \cdot (-6) \cdot (-1)) = \\ & (\lambda - 3)(\lambda - 2)(\lambda + 1) - (6\lambda + 6) = \\ & (\lambda^2 - 5\lambda + 6)(\lambda + 1) - (6\lambda + 6) = \\ & \lambda^3 + \lambda^2 - 5\lambda^2 - 5\lambda + 6\lambda + 6 - 6\lambda - 6 = \\ & \lambda^3 - 4\lambda^2 - 5\lambda = (\lambda)(\lambda + 1)(\lambda - 5) \end{aligned}$$

Hermed har vi fundet det karakteristiske polynomie

- (b) Fra faktoriseringen i opgave a kan jeg aflæse røderne til det karakteristiske polynomie til at være 0 -1 og 5, hvilket derfor er eigenverdierne for A
- (c) For vær eigenverdi findes den reducerede matrice af $A - \lambda I_3$ hvorefter eigenvektorene aflæses

$$A + 1I_3 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 6 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow E_{-1} = t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A - 0I_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow E_0 = t \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A - 5I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 6 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow E_5 = t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A - \lambda I_3 = \begin{pmatrix} -(\lambda - 3) & 1 & 0 \\ 6 & -(\lambda - 2) & 0 \\ 0 & 0 & -(\lambda + 1) \end{pmatrix} \Rightarrow E_{-1} = t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Hermed er de 3 egenvektore fundet.

2 Opgave

- (a) Determinanten af koeficientmatricen findes ved følgende udtryk

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{22}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} =$$

$$1 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \cdot (-2) + 1 \cdot 4 \cdot 4 - 1 \cdot (-1) \cdot 4 - 3 \cdot 4 \cdot 2 - 1 \cdot 2 \cdot (-2) = 10$$

- (b) Lad koeficientmatricen være givet ved A

$$\det(A_{31}) = 3 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 = -5$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \cdot -5 = -5$$

Da $\text{adj} A = C^T$ hvor C er kofactor matricen til A vil

$$\text{adj} A_{13} = C_{31} = -5$$

Af adjoint formelen følger

$$A^{-1} = \frac{\text{adj} A}{\det(A)}$$

Elementet i den inverse matrix til koeficientmatricen i række 1 søjle 3 er derfor givet ved følgende

$$A_{13}^{-1} = \frac{1}{10} \cdot -5 = -1/2$$

- (c) vha. Cramers formel løses ligningssystemet. Først findes determinanten til A_1 , A_2 og A_3

$$\det A_1 = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -5$$

$$\det A_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 5$$

$$\det A_2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -10$$

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{-5}{10} = -1/2$$

$$x_2 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{5}{10} = 1/2$$

$$x_3 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{-10}{10} = -1$$

ligningsystemet er hermed løst.

(d) Der gælder følgende

$$\det(EA) = \det(E)\det(A)$$

$$\det(A^T) = \det(A)$$

$$\det(A) = -\det(A)$$

Hvor A_1 er A hvor to rækker er ombyttet Determinanten af matrixproduktet er derfor givet ved følgende

$$10 \cdot (-10) \cdot 10 = 1000$$

3 Opgave

(a) (i)

$$HB1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 12 & 3 \\ 4 & 4 & 8 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 8 \\ 17 & 27 & 12 \\ 13 & 23 & 4 \end{pmatrix}$$

$$HB2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 12 & 2 \\ 4 & 4 & 8 \\ 3 & 3 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 8 \\ 17 & 27 & 12 \\ 13 & 23 & 4 \end{pmatrix}$$

- (ii) Matricen H er ikke velgenet som krypteringsmatrice da den ved kryptering giver den samme krypterede matrix for 2 forskellige beskeder. For at krypteringen skal virke skal følgende udtryk

$$HB = B_c$$

Have en unik løsning, hvor B er den ukrypterede matrix og B_c er den krypterede matrix. I følge Theorem 2.9 er dette kun gældende hvis H er invertible. Da H ikke er invertible er den ikke egnen som krypterings matrice.

- (i) Først findes $\det A$ ved produktet af main diagonalen til den forward reducerede matrice af H

$$\det A = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

$\text{adj} A$ findes ved C^T hvor C er matricen af cofactore til H

$$M_{1,1} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

$$C_{1,1} = (-1)^{1,1} M_{1,1} = -1$$

$$M_{1,2} = \begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -4$$

$$C_{1,2} = (-1)^{1,2} M_{1,2} = 4$$

$$M_{1,3} = \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2$$

$$C_{1,3} = (-1)^{1,3} M_{1,3} = -2$$

$$M_{2,1} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$C_{2,1} = (-1)^{2,1} M_{2,1} = 0$$

$$M_{2,2} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1$$

$$C_{2,2} = (-1)^{2,2} M_{2,2} = 1$$

$$M_{2,3} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$C_{2,3} = (-1)^{2,3} M_{2,3} = 0$$

$$M_{3,1} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 1$$

$$C_{3,1} = (-1)^{3,1} M_{3,1} = 1$$

$$M_{3,2} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$C_{3,2} = (-1)^{3,2} M_{3,2} = 0$$

$$M_{3,3} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$C_{3,3} = (-1)^{3,3} M_{3,3} = 1$$

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C^T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H^{-1} = \frac{C^T}{\det A} = 1 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

H^{-1} er hermed fundet

(ii) Der benyttes en matrix udregner til at udregne følgende

$$H^{-1}M = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 \\ 2 & 33 & 20 \\ 9 & 14 & 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 19 & 19 \\ 14 & 13 & 28 \\ 3 & 24 & 17 \end{pmatrix}$$

Hvilket giver beskeden

“godtnytår”

4 Opgave

- (a) betingelsen i linje 3 er sand når input matricen ikke er kvadratisk. Dvs. hvis ikke antalet af rækker er det samme som antalet af søjler.
- (b) Linje 10 undersøger om matricen har 1 række er det tilfældet er det en 1x1 matirx da der nå programmet når her til kun kan være tale om en kvadratisk matrice. Linje 11 lægger talet fra matricen i variabelen v.
- (c) I linje 13 slettes række 1 fra matricen. Hvis der fandtes en methode deleteRow() kunne denne have været benyttet i stedet.
- (d) Filen ProjectD er programmet der definere A og udskriver detA. Den beytter sig af den udleveret klasse Matrix.java. udskriften af kørslen er følgende

OPGAVE 4 d

Matrix A =

[1.0 2.0 3.0 4.0 5.0]

[6.0 7.0 8.0 10.0 9.0]

[11.0 12.0 13.0 14.0 15.0]

[16.0 17.0 18.0 19.0 20.0]

[21.0 22.0 23.0 24.0 25.0]

detA = 0.0