

1.  $E(X_1)=E(X_2)=E(X_3)=\mu$ ,  $Var(X_1)=7$ ,  $Var(X_2)=13$ ,  $Var(X_3)=20$  일 때, 다음 추정량을 이용하여 모평균  $\mu$ 를 점추정하고자 한다.

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3), \quad \hat{\mu}_2 = \frac{X_1}{4} + \frac{X_2}{2} + \frac{X_3}{5}, \quad \hat{\mu}_3 = \frac{X_1}{3} + \frac{X_2}{4} + \frac{X_3}{5} + 2$$

(1) 불편추정량과 편의추정량을 구하여라.

(2) 불편추정량의 분산을 구하고, 최소분산추정량과 표준오차를 구하여라.

(sol)

(1)  $E[\hat{\mu}_1] = E[\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)] = \frac{1}{3}(E[X_1] + E[X_2] + E[X_3]) = \mu$  : 불편추정량

$$E[\hat{\mu}_2] = E[\frac{X_1}{4} + \frac{X_2}{2} + \frac{X_3}{5}] = \frac{1}{4}E[X_1] + \frac{1}{2}E[X_2] + \frac{1}{5}E[X_3] = (\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{5})\mu = \frac{19}{20}\mu$$
 : 편의추정량

$$E[\hat{\mu}_3] = E[\frac{X_1}{3} + \frac{X_2}{4} + \frac{X_3}{5} + 2] = \frac{1}{3}E[X_1] + \frac{1}{4}E[X_2] + \frac{1}{5}E[X_3] + E[2] = (\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5})\mu + 2 = \frac{47}{60}\mu + 2$$
 : 편의추정량

※  $\hat{\mu}_4 = \frac{1}{4}(X_1 + 2X_2 + X_3)$ 인 경우,  $E[\hat{\mu}_4] = E[\frac{1}{4}(X_1 + 2X_2 + X_3)] = \frac{1}{4}(E[X_1] + 2E[X_2] + E[X_3]) = \mu$  : 불편추정량

(2)  $Var[\hat{\mu}_1] = Var[\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)] = \frac{1}{9}(Var[X_1] + Var[X_2] + Var[X_3]) = \frac{1}{9}(7 + 13 + 20) = \frac{40}{9} \approx 4.44$

$$Var[\hat{\mu}_2] = Var[\frac{X_1}{4} + \frac{X_2}{2} + \frac{X_3}{5}] = \frac{1}{16}Var[X_1] + \frac{1}{4}Var[X_2] + \frac{1}{25}Var[X_3] = \frac{7}{16} + \frac{13}{4} + \frac{20}{25} = \frac{359}{80} = 4.4875$$

$$Var[\hat{\mu}_3] = Var[\frac{X_1}{3} + \frac{X_2}{4} + \frac{X_3}{5} + 2] = \frac{1}{9}Var[X_1] + \frac{1}{16}Var[X_2] + \frac{1}{25}Var[X_3] = \frac{7}{9} + \frac{13}{16} + \frac{20}{25} = \frac{1721}{720} \approx 2.39$$

$$Var[\hat{\mu}_4] = Var[\frac{1}{4}(X_1 + 2X_2 + X_3)] = \frac{1}{16}Var[X_1] + \frac{1}{4}Var[X_2] + \frac{1}{16}Var[X_3] = \frac{7}{16} + \frac{13}{4} + \frac{20}{16} = \frac{79}{16} = 4.9375$$

( $\therefore$ ) 최소분산추정량 :  $\hat{\mu}_3$

※  $\hat{\mu} = aX_1 + bX_2 + cX_3$  : 최소분산불편추정량

$$E[\hat{\mu}] = E[aX_1 + bX_2 + cX_3] = aE[X_1] + bE[X_2] + cE[X_3] = (a + b + c)\mu = \mu \Rightarrow a + b + c = 1 \text{ 이고,}$$

$$Var[\hat{\mu}] = Var[aX_1 + bX_2 + cX_3] = a^2 Var[X_1] + b^2 Var[X_2] + c^2 Var[X_3] = 7a^2 + 13b^2 + 20c^2$$

Lagrange Method를 이용하여 제한조건  $g(a, b, c) = a + b + c - 1 = 0$ 에서  $f(a, b, c) = 7a^2 + 13b^2 + 20c^2$ 의 최솟값구하기

$$F(a, b, c, \lambda) = (7a^2 + 13b^2 + 20c^2) + \lambda(a + b + c - 1)$$

$$F_a = 14a + \lambda = 0$$

$$F_b = 26b + \lambda = 0$$

$$F_c = 40c + \lambda = 0$$

$$F_\lambda = a + b + c - 1 = 0$$

$$\Rightarrow a = -\frac{1}{14}\lambda, \quad b = -\frac{1}{26}\lambda, \quad c = -\frac{1}{40}\lambda \text{ 이므로, } -\frac{1}{14}\lambda - \frac{1}{26}\lambda - \frac{1}{40}\lambda = 1 \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow \lambda = -\frac{3640}{491} \text{ 이므로, } a = \frac{260}{491}, \quad b = \frac{140}{491}, \quad c = \frac{91}{491}$$

( $\therefore$ ) 최소분산불편추정량은  $\hat{\mu} = \frac{260}{491}X_1 + \frac{140}{491}X_2 + \frac{91}{491}X_3$ 이다.

2.  $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 은  $(0, b)$ 에서 균등분포를 이루는 모집단으로부터 추출된 확률표본이고, 관찰값이 다음 표와 같다고 한다.

10, 7, 11, 12, 8, 8, 9, 10, 9, 13

(1) 모평균  $\mu$ , 모분산  $\sigma^2$ 의 불편추정값과 모표준편차  $\sigma$ 의 추정값을 구하여라.

(2) 모수  $b$ 의 불편추정값을 구하여라.

(sol)

(1) 표본평균  $\bar{x}$ 은 모평균  $\mu$ 의 불편추정량이다.

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = \frac{1}{10} (10 + 7 + 11 + 12 + 8 + 8 + 9 + 10 + 9 + 13) = 9.7$$

표본분산  $s^2$ 은 모분산  $\sigma^2$ 의 불편추정량이다.

$$\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (x_i - 9.7)^2 = \frac{32.1}{9} = 3.5667$$

표본표준편차  $s$ 는 모표준편차  $\sigma$ 의 편의추정량이다.

$$\hat{\sigma} = s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{32.1}{9}} = 1.889$$

(2) 모집단의 모평균은  $\mu = \frac{b+0}{2}$ 이고, 모평균의 불편추정값이  $\hat{\mu} = 9.7$ 이다.

$b$ 에 대한 불편추정값을  $\hat{b}$ 라고 하면,  $\hat{\mu} = \frac{\hat{b}-0}{2} = 9.7 \Rightarrow \hat{b} = 19.4$ 이다.

3. 상호대화식의 컴퓨터 시스템은 대단위 장치에서 사용이 가능하다. 시간당 수신된 신호수  $X$ 는 모수  $\lambda$ 인 푸아송분포에 따른다고 한다. 이때 수신된 신호 수에 대하여 다음 표본을 얻었다.

31, 28, 28, 25, 17, 26, 22, 10, 4, 27

(1) 모수  $\lambda$ 의 불편추정값을 구하여라.

(2) 30분당 수신된 평균 신호수의 불편추정값을 구하여라.

(sol)

(1)  $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 일 때, 모평균은  $\mu = \lambda$ 이고 표본평균  $\bar{x}$ 은 모평균  $\mu$ 의 불편추정량이다.

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = \frac{1}{10} (31 + 28 + 28 + 17 + 26 + 22 + 10 + 4 + 27) = 21.8$$

(2) 1시간당 수신된 평균 신호수가 21.8로 추정되므로, 30분당 평균 10.9회 신호가 수신될 것으로 추정된다.

4.  $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 은  $n=10$ 이고 미지의  $p$ 를 모수로 갖는 이항분포로부터 추출된 확률표본이라 한다.

1, 8, 2, 5, 7, 6, 2, 9, 4, 7

$\hat{p} = \frac{\bar{X}}{10}$ 이 모수  $p$ 에 대한 불편추정량임을 보이고, 관찰된 표본을 이용하여 모수  $p$ 에 대한 불편추정값을 구하여라.

(sol)

모든  $i$  ( $1 \leq i \leq 10$ )에 대하여,  $X_i \sim B(10, p)$ 이므로  $E[X_i] = 10p$ 이다.

$\bar{X} = \frac{1}{10}(X_1 + \dots + X_{10})$ 이므로,

$$E[\hat{p}] = E\left[\frac{\bar{X}}{10}\right] = \frac{1}{10} E[\bar{X}] = \frac{1}{10} \left\{ \frac{1}{10} (E[X_1] + \dots + E[X_{10}]) \right\} = p$$

이다.

관찰된 표본에 대한 모수  $p$ 의 불편추정값은  $\hat{p} = \frac{1}{10} \left\{ \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i \right\} = \frac{1}{100} (1 + 8 + 2 + 5 + 7 + 6 + 2 + 9 + 4 + 7) = 0.51$ 이다.

5. 강의실 옆의 커피 자판기에서 컵 한잔에 나오는 커피의 양을 조사하기 위하여 101잔을 조사한 결과 평균  $0.3\ell$ , 표준편차  $0.06\ell$ 이었다. 다음 각 조건 아래서 이 자판기에서 나오는 커피 한잔의 평균 양에 대한 95% 신뢰구간을 구하여라.

(1) 커피의 양은 정규분포에 따르며, 모표준편차  $\sigma=0.05\ell$ 로 알려져 있는 경우

(2) 커피의 양은 정규분포에 따르며, 모표준편차를 모르는 경우

(sol)

(1) 모분산  $\sigma^2=0.05^2$ 을 알고 있으므로,  $z$ -추정을 한다. 이때 95% 오차한계와 신뢰구간은 다음과 같다.

$$e_{95\%}=z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=z_{0.025}\frac{0.05}{\sqrt{101}}=(1.96)(0.004975)=0.00975$$

$$(\bar{x}-z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{x}+z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}})=(0.3-0.00975,0.3+0.00975)=(0.29025,0.30975)$$

(2) 모분산을 모르고 있으므로,  $t$ -추정을 한다. 이때 95% 오차한계와 신뢰구간은 다음과 같다.

$$e_{95\%}=t_{n-1,\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}=t_{100,0.025}\frac{0.06}{\sqrt{101}}=(1.984)(0.00597)=0.011845$$

$$(\bar{x}-t_{n-1,\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}},\bar{x}+t_{n-1,\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}})=(0.3-0.011845,0.3+0.011845)=(0.288155,0.311845)$$

6. 다음은 남자와 여자의 생존 연령을 조사한 자료이다.

남자 : 52, 60, 55, 46, 33, 75, 58, 57, 88, 56

여자 : 62, 58, 65, 56, 53, 45, 64, 77

(1) 두 그룹의 모분산이 동일하다는 조건 아래서 남자와 여자의 평균 생존 연령의 차에 대한 90% 신뢰구간을 구하여라.

(2) 두 그룹의 모분산의 비  $\sigma_1^2/\sigma_2^2$ 에 대한 90% 신뢰구간을 구하여라.

(sol)

(1) 남자와 여자의 평균생존연령과 표본분산을 구하면,

$$\bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = 58, \quad s_1^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (x_i - 58)^2 = 223.5556,$$

$$\bar{y} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 y_i = 60, \quad s_2^2 = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^8 (y_i - 60)^2 = 89.7143$$

이고, 합동표본분산은  $s_p^2 = \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} \{ (n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2 \} = \frac{1}{16} \{ 9(223.5556) + 7(89.7143) \} = 165$ 이다.

이때 90% 오차한계와 신뢰구간은 다음과 같다.

$$e_{90\%} = t_{n_1 + n_2 - 2, \alpha/2} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = t_{16, 0.05} \sqrt{165} \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{8}} = (1.745)(12.8452)(0.004975) = 10.6323$$

$$(\bar{x} - \bar{y} - e_{90\%}, \bar{x} - \bar{y} + e_{90\%}) = (-2 - 10.6323, -2 + 10.6323) = (-12.6323, 8.6323)$$

(2)  $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 이므로, 90% 신뢰구간은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \left( \frac{s_1^2/s_2^2}{f_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{s_1^2/s_2^2}{f_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right) &= \left( \frac{223.5556/89.7143}{f_{0.05}(9, 7)}, \frac{223.5556/89.7143}{f_{0.95}(9, 7)} \right) \\ &= \left( \frac{223.5556/89.7143}{3.6767}, \frac{223.5556/89.7143}{0.3037} \right) = (0.6777, 8.2051) \end{aligned}$$

7. 어떤 공장에서 생산되는 전자부품의 수명은 평균 14개월, 표준편차 1.4개월인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산되는 부품 7개를 선택하여 관측된 수명이

19.5, 23.2, 31.2, 34.5, 41.1, 31.2, 24.7

일 때, 모분산  $\sigma^2$ 에 대한 신뢰도 95% 신뢰구간을 구하여라.

(sol)

표본평균 :  $\bar{x} = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 x_i = 29.3429$ , 표본분산 :  $s^2 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^7 (x_i - \bar{x})^2 = 54.6495$

$V = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 이므로, 95% 신뢰구간은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \left( \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1, \alpha/2}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1, 1-(\alpha/2)}^2} \right) &= \left( \frac{6(54.6495)}{\chi_{6, 0.025}^2}, \frac{6(54.6495)}{\chi_{6, 0.975}^2} \right) \\ &= \left( \frac{6(54.6495)}{14.4494}, \frac{6(54.6495)}{1.2373} \right) = (22.6928, 265.0007) \end{aligned}$$

※ 주어진 표본의 신뢰구간은 모수의 참값을 포함하지 않는다.

8. 한 포대에 1kg인 설탕 16포대를 조사하여 평균 1.053kg, 표본표준편차 0.058kg을 얻었다.

(1) 모평균  $\mu$ 의 99% 신뢰구간을 구하여라.

(2) 모표준편차  $\sigma$ 의 99% 신뢰구간을 구하여라.

(3) 모평균  $\mu$ 의 99% 신뢰구간을 0.05이하로 하기 위한 표본의 크기를 구하여라.

(sol)

(1) 모분산을 모르고 있으므로,  $t$ -추정을 한다. 이때 99% 오차한계와 신뢰구간은 다음과 같다.

$$e_{95\%} = t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} = t_{15, 0.005} \frac{0.058}{\sqrt{16}} = (2.9467)(0.0145) = 0.04273$$

$$(\bar{x} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}) = (1.053 - 0.04273, 1.053 + 0.04273) = (1.010273, 1.095727)$$

(2) 표본의 개수가 10이상이므로, 모표준편차  $\sigma$ 의 99% 신뢰구간은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} (s \sqrt{\frac{n-1}{\chi_{n-1, \alpha/2}^2}}, s \sqrt{\frac{n-1}{\chi_{n-1, 1-(\alpha/2)}^2}}) &= (0.058 \sqrt{\frac{15}{\chi_{15, 0.005}^2}}, 0.058 \sqrt{\frac{15}{\chi_{15, 0.995}^2}}) \\ &= (0.058 \sqrt{\frac{15}{4.6009}}, 0.058 \sqrt{\frac{15}{32.8013}}) = (0.0392, 0.1047) \end{aligned}$$

(3) 모평균  $\mu$ 의 99% 신뢰구간의 길이는  $L = 2 t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$ 이므로,

$$L \leq 0.05 \text{ 이기 위해서는 } n \geq 4 \left( \frac{t_{15, 0.005} s}{0.05} \right)^2 = 4 \left( \frac{(2.947)(0.058)}{0.05} \right)^2 = 46.745 \text{ 이다.}$$

따라서 16개를 사전에 조사하였으므로 추가로 31개를 더 조사하면 된다.



9. 다음 표는 어느 대학에서 두 전공  $A, B$ 를 선택한 여학생 수  $(x_1, x_2)$ 를 조사한 자료이다.

$$\text{전공 } A : n_1=500, x_1=155$$

$$\text{전공 } B : n_2=350, x_2=92$$

이 자료를 기초로 두 전공을 선택하는 여성비율의 차  $p_1 - p_2$ 에 대한 99% 신뢰구간을 구하여라.

(sol)

전공  $A$ 와  $B$ 의 여성비율을 각각  $p_1, p_2$ 이라 하면, 두 전공의 여성비율에 대한 추정값은

$$\hat{p}_1 = \frac{155}{500} = 0.31, \quad \hat{p}_2 = \frac{92}{350} = 0.2628$$

이다. 이때 99% 오차한계와 신뢰구간은 다음과 같다.

$$e_{99\%} = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1 \hat{q}_1}{n_1} + \frac{\hat{p}_2 \hat{q}_2}{n_2}} = 2.58 \sqrt{\frac{(0.31)(0.69)}{500} + \frac{(0.2628)(0.7372)}{350}} = 0.0808$$

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - e_{99\%}, \hat{p}_1 - \hat{p}_2 + e_{99\%}) = (0.0472 - 0.0808, 0.0472 + 0.0808) = (-0.0336, 0.1280)$$

10. 어떤 도시에서 임의로 500가구를 관찰한 결과 98가구가 심야전기를 사용하고 있다고 한다.

(1) 이 자료를 기초로 이 도시의 심야전기를 사용하는 비율에 대한 99% 신뢰구간을 구하시오.

(2) 표본의 비와 모비율의 차가 0.05안에 있을 신뢰도가 97%가 되는 표본의 크기를 정하여라.

(sol)

(1) 모비율  $p$ 의 추정값은  $\hat{p} = \frac{98}{500} = 0.196$ 이고, 이때 99% 오차한계와 신뢰구간은 다음과 같다.

$$e_{99\%} = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} = 2.58 \sqrt{\frac{(0.196)(0.804)}{500}} = 0.0458$$

$$(\hat{p} - e_{99\%}, \hat{p} + e_{99\%}) = (0.196 - 0.0458, 0.196 + 0.0458) = (0.1502, 0.2418)$$

(2)  $|p - \hat{p}| \leq 0.05$ 이므로, 모비율  $p$ 의 97% 신뢰구간의 길이는  $L = 2z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} \leq 0.1$  이어야 한다.

$$L \leq 0.1 \text{ 이기 위해서는 } n \geq 4 \left( \frac{z_{0.015}}{0.1} \right)^2 \hat{p}\hat{q} = 4 \left( \frac{2.17}{0.1} \right)^2 (0.196)(0.804) = 296.8189 \text{ 이다.}$$

따라서  $n = 297$ 가구를 조사해야 한다.