
A Read quality before (open) and after (filled) trimming
W1
W2
W3
S1
S2
S3
88.2% (retained 91.5%)
91.5% (retained 96.9%)
95.2% (retained 97.6%)
95.9% (retained 98.8%)
92.2% (retained 97.3%)
92.0% (retained 97.5%)
85
90
95
100
Q30 bases (%)
B Host depletion
Host-aligned reads (%)
10^0
10^{-1}
0.60%
0.07%
Winter
Summer
C Signal collapses above 60% identity
Viral-like reads (%)
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
Mean of 6 samples
Individual samples
G1 threshold 0.01%
viral-like 0.692%
viral-specific 0.103%
structural only 0.0089%
no reads detected
id≥40 len≥30
id≥50 len≥40
id≥60 len≥50
id≥70 len≥50
id≥80 len≥50
id≥90 len≥50
Alignment stringency
D Half of the signal is host-derived metabolic genes; structural genes are only 1.3%
W1
W2
W3
S1
S2
S3
0
20
40
60
80
100
Composition of viral-like reads (%)
Structural / virion
Replication / transcription
Metabolic / housekeeping (host-derived)
Hypothetical / uncharacterized
Other annotated