

Математическая логика и теория алгоритмов

Сергей Григорян

20 ноября 2024 г.

Содержание

| | | |
|----------|------------------------------|----------|
| 1 | Лекция 10 | 3 |
| 1.1 | Напоминание | 3 |
| 2 | Лекция 11 | 5 |
| 3 | Лекция 12 | 8 |
| 3.1 | Метод автоморфизма | 8 |

1 Лекция 10

1.1 Напоминание

σ - сигнатура, сост. из функц. и пред. символов. и им соотв. валентности.

$\mu = (M, I_M)$, I_M - соотв. символам σ функций и предикатов

$$\pi: Var \rightarrow M$$

$$[\phi]_M(\pi) - ?$$

Рекурсия по постр. ϕ :

1)

$$\phi = P(t_1, \dots, t_n)$$

$$[\phi]_M(\pi) = [P]_M([t_1]_M(\pi), \dots, [t_n]_M(\pi))$$

2)

$$\phi = (\psi_0(\text{operation})\psi_1), \phi = \neg\psi - \text{аналогично.}$$

$\wedge, \vee, \rightarrow$

$$[\phi]_M(\pi) = \underset{OR, IMPL}{AND}([\psi_0]_M(\pi), [\psi_1]_M(\pi))$$

3)

$$\phi = \exists x, \psi$$

$$[\phi]_M(\pi) = 1 \iff \text{найдётся } a \in M, \text{ т. ч. } [\phi]_M(\pi_{x \mapsto a}) = 1$$

$$[\phi]_M(\pi) = \bigvee_{a \in M} [\phi]_M(\pi_{x \mapsto a})$$

$$\pi_{x \mapsto a}(y) = \begin{cases} \pi(y), y \neq x \\ a, y = x \end{cases}$$

4) Аналогично (3), но с \bigwedge вместо \bigvee

Определение 1.1. Параметры терма t :

1)

$$t = x \in Var \Rightarrow Par(t) = \{x\}$$

2)

$$t = c - \text{константа из } \sigma \Rightarrow Par(t) = \emptyset$$

3)

$$t = f(t_1, \dots, t_n), f - \text{функциональный символ вал-ти } n \Rightarrow \text{Par}(t) = \bigcup_{i=1}^n \text{Par}(t_i)$$

Определение 1.2. Параметры формулы ϕ :

1)

$$\phi = P(t_1, \dots, t_n) \Rightarrow \text{Par}(\phi) = \bigcup_{i=1}^n \text{Par}(t_i)$$

2)

$$\phi = \neg\psi \Rightarrow \text{Par}(\phi) = \text{Par}(\psi)$$

3)

$$\phi = (\psi_0(\text{operation})\psi_1) \Rightarrow \text{Par}(\phi) = \text{Par}(\psi_0) \cup \text{Par}(\psi_1)$$

$\wedge, \vee, \rightarrow$

4)

$$\phi = (\exists/\forall)x, \psi \Rightarrow \text{Par}(\phi) = \text{Par}(\psi) \cup \{x\}$$

Теорема 1.1. а) Если π, π' — оценки и для любой пер. $x \in \text{Par}(t), \pi(x) = \pi'(x)$, то $[t]_M(\pi) = [t]_M(\pi')$

б) Если π, π' — оценки, т. ч. для $\forall x \in \text{Par}(\phi), \pi(x) = \pi'(x)$ то $[\phi]_M(\pi) = [\phi]_M(\pi')$

Доказательство. а) Индукция по пост. t :

1)

$$t = x \Rightarrow [t]_M(\pi) = \pi(x) = \pi'(x) = [t]_M(\pi')$$

2)

$$t = c \Rightarrow [t]_M(\pi) = [c]_M = [t]_M(\pi')$$

3)

$$t = f(t_1, \dots, t_n), f - \text{функциональный символ вал-ти } n$$

$$\text{Par}(t_i) \subset \text{Par}(t)$$

$$\begin{aligned} [t]_M(\pi) &= [f]_M([t_1]_M(\pi), \dots, [t_n]_M(\pi)) = \\ &= [f]_M([t_1]_M(\pi'), \dots, [t_n]_M(\pi')) = [t]_M(\pi') \end{aligned}$$

b) Индукция по построению ϕ :

$$1) \quad \phi = P(t_1, \dots, t_n) \Rightarrow [\phi]_M(\pi) =$$

$$= [P]_M([t_1]_M(\pi), \dots, [t_n]_M(\pi)) = [P]_M([t_1]_M(\pi'), \dots, [t_n]_M(\pi')) = [\phi]_M(\pi')$$

$$2) \quad \phi = (\psi_0 \wedge \psi_1) \Rightarrow [\phi]_M(\pi) = AND([\psi_0]_M(\pi), [\psi_1]_M(\pi)) = And([\psi_0]_M(\pi'), [\psi_1]_M(\pi')) = [\phi]_M(\pi')$$

Аналогично для других операций и для отрицания.

$$3) \quad \phi = \exists x, \psi$$

$$Par(\phi) = Par(\psi) \setminus \{x\}$$

$$[\phi]_M(\psi) = \bigvee_{a \in M} [\phi]_M(\pi_{x \mapsto a}) = \bigvee_{a \in M} [\phi]_M(\pi'_{x \mapsto a}) = [\phi]_M(\pi')$$

$$4) \quad \phi = \forall x, \psi - \text{аналогично 3)}$$

□

2 Лекция 11

Определение 2.1. Предварённая нормальная формула :

$$\underbrace{\exists \forall \exists \forall \dots}_{\text{Кванторы}} \underbrace{(\dots)}_{\text{Бескванторная формула}}$$

Теорема 2.1. У любой ϕ -лы 1-ого порядка \exists эквив. ей формула в предв. нормальной форме.

Доказательство. Будем проводить эквив-ные преобразования:

$$1) \quad \neg \exists x \phi \sim \forall x \neg \phi$$

$$\neg \forall x \phi \sim \exists x \neg \phi$$

$$2) \quad (\forall x \phi \wedge \forall x \psi) \sim \forall x (\phi \wedge \psi)$$

$$(\exists x \phi \vee \exists x \psi) \sim \exists x (\phi \vee \psi)$$

$$3)$$

$$\exists x (\phi \wedge \psi) \rightarrow (\exists x \phi \wedge \exists x \psi)$$

Это не эквивалентность! Поэтому нельзя применять

$$(\forall x \phi \vee \forall x \psi) \rightarrow \forall x (\phi \vee \psi)$$

Нужно сделать замену переменной.

$$\exists x \phi \sim \exists y \phi(y/x)$$

Получили ф-лу ϕ с подстановкой y вместо x .

$\phi(y/x)$ — **все свободные вхожд. x замен-ся на y**

! При этом, эти вхождения не должны подпадать под д-ие кванторов по y , и y не входит свободно в ф-лу ϕ .

Рассм. примеры некорректных подстановок:

- 1) $\exists x \forall y A(x, y) \not\sim \exists y \forall y A(y, y)$
- 2) $\exists x A(x, y) \not\sim \exists y A(y, y)$

Иначе, замена на новую переменную корректна.

- 4) $(\exists x \phi) \wedge \psi \sim \exists x (\phi \wedge \psi)$, причём $x \notin Params(\psi)$

$(\exists x \phi \wedge \psi) \sim \exists y \phi(y/x) \wedge \psi \sim \exists y (\phi(y/x) \wedge \psi)$, если $x \in Params(\psi)$, y не встречается в ϕ и ψ

$\exists \phi \vee \psi \sim \exists x (\phi \vee \psi)$, \forall — аналог.

$$(\exists x \phi \rightarrow \psi) \sim \forall x (\phi \rightarrow \psi)$$

$$(\psi \rightarrow \exists x \phi) \sim \exists x (\psi \rightarrow \phi)$$

□

Замечание. Значение ф-лы зависит только от значения её параметров. \Rightarrow Ф-ла с k пар-рами при фикс. интерпретации задаёт k -местный предикат.

Определение 2.2. Предикат наз-ся **выразимым** в данной интерпретации, если его можно задать ф-лой 1-ого порядка.

Пример. $(\mathbb{N}, S, =)$, $S(n) = n + 1$. Тогда:

$$x = 0 \iff \neg \exists y: x = S(y)$$

$$x = 1 \iff \exists y: (x = S(y) \wedge \quad \quad \quad y = 0)$$

Здесь подставляем строчку выше

Пример. $(\mathbb{N}, \cdot, =)$

$$x = 0 \iff \forall y \cdot x = x$$

$$x = 1 \iff \forall y \cdot x = y$$

$$x : y \iff \exists z(x = y \cdot z)$$

$$p - \text{простое} \iff (p \neq 1 \wedge \forall q(p : q \rightarrow (q = 1 \vee q = p)))$$

$$d = \gcd(x, y) \iff (x : d \wedge y : d \wedge \forall k((x : k \wedge y : k) \rightarrow d : k))$$

$$d = \text{lcm}(x, y) \iff (c : x \wedge c : y \wedge \forall k((k : x \wedge k : y) \rightarrow k : c))$$

Пример. $(2^A, \subset)$

$$x = y \iff (x \subset y \wedge y \subset x)$$

$$x = \emptyset \iff \forall y : x \subset y$$

$$|x| = 1 \iff (\neg(x = \emptyset) \wedge \forall y(y \subset x \rightarrow (y = \emptyset \vee y = x)))$$

$$z = x \cup y \iff (x \subset z \wedge y \subset z \wedge \forall t((x \subset t \wedge y \subset t) \rightarrow (z \subset t)))$$

Пример. *Метрическая геометрия:*

$(\mathbb{R}^2, E), E(x, y)$ — значит, что $|x - y| = 1$, т. е. расстояние от точки x до $y = 1$

$$x = y \iff \forall z(E(x, z) \rightarrow E(y, z))$$

$$|x - y| = 2 \iff \exists! z(E(x, z) \wedge E(y, z))$$

Или:

$$\exists z((E(x, z) \wedge E(y, z)) \wedge \forall t((E(x, t) \wedge E(y, t)) \rightarrow t = z))$$

$$|x - y| = \sqrt{3}$$

Рисуем прямоугольный треугольник с гипотенузой длины $= 2$ и катетом длины $= 1$. Тогда катет от x до y имеет длину $\sqrt{3}$

$$\exists z \exists t(E(x, z) \wedge E(z, t) \wedge E(x, t) \wedge E(y, t) \wedge |y - z| = 2)$$

Пример. $(\mathbb{N}, S, =)$

$$y = x + k, k - \text{параметр}$$

$$y = S(S(S(\dots(S(x))))))$$

$k \text{ раз}$

$$y = x + k \iff \exists z(y = z + \frac{k}{2} \wedge z = x + \frac{k}{2})$$

$$\iff \exists z \forall u \forall v \left(((u = y \wedge v = z) \vee (u = z \wedge v = x)) \rightarrow u = v + \frac{k}{2} \right)$$

$$\text{len}(k) = \text{len}\left(\frac{k}{2}\right) + C$$

$$k = 1 \text{ — база индукции, } y = x + 1 \iff y = S(x)$$

Общая длина: $C \log_2 k$

$$k \text{ — нечётно} \Rightarrow y = x + k \iff \exists z (y = S(z) + \frac{k-1}{2} \wedge z = x + \frac{k-1}{2})$$

3 Лекция 12

$$\langle \mathbb{Z}, S, = \rangle$$

$$x = 0 \iff x + x = x$$

$$\langle \mathbb{N}, \cdot, = \rangle$$

3.1 Метод автоморфизма

Аддитивная ф-ция:

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

Лин. ф-ция:

$$f(\alpha \cdot x + \beta \cdot y) = \alpha f(x) + \beta f(y)$$

Мультипликативная ф-ция:

$$\phi(x \cdot y) = \phi(x) \cdot \phi(y)$$

Монотонная ф-ция:

$$x \leq y \iff f(x) \leq f(y)$$

Задана сигнатура (P, \dots, f, \dots) . Интерпретации с носит. A и B :

$$[P]_A, \dots, [f]_A \text{ и } [P]_B, \dots, [f]_B$$

$\gamma: A \rightarrow B$ — гомоморфизм, если

1) При всех $x_1, \dots, x_k \in A$.

$$[P]_A(x_1, \dots, x_k) \iff [P]_B(\gamma(x_1), \dots, \gamma(x_k))$$

"Предикаты сохраняются"

2) При всех $x_1, \dots, x_k \in A$:

$$\gamma([f]_A(x_1, \dots, x_k)) = [f]_B(\gamma(x_1), \dots, \gamma(x_k))$$

Для конст. симв.:

$$\gamma([c]_A) = [c]_B$$

Определение 3.1. Автоморфизм:

1) $A = B$

2) γ - биекция

Теорема 3.1 (Об автоморфизмах). Пусть A — интерпр. сигнатуры (P, \dots, f, \dots) , α — автоморфизм, Q — выражимый предикат. Тогда при всех $x_1, \dots, x_k \in A$:

$$Q(x_1, \dots, x_k) \iff Q(\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_k)) \quad (1)$$

Сл-ие, если при некот-ром автоморфизме α эквиваленция (1) неверна, то Q невыразим:

Пример. $(\mathbb{Z}, S, =)$

$$\alpha(x) = x + C$$

$$Q(x) \iff x : 2$$

Пример. $(\mathbb{Z}, +, =)$

$$\alpha(x) = -x$$

$$Q(x, y) \iff x > y$$

Пример.

$$n = 2^a \cdot 3^b \cdot k, k \not\vdash 2, k \not\vdash 3$$

$$\alpha(2^a \cdot 3^b \cdot k) = 2^b \cdot 3^a \cdot k$$

$$\alpha(0) = 0$$

$$Q(x, y) \iff x > y$$

Доказательство теоремы: Докажем индукцией по построению:

1) t — терм \Rightarrow при всех $x_1, \dots, x_k \in A$:

$$[t](\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_k)) = \alpha([t](x_1, \dots, x_k))$$

2) ϕ — ф-ла \Rightarrow При всех $x_1, \dots, x_k \in A$:

$$[\phi](\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_k)) \iff [\phi](x_1, \dots, x_k)$$

3) Переменная $\alpha(x) = \alpha(x)$, конст. символ $[c] = \alpha([c])$

Конст. символ: $[c] = \alpha([c])$

Сост. терм:

$$\begin{aligned} [f(t_1, \dots, t_m)](\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_k)) &= [f]([t_1](\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_k)), [t_m]) = \\ &= [f](\alpha([t_1](x_1, \dots, x_k)), \dots, \alpha([t_m](x_1, \dots, x_k))) = \\ &= \alpha([f]([t_1](x_1, \dots, x_k), [t_m](x_1, \dots, x_k))) = \\ &= \alpha([f(t_1, \dots, t_m)](x_1, \dots, x_k)) \end{aligned}$$

Атом. формулы — аналогично термам

$$\begin{aligned} \bigwedge_y [\phi](\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_k), y) &= \bigwedge_y [\phi](\alpha(x_1), \dots, \alpha(x_k), \alpha(y)) = \\ &= \bigwedge_y (x_1, \dots, x_k, y) = [\forall y, \phi](x_1, \dots, x_k) \end{aligned}$$

□

Пример.

$< \mathbb{N}, S, = >$ — нет автоморфизма, \leq — невыраз.

0 — выразим: $x = 0 \iff \neg \exists y: x = S(y)$

Следствие. Выразим $\phi < \mathbb{N}, S, = > \iff$ выразим $\phi < \mathbb{N}, S, 0, = >$

Теорема 3.2 (Об элиминации кванторов). Любая ф-ла $\phi < \mathbb{N}, S, 0, = >$ равна некот. бесквант. ф-ле

Следствие. $x \leq y$ не выраз. $\phi < \mathbb{N}, S, = >$

Доказательство. $x \leq y$ выразима в $\langle \mathbb{N}, S, = \rangle \Rightarrow x \leq y$ выразима в $\langle \mathbb{N}, S, 0, = \rangle$ бескванторной ф-лой, т. е. пропозиц. формулой, в к-рую, вместо переменных подставл. атомарн. формулы.

Ат. формулы:

$$S(S(\dots S(U))) = S(S(\dots S(v)))$$

u — переменная или 0, v — тоже

Значит $u = v + d, d \in \mathbb{Z}$ (ф-ла-комбинация кон. числа усл-ий)

d_1, \dots, d_n — все числа из усл.

$$M = \max \{ d_1, \dots, d_n \} + 1$$

Рассм $x = m, y = 2M$ и $x = 2M, y = M$

Все атом. ф-лы, кроме тожд. истины, будут ложны \Rightarrow комбинация прим. одинаковые значения:

Но $x \leq y$ верно для $x = M, y = 2M$ и неверно для $x = 2M, y = M \Rightarrow$ наша ф-ла не выр-ет $x \leq y$ □

Доказательство теоремы об элиминации. 1) Ат. ф-лы бескв.

2) $\phi \wedge \phi' \Rightarrow \neg \phi \wedge \neg \phi'$, аналог. для $\wedge, \vee, \rightarrow$

3) $\forall x \phi \sim \neg \exists x \neg \phi$

4) $\exists x \phi \sim \exists x$ ϕ'
бескванторный

Атомарные ф-лы, зависящие от x : $T, \perp, x = t_i$

□