



Glucose (Fasting Blood and CSF)

1. รายการตรวจ : Glucose (Fasting Blood and CSF)

2. 2.1) รหัสและราคา :

รายการ	รหัสโรงพยาบาล	รหัสกรมบัญชีกลาง	ราคา
Glucose Fasting Blood	1201	32203	40
Glucose CSF	1012	32202	40

2.2) ข้าราชการ/ประกันสังคม/ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เบิกจ่ายตามสิทธิ

2.3) ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

3 ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ

1) วินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของ carbohydrate metabolism เช่น โรคเบาหวาน หรือภาวะ hypoglycemia

2) ช่วยประเมินภาวะ glycosuria เมื่อตรวจในปัสสาวะ และประเมินภาวะ renal tubular defect

3) ช่วยวินิจฉัยแยกโรค meningitis เมื่อตรวจในน้ำไขสันหลัง

4) บอกความรุนแรงในภาวะที่มี pleural effusion

4 การเตรียมผู้ป่วย : ไม่มีบริโภคอาหารตามปกติในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนตรวจ และมีน้ำหนักตัวคงที่ งดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง และงด alcohol ในคืนก่อนตรวจ

5 สิ่งส่งตรวจ/ ปริมาณ และภาชนะที่ใช้เก็บ :

5.2 เลือด เลือด ปริมาณ 2 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารยับยั้ง glycolysis

ชนิด Sodium fluoride: NaF (จุกสีเทา)



5.3 CSF ปริมาณ 2 มิลลิตร นำส่งห้องปฏิบัติการทันที



ตัวอย่างหลอด NaF



ตัวอย่างภาชนะเก็บ CSF

6 การนำส่งและข้อควรระวังในการส่งสิ่งส่งตรวจ :

6.2 ค่ากลูโคสจะลดลง 5 – 10 mg/dL/hr ในเลือดที่ไม่ได้ปั่นแยกพลาสมาไม่ได้ใช้ sodium fluoride

6.3 CSF ต้องนำส่งทันทีหลังเก็บตัวอย่างส่ง

7 วันและเวลาที่ให้บริการ :

7.2 รับสิ่งส่งตรวจ : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

7.3 ตรวจวิเคราะห์ : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

8 ระยะเวลาการออกผลการตรวจ : ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ชั่วโมง

9 ค่าอ้างอิงและค่าวิกฤต :

9.1 ค่าอ้างอิงในพลาสมา NaF

อายุ ≤ 18 ปี 60 – 100 mg/dL

อายุ > 18 ปี 74 – 109 mg/dL

9.2 ค่าอ้างอิงน้ำไขสันหลัง

อายุ ≤ 18 ปี 60 – 80 mg/dL

อายุ > 18 ปี 40 – 70 mg/dL

9.3 ค่าวิกฤตในพลาสมา NaF

(เอกสารสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ถูกควบคุมให้เป็นปัจจุบันเมื่ออยู่บนเว็บไซต์เท่านั้น)



Low $\leq$ 60 mg/dl

High $\geq$ 500 mg/dl

10 วิธีการตรวจวิเคราะห์ : Enzymatic assay (Hexokinase)

11 สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ :

11.1 ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้

- 1) Icterus: Conjugated Bilirubin 60 mg/dL และ Unconjugated bilirubin 60 mg/dl
- 2) Hemolysis: Hemoglobin 1,000 mg/dL
- 3) Lipemia: L index ของเครื่องไม่เกิน 1,000 (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)

11.2 สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ gammopathy โดยเฉพาะชนิด IgM (Waldenström's macroglobulinemia) อาจมีผลต่อการทดสอบ (แต่พบกรณีได้น้อย)

12 ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ : ภายใน 24 ชั่วโมง

13 อื่น ๆ :