



Alkaline phosphatase

1. การทดสอบ : Alkaline phosphatase

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

1. Hepatobiliary disease
2. Skeletal disease

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือดปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) :

	ชาย	หญิง	
ผู้ใหญ่ (≥19 ปี)	40 – 129	35 – 104	U/L
เด็ก			
0 – 14 วัน	83 -248	83 - 248	U/L
15 วัน ถึง <1ปี	122 - 469	122 - 469	U/L
1 ปี ถึง <10 ปี	142 - 335	142 - 335	U/L
10 ปี ถึง <13 ปี	129 - 417	129 - 417	U/L
13 ปี ถึง <15 ปี	116 - 468	57 - 254	U/L
15 ปี ถึง <17 ปี	82 - 331	50 - 117	U/L
17 ปี ถึง <19 ปี	55 - 149	45 - 87	U/L

9. ค่าตรวจ (charge) : 55 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Colorimetric assay

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

1. ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus : Bilirubin 60 mg/dL





- Hemolysis : Hemoglobin 200 mg/dL
 - Lipemia : L index ของเครื่องไม่เกิน 2000 (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)
2. สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ gammopathy โดยเฉพาะชนิด IgM (Waldenström's macroglobulinemia) อาจมีผลต่อการทดสอบ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) : ภายใน 24 ชั่วโมง

13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี

