



Alanine aminotransferase (ALT)

1. การทดสอบ : Alanine aminotransferase (ALT) หรือ Serum glutamate pyruvate transaminase (SGPT)
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (**indication**) : Hepatobiliary disease
3. การเตรียมผู้ป่วย (**patient preparation**) : ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ(**specimen**) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (**collection**) :
ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection medium) : เลือด ปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (**handling**) : ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ
6. วันและเวลาทำการตรวจ (**testing schedule**) : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
7. การประกันเวลาการทดสอบ (**TAT**) :
 - ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
 - ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1½ ชั่วโมง
8. การรายงานผล (**report**) : รายงานเป็นหน่วย U/L โดยใช้ค่าอ้างอิง(reference value)
ผู้ชาย 5 – 41 U/L
ผู้หญิง 5 – 33 U/L
9. ค่าตรวจ (**charge**) : 55 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (**methodology**) : Enzymatic reaction
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (**interference**) :
 - 1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: Bilirubin 60 mg/dL
 - Hemolysis: Hemoglobin 90 mg/dL
 - Lipemia: L index ของเครื่องไม่เกิน 150 (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)
 - 2) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ gammopathy โดยเฉพาะชนิด IgM (Waldenström's macroglobulinemia) อาจมีผลต่อการทดสอบ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (**time limit for requesting additional test**) : ดูที่เมนูขอตรวจเพิ่มหรือขอตรวจซ้ำ
13. อื่นๆ (**comment**) : ไม่มี

