



Cholesterol

1. การทดสอบ : Cholesterol

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

- 1) ประเมินความเสี่ยงต่อภาวะ atherosclerosis
- 2) วินิจฉัยและรักษาโรคที่มีความผิดปกติของระดับไขมันในกระแสเลือด

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

- 1) ควรบริโภคอาหารตามปกติและมีน้ำหนักตัวคงที่ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนตรวจ
- 2) ค่า cholesterol อาจสูงขึ้น 10-15% ถ้ารัด tourniquet นานเกินไป ไม่ควรรัดนานเกิน 1-2 นาที
- 3) ท่าของผู้ป่วยมีผลกับ cholesterol โดย ค่าจะลดลง 10-15% หลังนอนลง 20 นาทีและค่าจะลดลง 6 % หลังจากเปลี่ยนท่าขึ้นเป็นนั่ง ดังนั้นควรอยู่ในท่านั่งขณะตรวจเลือด หรือหากตรวจในท่านอนควรตรวจด้วย ท่าเดิมในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันผลจากการเปลี่ยนแปลงท่าทาง

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

เลือด ปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึงรายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลางถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นหน่วย mg/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) < 200 mg/dL

9. ค่าตรวจ (charge) : 70 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Enzymatic colorimetric method

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

- 1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: Conjugated bilirubin 16 mg/dL และ unconjugated bilirubin 14 mg/dL
 - Hemolysis: Hemoglobin 700 mg/dL
 - Lipemia: L index ไม่เกิน 2,000 (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)
- 2) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ gammopathy โดยเฉพาะชนิด IgM (Waldenström's macroglobulinemia) อาจมีผลต่อการทดสอบ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) : ภายใน 24 ชั่วโมง

13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี

