



Total protein

1. การทดสอบ : Total protein
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :
 - 1) Evaluate nutritional status
 - 2) Investigate edema
 - 3) Severe organ diseases especially protein losing state
 - 4) Multiple myeloma
 - 5) Immunological diseases
3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือด ปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) : ไม่มี
6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :
 - ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
 - ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง
8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นหน่วย g/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) 6.4-8.3 g/dL
9. ค่าตรวจ (charge) : 55 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Colorimetric (Biuret) method
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :
 - 1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: Bilirubin **20** mg/dL
 - Hemolysis: Hemoglobin **500** mg/dL
 - Lipemia: L index ของเครื่องไม่เกิน **2000** (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)
 - Dextran: 30 mg/mL
 - 2) 2.) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ gammopathy โดยเฉพาะชนิด IgM (Waldenström's macroglobulinemia) อาจมีผลต่อการทดสอบ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test) : ดูที่เมนูขอตรวจเพิ่มหรือขอตรวจซ้ำ
13. อื่นๆ (comment) :





- 1) ความเข้มข้นของ **protein** ในตัวอย่างตรวจที่เจาะจากผู้ป่วยในท่าเอนนอนจะต่ำกว่าในตัวอย่างตรวจที่เจาะจากผู้ป่วยในท่านั่ง ประมาณ **0.4-0.8 g/dL**
- 2) ค่าอ้างอิงเป็นค่าในผู้ใหญ่
- 3) ระดับ **total protein** แปรผันไปตามช่วงอายุ

