



Triglycerides

1. การทดสอบ : Triglycerides
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :
 - 1) ประเมินความเสี่ยงต่อภาวะ atherosclerosis
 - 2) ติดตามการรักษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาลดระดับไขมันในเลือด
3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) :
 1. บริโภคอาหารตามปกติในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนตรวจ และมีน้ำหนักตัวคงที่ งดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 2. งด alcohol ในคืนก่อนตรวจ
4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือด ปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) : ไม่มี
6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :
 - ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
 - ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง
8. การรายงานผล (report) :

รายงานเป็นหน่วย mg/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) < 150 mg/dL
9. ค่าตรวจ (charge) : 70 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Enzymatic colorimetric test
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :
 - 1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: bilirubin 10 mg/dL และ [TG >3,000 mg/dL](#)
 - Hemolysis: Hemoglobin 700 mg/dL
 - 2) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ gammopathy โดยเฉพาะชนิด IgM (Waldenström's macroglobulinemia) อาจมีผลต่อการทดสอบ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)
 - 3) endogenous unesterified glycerol ทำให้ค่าสูงผิดปกติได้
 - 4) ascorbic acid และ calcium dobesilate ทำให้ค่าต่ำผิดปกติได้ intralipid ทำให้ค่าสูงได้
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) : ภายใน 24 ชั่วโมง
13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี

