



Albumin

1. การทดสอบ : Albumin

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

1. Evaluate nutritional status, blood oncotic pressure
2. Liver disease
3. Renal disease with proteinuria

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือด ปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin น้ำเจาะจากช่องต่างๆ
ใส่ภาชนะที่สะอาด

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) :

รายงานเป็นหน่วย g/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) 3.5-5.2 g/dL

Adult	3.5 - 5.2	g/dL
Newborn 0-4 days	2.8 - 4.4	g/dL
Children >4 days - 14 years	3.8 - 5.4	g/dL
Children >14-18 years	3.2 - 4.5	g/dL

9. ค่าตรวจ (charge) :

55 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Colorimetric assay

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

1. ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: Bilirubin 60 mg/dL
 - Hemolysis: Hemoglobin 1,000 mg/dL
 - Lipemia: L index ของเครื่องไม่เกิน 550 (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)





2. สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ gammopathy โดยเฉพาะชนิด IgM (Waldenström's macroglobulinemia) อาจมีผลต่อการทดสอบ (แต่พบกรณีนี้ได้หาย)
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test) : ภายใน 24 ชั่วโมง
13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี

