



Aspartate aminotransferase (AST)

1. การทดสอบ : Aspartate aminotransferase (AST) หรือ
Serum glutamate oxaloacetate transaminase (SGOT)
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) : Hepatobiliary disease
3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :
เลือด ปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :
ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ
6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :
 - ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
 - ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1½ ชั่วโมง
8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นหน่วย U/L โดยใช้ค่าอ้างอิง(reference value)
 - ผู้ชาย 5 – 40 U/L
 - ผู้หญิง 5 – 32 U/L
9. ค่าตรวจ (charge) : 55 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Enzymatic reaction
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :
 - 1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - a. Icterus: Bilirubin 60 mg/dL
 - b. Hemolysis: Hemoglobin 40 mg/dL
 - c. Lipemia: L index ของเครื่องไม่เกิน 150 (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)
 - 2) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ gammopathy โดยเฉพาะชนิด IgM (Waldenström's macroglobulinemia) อาจมีผลต่อการทดสอบ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test) : ดูที่เมนูขอตรวจเพิ่มหรือขอตรวจซ้ำ
13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี

