



Bilirubin

1. การทดสอบ : Bilirubin

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) : เพื่อหาสาเหตุของภาวะ jaundice

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือด ปริมาณ 4-5 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

- 1) การส่งตรวจควรระวังเลือดโดนแสง และไม่ควรมี hemolysis (direct bilirubin)
- 2) ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นหน่วย mg/dL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value)

- total bilirubin 0.0-1.2 mg/dL
- direct bilirubin 0.0-0.3 mg/dL

9. ค่าตรวจ (charge) : 55 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Colorimetric assay (dialzo method)

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

- 1) ผลการทดสอบ total bilirubin จะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด
ดังต่อไปนี้ Hemolysis: Hemoglobin [800](#) mg/dL Lipemia: L index ของเครื่องไม่เกิน 1000 (ค่า L





- index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้) [Hemolysis in neonates : Hemoglobin 1000 mg/dL](#)
- 2) ผลการทดสอบ direct bilirubin จะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนดดังต่อไปนี้ Hemolysis: Hemoglobin 25 mg/dL Lipemia: L index ของเครื่องไม่เกิน 750 (ค่า L index ไม่สามารถเปรียบเทียบเป็นค่า triglyceride ได้)
 - 3) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ gammopathy โดยเฉพาะชนิด IgM (Waldenström's macroglobulinemia) อาจมีผลต่อการทดสอบ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test) :

ดูที่เมนูขอตรวจเพิ่มหรือขอตรวจซ้ำ

13. อื่นๆ (comment) : ห้ามใช้ cord blood ในการตรวจ total bilirubin

