



Total Testosterone

1. การทดสอบ : **Total Testosterone**
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (**indication**) :
ช่วยในการประเมิน impotency and infertility ในเพศชาย และประเมิน ovarian tumors, hirsutism, androgenic syndrome and infertility ในเพศหญิง
3. การเตรียมผู้ป่วย (**patient preparation**) : ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ(**specimen**) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (**collection**) :
เลือด ปริมาณ 6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง (จุกแดง) เท่านั้น
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (**handling**) :
ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ
6. วันและเวลาทำการตรวจ (**testing schedule**) : ทุกวันในเวลาราชการ
7. การประกันเวลาการทดสอบ (**TAT**) :
 - ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึงรายงานผล(Total TAT) 2½ ชั่วโมง
 - ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล(Analytical TAT) 1½ ชั่วโมง
8. การรายงานผล (**report**) : รายงานเป็นค่ามีหน่วยเป็น ng/mL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value)

ผู้ชาย	20-49 ปี	2.49 - 8.36	ng/ml
	50 ปีขึ้นไป	1.93 - 7.40	ng/mL
ผู้หญิง	20-49 ปี	0.084 - 0.481	ng/mL
	50 ปีขึ้นไป	0.029 - 0.408	ng/mL
9. ค่าตรวจ (**charge**) : 280 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (**methodology**) :
Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA), competition principle
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (**interference**) :
 - 1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: Bilirubin 30 mg/dL
 - Hemolysis: Hemoglobin 600 mg/dL
 - Lipemia: Triglyceride 800 mg/dL
 - Biotin: 3,600 ng/mL
 - Rheumatoid factors: 1,000 U/mL
 - 2) ผลการตรวจอาจถูกรบกวนจากผู้ที่มี high titers of antibodies ต่อ analyte-specific antibodies , antibodies to streptavidin or ruthenium (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)





12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) :

ภายใน 24 ชั่วโมง

13. อื่น ๆ (comment) :

ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรค การแปลผลผลการทดสอบต้องประเมินร่วมกับประวัติผู้ป่วย และการตรวจร่างกายเสมอ

