



Vitamin D (Total 25-Hydroxyvitamin D)

1. การทดสอบ : Vitamin D (Total 25-Hydroxyvitamin D)
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :
 1. [คัดกรองและวินิจฉัยภาวะพร่องวิตามินดี \(vitamin D deficiency/insufficiency\)](#)
 2. [ประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุน \(osteoporosis\) หรือกระดูกอ่อน \(osteomalacia/rickets\)](#)
 3. [ติดตามผู้ป่วยที่ได้รับ Vitamin D supplement เพื่อปรับขนาดยา](#)
 4. [ประเมินผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดวิตามินดี ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่ถูกแสงแดด ผู้ป่วยโรคอ้วน](#)
 5. [ประเมินผู้ป่วยโรคดูดซึมผิดปกติ เช่น Crohn's disease, Celiac disease, และหลังผ่าตัดกระเพาะ](#)
 6. [ติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรคตับ และโรคที่มีความผิดปกติของการเผาผลาญวิตามินดี](#)
3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) : เลือดปริมาณ 2-3 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่สารกันเลือดแข็งชนิด EDTA
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) : การส่งสิ่งส่งตรวจควรมาถึงห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง
6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันในเวลาราชการ
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :
 - ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
 - ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง
8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นหน่วย ng/mL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) ≥ 30 ng/mL
9. ค่าตรวจ (charge) : 990 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Electrochemiluminescence immunoassay [competition Principle](#) (ECLIA)
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :





- 1) hemolysis 600 mg/dL
- 2) เลือดที่มีสารต่อไปนี้ไม่รบกวนการทดสอบ
 - Bilirubin < 66 mg/dL
 - Intralipid < 300 mg/dL
 - Biotin < 600 ng/mL
 - Rheumatoid < 1,200 IU/mL
- 3) ยาที่ใช้ทั่วไปจำนวน 18 ชนิดและยาจำเพาะ 5 ชนิด (Ibandronate, Alfacalcidol, Alendronate, Pamidronate และ Zoledronate) ไม่รบกวนการทดสอบ
- 4) ผู้ป่วยที่ได้รับไปโอตินขนาดสูง (5 mg/day) จะสามารถเจาะเลือดตรวจได้หลังจากได้รับยาครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
- 5) พบได้น้อยมาก ในกรณีที่คนไข้มีแอนติบอดีระดับสูงมากต่อ streptavidin หรือ ruthenium อาจจะมีผลต่อการทดสอบได้

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) : ภายใน 8 ชั่วโมง

13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี

