

PRÉSENTATION CLINIQUE

- Les signes et symptômes d'appel de la COVID-19 sont variables
- La plupart des personnes présentent de la fièvre (83-99 %), une toux (59-82 %), une fatigue (44-70 %), une anorexie (40-84 %), un essoufflement (31-40 %) et des myalgies (11-35 %). D'autres symptômes non spécifiques, notamment mal de gorge, congestion nasale, céphalée, diarrhée, nausées et vomissements, ont également été signalés (17, 48-50). Une perte de l'odorat (anosmie) ou du goût (agueusie), qui précède l'apparition des symptômes respiratoires, a également été décrite (19, 51, 52).
- Chez les personnes âgées et les patients immunodéprimés, en particulier, les premiers symptômes peuvent être atypiques : fatigue, baisse de la vigilance, perte de mobilité, diarrhée, perte d'appétit, délire et absence de fièvre (34-36).
- Les symptômes dus aux adaptations physiologiques chez la femme enceinte, tels que la dyspnée, la fièvre, les symptômes gastro-intestinaux (GI), les issues défavorables de grossesse ou la présence d'autres maladies, par exemple le paludisme, peuvent recouvrir en partie les symptômes de la COVID-19.



**FACTEURS DE RISQUE
DE MALADIE SEVERE**

- Âge supérieur à 60 ans (risque croissant avec l'âge).
- Les maladies non transmissibles (MNT) sous-jacentes – diabète, hypertension, cardiopathie, maladie pulmonaire chronique, maladies vasculaires cérébrales, maladie rénale chronique, immunosuppression et cancer – ont été associées à une hausse de la mortalité.
- Tabagisme.

