

Recommandation 1 :

Chez les contacts asymptomatiques de patients atteints de COVID-19, l'OMS suggère de ne pas utiliser l'imagerie thoracique pour le diagnostic. Recommandation soumise à conditions, basée sur l'opinion d'experts

Remarque

Un test RT-PCR doit être effectué pour confirmer le diagnostic de COVID-19.

Données probantes

La revue systématique n'a identifié aucune étude correspondant aux critères d'inclusion qui ait évalué l'exactitude diagnostique de l'imagerie chez les contacts asymptomatiques de patients atteints de COVID-19.

Éléments à prendre en considération pour la mise en œuvre

- 1. Prendre en compte la disponibilité du test RT-PCR et, lorsque ce test est effectué, examiner si le résultat est positif ou négatif.**
- 2. Envisager l'utilisation de l'imagerie thoracique chez les contacts asymptomatiques pour qui la maladie évolue avec l'apparition de symptômes respiratoires (surveillance de la température).**
- 3. Dans les pays ou les régions qui ont présenté dans le passé ou qui présentent actuellement une prévalence de la COVID-19 élevée, envisager d'évaluer les signes pulmonaires découverts de façon fortuite et faisant suspecter une COVID-19 sur des examens d'imagerie effectués pour d'autres raisons (par exemple, sur une radiographie de la colonne dorsale ou sur une tomodensitométrie cardiaque).**

