



Maladie bénigne

- **Patients symptomatiques répondant à la définition de cas de COVID-19 exempts de signes de pneumonie virale ou d'hypoxie.**
- **Pour obtenir les définitions de cas les plus récentes, voir le site Web de l'OMS (1).**





Forme modérée PNEUMONIE

- **Adolescent** ou adult-e-présentant des signes cliniques de pneumonie (fièvre, toux, dyspnée, respiration rapide), mais aucun signe de pneumonie sévère, y compris $\text{SpO}_2 \geq 90\%$ en air ambiant (54).
- **Enfant** présentant des signes cliniques de pneumonie non sévère (toux ou difficulté à respirer + respiration rapide et/ou tirage sous-costal) et aucun signe de pneumonie sévère. Respiration rapide (en respirations/min) : < 2 mois : ≥ 60 ; 2-11 mois : ≥ 50 ; 1-5 ans : ≥ 40 (55). Bien que le diagnostic puisse reposer sur l'examen clinique, l'imagerie thoracique (radiographie, tomodensitométrie, échographie) peut le faciliter et permettre d'identifier ou d'écarter des complications pulmonaires.





Maladie sévère

PNEUMONIE SEVERE

- Patients symptomatiques répondant à la définition de cas de COVID-19 exempts de signes de pneumonie virale ou d'hypoxie.
- Pour obtenir les définitions de cas les plus récentes, voir le site Web de l'OMS (1).

