



SURVEILLANCE AU NIVEAU DES SOINS PRIMAIRES

La surveillance en milieu de soins primaires est une nécessité pour pouvoir détecter les cas et les groupes de cas dans la communauté. Dans la mesure du possible, le dépistage devrait être disponible dans les services de soins primaires. Une autre possibilité complémentaire consiste à mettre en place des installations communautaires consacrées au dépistage de la COVID-19, telles que des sites de drive-in pour se faire dépister en voiture ou des sites fixes dans des bâtiments communautaires. Les patients dépistés comme des cas probables ou confirmés de COVID-19 doivent faire l'objet d'une notification dans les 24 heures suivant leur identification. Il est crucial que les données soient communiquées et analysées rapidement, afin de détecter les nouveaux cas et groupes de cas et de débiter la recherche des contacts.

Par conséquent, il convient de ne collecter qu'un nombre minimal de variables de données pour chaque cas : âge, sexe, lieu de résidence, date d'apparition de la maladie, date de prélèvement de l'échantillon et résultat du test. Pour faciliter la communication quotidienne des données aux autorités de santé publique locales ou nationales, elle peut se faire en ligne, par l'intermédiaire d'une application pour téléphone portable, par messages textuels (SMS) ou par téléphone. Il est essentiel que tous les sites au niveau des soins primaires notifient, idéalement tous les jours, une absence de cas, pour vérifier que le système de surveillance fonctionne en continu et pour surveiller la circulation du virus.

