

뒷가슴벽의 구조 (종격동)

역대 기출문제 | 2025, 2023, 2022, 2021, 2019년 | 총 10문제

2025년 Q14 [금동윤] 뒷가슴벽의 구조

Q14. 14. 사진에서 화살표로 가리키는 구조물은? (객관식)

- 1) Intercostal vein
- 2) Azygos vein
- 3) left gastric vein
- 4) left brachiocephalic vein
- 5) hepatic vein

1) 14번 문제의 사진(혈관 이름 알아보기), 2) 식도 조직의 특징이었는데 다른 부분에서 출제되었습니다.

** 강의록 참고

정답: 2)

해설

¥23년도 9번 변형

** 시험문제를 내신다고 알려주신 부분입니다.

** 강의록 참고

문제번 15 교수님 금동윤

호

주제 뒷가슴벽의 구조 해설자 윤주원

감수자 송민지

문제 15. IVC pulmonary thromboembolism에서 심장으로 우회할 수 있는 혈관은?

- 1) Intercostal vein
- 2) Azygos vein
- 3) left gastric vein
- 4) left brachiocephalic vein
- 5) hepatic vein

답 2)

해설 ** 수업 중 강조하신 부분은

1) 14번 문제의 사진(혈관 이름 알아보기), 2) 식도 조직의 특징이었는데 다른 부분에서 출제되었습니다.

** 강의록 참고

2023년 Q9 [금동윤] 흉곽 해부

Q9. 9. 화살표의 명칭은?

- 1) left brachiocephalic vein
- 2) left common carotid artery
- 3) brachiocephalic artery.
- 4) azygos vein
- 5) left subclavian artery.

정답: 5

해설

강의록에 나와있는 사진을 그대로 사용하셨습니다.

2023년 Q10 [금동윤] 흉곽 해부

Q10. 10. 식도 조직을 바르게 설명한 것은?

- 1) 점막은 원주상피로 구성되어 있다.
 - 2) 근육층에 임파관, 혈관 등이 위치한다
 - 3) 장막(serosa)이 없다.
 - 4) 근육의 바깥층은 circular muscle로 구성되어 있다.
 - 5) muscularis mucosa 는 점막하층과 근육층 사이에 위치한다
- 1) 점막은 편평상피로 구성되어있습니다. 식도위 연결 1~2cm 상부에서부터 원주 상피가 나타납니다.
- 2) 임파관은 주로 submucosa에 위치합니다.
- 3) 옳은 선지입니다.
- 4) 근육은 안쪽이 circular muscle로 구성되어있고, 바깥층은 longitudinal muscle로 구성되어있습니다.
- 5) muscularis mucosa는 점막층과 점막하층 사이에 위치합니다.

정답: 3

해설

금동윤 교수님의 문제는 수업시간 강의록에서 강조하신 부분에서 주로 내시기에 강의를 집중하여 들어주시면 어렵지 않게 풀 수 있습니다.

- 1) 점막은 편평상피로 구성되어있습니다. 식도위 연결 1~2cm 상부에서부터 원주 상피가 나타납니다.
- 2) 임파관은 주로 submucosa에 위치합니다.
- 3) 옳은 선지입니다.
- 4) 근육은 안쪽이 circular muscle로 구성되어있고, 바깥층은 longitudinal muscle로 구성되어있습니다.
- 5) muscularis mucosa는 점막층과 점막하층 사이에 위치합니다.

2022년 Q4 [채민철] 종격동 해부학

Q4. 4. 횡격막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) 좌우 1쌍의 근육으로 구성되어 있다.
- 2) Inferior thoracic aperture를 구성하고 있다.
- 3) Esophageal hiatus를 통해 esophagus와 vagus nerve가 같이 통과한다.
- 4) 흡기시 근육이 수축되며 높이가 낮아지면서 흉강의 확장을 도와 호흡 운동에 있어 중요한 역할을 한다.
- 5) 횡격막 신경 손상시 횡격막의 수축과 이완이 사라지게 되며 횡격막 거상이 발생할 수 있다.
- 2) 횡격막이 inferior mediastinum의 아래쪽 경계이므로 맞는 보기입니다.
- 3) Vagus nerve는 식도와 함께 주행하여 위에 가지를 냅니다. Esophageal hiatus는 식도가 위와 이어지기 직전에 통과하는 가로막의 구멍으로, 식도와 미주신경이 함께 통과합니다. 위 사진의 빨간 동그라미 2번 내용을 참고하시면 될 것 같습니다.
- 4) 흡기 시 횡격막이 수축하여 가로막이 내려가서 흉강이 넓어지고 공기가 들어옵니다.
- 5) 횡격막은 phrenic nerve에 의해 innervation되며 phrenic nerve가 손상되면 diaphragm paralysis가 일어나 횡격막 거상이 발생할 수 있습니다.

정답: 1

해설

- 1) 하나의 큰 근육입니다. 흉강이 2개로 나누어져 있다고 해서 횡격막이 2개의 근육인 것은 아닙니다!
- 2) 횡격막이 inferior mediastinum의 아래쪽 경계이므로 맞는 보기입니다.
- 3) Vagus nerve는 식도와 함께 주행하여 위에 가지를 냅니다. Esophageal hiatus는 식도가 위와 이어지기 직전에 통과하는 가로막의 구멍으로, 식도와 미주신경이 함께 통과합니다. 위 사진의 빨간 동그라미 2번 내용을 참고하시면 될 것 같습니다.
- 4) 흡기 시 횡격막이 수축하여 가로막이 내려가서 흉강이 넓어지고 공기가 들어옵니다.
- 5) 횡격막은 phrenic nerve에 의해 innervation되며 phrenic nerve가 손상되면 diaphragm paralysis가 일어나 횡격막 거상이 발생할 수 있습니다.

2022년 Q51 [금동윤 교수님] 흉곽 해부

Q51. 51. 세로막(종격동)에 대해 바르게 설명한 것은?

- 1) 단순흉부사진에서 종격의 상하부 경계를 명확히 할 수 없다.
- 2) 전종격동 구조물중 무명정맥(left innominate vein)은 좌측총경동맥(left common carotid A.)보다 후방에 위치한다.
- 3) 식도는 기관의 전방에 위치하며 주변으로 미주신경이 분포한다. 4) 기관분기(carina)는 sternal angle과 T4/5 연결선 상에 위치한다
- 5) 흉선은 double lobe로 구성되어 있으며 symmetric하다.
- 3) 식도는 기관의 후방에 위치한다.
- 5) 흉선은 asymmetric하다.

정답: 4

해설

- 2) left innominate vein(=brachiocephalic vein)은 common carotid artery보다 전방에 위치한다.
- 3) 식도는 기관의 후방에 위치한다.
- 5) 흉선은 asymmetric하다.

2022년 Q52 [금동윤 교수님] 흉곽 해부

Q52. 52. 식도 대해 바르게 설명한 것은?

- 1) 조직학적으로 점막은 편평상피로 구성되어 있다.
- 2) 식도-위 문합부는 횡격막 상부 1cm에 위치한다.
- 3) 대부분의 식도에 영향을 주는 임파관은 근육층에 위치한다.
- 4) 식도 길이는 총 40cm정도이며 경부식도는 약 4-5cm 정도이다. 5) 식도는 장막 (serosa)를 가지고 있으나 주위 장기와 인접하여 손상시 치명적일 수 있다.
- 4) 식도 길이는 약 25cm이다.
- 5) 식도에는 serosa가 없다. 주위 구조물인 trachea, pericardium, pleura가 serosa의 역할을 대신한다.

정답: 1

해설

- 3) 임파관은 주로 submucosa에 위치한다.
- 4) 식도 길이는 약 25cm이다.
- 5) 식도에는 serosa가 없다. 주위 구조물인 trachea, pericardium, pleura가 serosa의 역할을 대신한다.

2021년 Q5 [금동윤] 뒷가슴벽의 구조

Q5. 식도 조직에 대해 바르게 설명한 것은?

- 1) 점막(mucosa)-점막하층(submucosa)-근육층(muscle)-장막층(serosa)로 구성되어 있다.
- 2) 식도-위 연결부위 직상방 1-2cm부터 편평상피로 변형되어 있다.
- 3) 식도의 임파선의 특징은 식도의 상하로 주행하며 점막층에 위치한다.
- 4) 근육은 inner circular, outer longitudinal muscle로 구성되어 있다.
- 5) 점막하층 바로 직전 점막층은 basement membrane이다

정답: 4

해설

금동윤 교수님도 해부관련 문제는 채민철 교수님과 같이 문제형식이 비슷함으로 참고하시길 바랍니다. 이 문제 또한 2020 호흡기 1차 6번 문제변형입니다.

1. 식도는 mucosa-submucosa-muscle 총 3층으로 구성되어 있고 serosa 층이 없는 것이 특징이라고 수업 중 강조하셨습니다.
2. 식도 위 연결 1-2cm 상부부터 편평에서 원주상피로 변형됩니다.
3. 식도의 임파선은 점막층이 아닌 점막하층에 위치합니다.
4. 맞는 선지입니다
5. 점막층 가장 안쪽에 위치한 부분은 muscularis mucosa로 수업 중 강조하셨던 부분이었습니다.

2021년 Q6 [금동윤] 뒷가슴벽의 구조

Q6. 유미흉을 주소로 우측 가슴을 통해 흉관결찰술을 시행하기로 계획하였다.

가로막 상부에 위치한 흉선을 찾는 데 landmark가 되는 조직은?

- 1) 교감신경
- 2) 미주신경
- 3) azygos vein
- 4) inferior pulmonary ligament
- 5) vertebral body

정답: 3

해설

강의록에 ‘오른쪽 가슴을 열어서 흉관을 찾을 때 landmark가 되는 것?’이라고 명시되어 있고 수업 중 강조하셨던 부분으로 답은 azygous vein입니다.

2019년 Q37 [이혜원 교수님] 감염성 폐질환, 종격동 질환의 병리

Q37. 다음은 74세 여자의 폐에서 생검된 조직의 헤마톡실린에오진염색 및 은염색 사진이다. 관찰되는 감염원은 무엇인가.

- 1) 주혈흡충
- 2) 아스페르길루스푸미가투스
- 3) 사람폐포자충
- 4) 리케차
- 5) 히스토플라스마캡슐라툼

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 2

해설

나뭇잎 모양에 격벽이 있고

GMS+면 Aspergillosis!

2019년 Q38 [이혜원 교수님] 감염성 폐질환, 종격동 질환의 병이

Q38. 대엽성 폐렴 (Lobar pneumonia) 의 각 단계에 대한 조직 소견으로 바르게 이어진 것을 고르시오.

1) Congestion (울혈기) - 폐포강 내 염증 삼출물이 효소 소화작용에 의해 파괴되어 흡수된다.

Red hepatization (적색 간화기) - 피브린 및 급성염증 삼출물이 폐포강에 가

2) 득 차 있고 화농성 흉막염을 동반한다.

Grey hepatization (회색간화기) - 섬유모세포가 증식하여 흡수되지 않은 폐포강내 염증 삼출물을

3) 기질화 한다.

Resolution (해소기) - 단백질 삼출물이 폐포강을 채우고, 소수의 급성 염증 세포가 폐포벽의 일부

4) 침윤하고 있다.

20190617 의학과2 호흡기학

정답:

해설

1) 4단계 이야기

3) 2단계 이야기

4) 1단계 이야기