

병원획득폐렴 / 흡인성 폐렴

역대 기출문제 | 2025년 | 총 1문제

2025년 Q38 [김미애] 병원획득폐렴, 흡인성 폐렴

Q38. 38. 병원 입원 3일 후에 폐렴 걸린 사람. 다음 중 옳은 설명은?

- 1) 90일 전에 항생제 정주 이력이 있으면 cefepime을 사용할 수 있다?
 - 2) 30일 전에 항생제 사용 이력이 있을 때, MRSA 군 집락이 관찰된 적이 없다면 반코마이신을 쓰면 안 된다.
 - 3) 손씻기는 예방에 도움이 되지 않는다.
 - 4) 기계환기를 시행하는 경우 오래 해야 한다.
- 1) 90일 이내의 항생제 사용 이력은 MDR 위험요인에 해당하여 anti-pseudomonal antibiotics인 cefepime을 사용할 수 있습니다. - 정답선지
- 2) MRSA 군 집락이 관찰된 적이 없더라도, 중증 폐렴이나 지역 MRSA 유행, 이전의 광범위 항생제 사용 등 MRSA 위험요인이 있다면 반코마이신을 사용할 수 있습니다. (GPT)
- 3) 손씻기는 HAP 예방에 도움이 됩니다.
- 4) 기계환기를 시행하는 경우 가능한 빨리 발관하는 것이 HAP 예방에 도움이 됩니다.

정답: 1)

해설

병원 입원 48시간 이후에 발생한 폐렴으로, HAP에 관한 문제입니다.

- 1) 90일 이내의 항생제 사용 이력은 MDR 위험요인에 해당하여 anti-pseudomonal antibiotics인 cefepime을 사용할 수 있습니다. - 정답선지
- 2) MRSA 군 집락이 관찰된 적이 없더라도, 중증 폐렴이나 지역 MRSA 유행, 이전의 광범위 항생제 사용 등 MRSA 위험요인이 있다면 반코마이신을 사용할 수 있습니다. (GPT)
- 3) 손씻기는 HAP 예방에 도움이 됩니다.
- 4) 기계환기를 시행하는 경우 가능한 빨리 발관하는 것이 HAP 예방에 도움이 됩니다.